

APPARATVS

B

ET DELECTVS  
SIMPLICIVM

MEDICAMEN-  
TORVM.

\*

*Harzeth*

DE COMPOSITIONE

*Medicamentorum secundum*

*Genera,*

EX PAULO Aegineta.

DE COMPOSITIONE

Medicamentorum secundum Genera

vniversalis methodus, ex

GALENO.

\*

OMNIA nunc primùm edita, cum Medicis, tum  
Pharmacopolis omnib. apprimè neces-  
saria, Auctore

CONRADO GESSNERO Tigurino

Lugduni,



Sub scuto COLONTIENSI, apud Ioan-  
nem & Franciscum Frellonios, fratres.

I 5 4 2

C  
38721

0 1 2 3 4 5 6 7 8



CLARISS. MEDICO,  
D. CHRISTOPHORO  
CLAVSERO

CONRADVS GESSNERVS

S. P. D.



**D**OLENDA profectò res,  
multaq; reprehensione di  
gna, Christophore uir do  
ctissime, cùm nostro secu  
lo artes ac disciplinæ o  
mnes, barbaram quæque  
suam exuerint leberidem, & tanquam uere  
nouo eruditorum ceu fauoniorum afflatu fœ  
lici reuirescere cœperint: solam adhuc Me  
dicinam nondum undiq; uetus illud exuuium  
exuisset. Haud secus quàm cùm puerpera fœ  
liciter quidem enixa partum est, secundis ue  
rò hærentibus adhuc affligitur: Ita Pæonia  
disciplina in lucem nuper ædita est satis in  
tegrè, nisi aliqua eius pars lateret adhuc in  
tenebris condita. Quæ nam uerò ea est? Illa  
omniū prima, quæ iuuenescere primū de-

bebat: illa in primis necessaria, quod ad frequentem usum attinet, ac instrumenti rationem: illa cuius auctores in utraque lingua nitidissimos & eloquentissimos habemus. Nempe quæ Medicamenta simplicia rectè cognita, suo in genere præstantissima quæque seligit, usui lecta probè parat, siue simplici, siue cum alijs iuncto. Minimè te fugit hucusque è sæculentis barbarorū lacunis, quicquid huiusmodi Apparatum attinet, præteritis antiquiorū doctiorumq; fontibus, haustum esse. Hanc ego tandem fortunam misertus Medicinæ nobilissimæ, tanquam alicuius heroïnæ in fœdam miseramq; servitutem indignis modis redactæ, quantiscunque possem hoc tempore copijs succurrere uolui, inq; pristinum ingenuitatis statum asserere. Tolerandum quidem utciunque existimasssem, si dictis tantum barbaris ueluti conuitijs inclyta heroïs fuisset affecta, nisi purissimo etiam eius integerrimoq; corpori iniurias inferri animaduertissem. Itaque iurium mearum non igna-



rus, periclitari tamen egomet malui, quàm sciens uidentisq; ipsam in periculo solam deserre. Mox suppetias ad hoc ex antiquis colligi, Dioscoride cumprimis, eaque Mesuæi parte, quæ iam antea eruditissimi uiri Tagautij opera politius exculta fuerat. Hoc enim enixè cupio, hoc unicum instituo, ut phar macorũ officinæ rectè sint constitutæ. Proinde simplicia primũ medicamina, tum quæ Dioscorides, tum quæ alij Græci Latiniq; insignia tradiderant, in enchiridion redegi, historia quidem fusè explicata, uiribus autem breuissimè iuxta Pauli Aeginetæ ferè præscriptum. Eorundem alio opere solas nomenclaturas uarijs linguis exposui, uidelicet Latina, Græca, Germanica atque Gallica. Rursus alio libello succidanea, quæ mutuos & æquales usus sui exhibent, conscripsi: omnibus in Pharmacopoliorũ utilitatem elaboratis, ut simplicium nomina, historiam, reciprocationem, delectum, apparatusq; haberent. Quæ si non perfeci, saltem cona-

tus sum. Interim hoc labore fruantur Scplasiarij, hinc interim proficiant, donec uel ipse colophonem imposuero, uel alius quispian, cui hæc rudimenta sint absoluendi à se operis, Habeant ex hoc libro pharmacorum institores ea signa quibus in suo quodque genere præstantissimum deprehendant, coquendi, lauandi, urendi, eliciendi que succos rationem, & alia huiuscemodi necessaria cognitu. Quòd si adhuc composita medicamenta illustrentur, quomodo apud ueteres sint appellata, quæ ratione parata, haud uideo quid aliud à pharmacopolis desiderari debeat, aut possit. Sicut sanè permulta quæ uulgo barbaris nominibus iactantur, antiquitus à Græcis deducta, multa à recentioribus quidem Græcis, politius tamen integriusque multo, quàm usurpentur hodie, tradita: sed in tanta non inuon barbarie, corruptaque rerum confusione plerosq; latent.

Ea quoque breuè enucleata, Latine descripta ex ueteribus, ueraque methodo composita

*Sita studiosis impertiar, si hæc illis placuisse animaduvertero. Visum est autem hoc adiungere uniuersalia Aeginetæ de medicamentorum secundum genera compositione præcepta, eiusdemque argumenti generalẽ Galeni doctrinam, particularibus serè cunctis reiectis: partim ut liber magnitudine nõ excederet, sed breuitate sua legentium animos inuitaret, alliceretque: partim quòd multa inutilia, non ab ipso Galeno, sed alijs passim doctis atque indoctis composita uiderentur. Facile autem fuerit simplicium materiam, ac uniuersalem methodum callenti, particularia ad quoscunque affectus medicamina constituuere. Item in alio opere quod iam breuẽ edendum pollicitus sum, seorsim omnes saltem insignes particulares cõpositiones memorabo. His omnibus de causis generalẽ solum tanquam epitomen Galeni librorum de compositione & yem, hoc loco tradere operæ pretium iudicauim: paucis exceptis ex quorum descriptione reliquorũ etiã apparatus*

Seplassiarij conijcerent, exemplaremque ali-  
 quam exercitationē haberent. E cæteris Ga-  
 leni scriptis nullum scio pbarmacopolis ne-  
 cessarium lectu, nisi qui Theriacam mixtu-  
 ram præparāt, ut primus de antidotis, quem  
 diligenter iterum atq; iterū euoluant omnes  
 adhortor. Tibi uerò in primis hoc quicquid  
 est, eruditissime uir Christophore, mibiq; co-  
 lendissime, uolui dedicatū, idq; iure optimo,  
 cū inclyta urbs Tigurū cōmunis utriq; pa-  
 tria te fœlicissimum sui ἀρχιτραπεζῆν habuerit.  
 Præterea D. Albertus Belfortis Rhæus uir  
 in omni disciplinarum genere absolutus, me-  
 dicinæ iuxta & philosophiæ peritiss. cuius  
 hic aliquot diebus, quæ eius est humanitas,  
 summa familiaritate sum usus: hic inquam  
 cum quotidie in bonorificā tui mētionē simul  
 incideremus, effecit quò minus tui obliuisci  
 potuerim. Accipies igitur bono animo, &  
 pro eruditione tua si quid mutādū, demēdū,  
 adiiciendum ue iudebitur, facies. Vale.  
 Lugduni in peregrinatione, 1541. Idib. Ian.

# Index in Apparatum

## Simplicium & Generalium Medicamentorum.

A		Aeris squamma	
A	Bsintium pag. 3	Aes ustum	11
	Absinthij dosiſ & de lectus ibid.	Aeris coctio	126
Acacia	4	Aeris scoria	11
Acaciæ delectus	ibid.	Aerugo rafa	ibid.
Acopa	133. & 273	Aeruginis coctio	125
Acopa caleſaciētia quibus conſtent, quibusq; conueniant	133	Aerugo ſcolecia	12
Acopa emollientia quid præſtent	ibid.	Agaricum	13
Acopis quæ miſceantur		Agarici mali notæ	14
275		Agglutinamenta	121
Acoporum ſpiſſitudo quæ eſſe debeat	133	Alcyonij quinque genera	14
Acorum	4	Alſeſceræ doſiſ	27
Adeps omniſ	4. & ſeq.	Aloë	15
&	264	Aloës optimæ notæ	ibid.
Adipum differentiæ	261	Aloës coctio	126
Aeris floſ	9	Alumen	16. & quomodo in emplaſtris co-
Aeris floſ quomodo in emplaſtris coq debeat	127	qui debeat	126
		Alypia unde dicta	112
		Ammoniacum	17
		Ammoniaci coctio	127
		Anonium	17

# I N D E X.

<i>Amonis</i>	17	<i>Atramentū librarium</i>	23
<i>Amurca</i>	18	<i>Atramentū sutoriū</i>	ibid.
<i>Amygdalæ dulces</i>	ibid.	<i>Atramenti sutoriij coctio</i>	
<i>Amylum</i>	ibid.		126
<i>Anisum</i>	ibid.	<i>Auripigmentum</i>	24
<i>Anacollemata</i>	123	<i>Auripigmenti coctio</i>	126
<i>Antipathes</i>	41	B	
<i>Apochyma, pix nauibus</i>		<b>B</b> <i>Alanus myrepisce</i>	25
<i>derasa, quomodo in em-</i>		<i>Balsamum</i>	ibid.
<i>plastris coq̄ debeat</i>	127	<i>Bdellium</i>	26
<i>Aqua</i>	18	<i>Bdellij coctio</i>	127
<i>Argenti spuma</i>	19	<i>Ben delectus</i>	25
<i>Argēti spumæ coctio</i>	126	<i>Bitumen</i>	27
<i>Argenti spumæ usus &amp; ui</i>		<i>Bitaminis coctio</i>	127
<i>res</i>	155	<i>Bryon</i>	69
<i>Argenti spumæ crudæ u-</i>		<i>Bryonia</i>	27
<i>sus</i>	161	<i>Britanica</i>	ibid.
<i>Argenti spuma &amp; reliqua</i>		<i>Buprestes</i>	ibid.
<i>metallica quomodo ab-</i>		<i>Butyri fuligo</i>	ibid.
<i>luantur</i>	162	C	
<i>Argentum uiuum</i>	21	<b>C</b> <i>Admia</i>	28
<i>Aristolochia</i>	ibid.	<i>Cadmæ coctio</i>	126
<i>Aristolochiæ delectus &amp;</i>		<i>Calamus odoratus</i>	30
<i>dosis</i>	22	<i>Calx uiua</i>	ibid.
<i>Armenius lapis</i>	ibid.	<i>Cantharides</i>	ibid.
<i>Armenici dosis</i>	ibid.	<i>Cardamomum</i>	31
<i>Asarum</i>	ibid.	<i>Cartami delectus &amp; dosis</i>	
<i>Asius lapis</i>	23		39
<i>Aspalathus</i>	ibid.	<i>Casia</i>	31
			<i>Casia</i>

# I N D E X .

<i>Casia fistularis</i> , quam Graeci ueteres ignorarunt	31	<i>Chrysocolia</i>	ibid.
Et	32	<i>Cicuta</i>	37
<i>Castorium</i>	32	<i>Cinnabaris</i>	ibid.
<i>Cedrus</i>	ibid.	<i>Cinnamomum</i>	ibid.
<i>Cedria</i>	ibid.	<i>Cnicus</i>	39
<i>Centaurium magnum</i>	ibid.	<i>Cnidij granum</i>	110. do=
<i>Centaurium minus</i>	ibid.	sis	III
<i>Centaurij utriusque dos</i>		<i>Coccum</i>	39
Et delectus	33	<i>Ceruleus lapis</i>	39. Et
<i>Cera</i> 33. Et quomodo in emplastris coqui debeat	128	43	
<i>Cera candida quomodo fit</i>		<i>Collyria</i>	121
34		<i>Collyriorum liquidorum materia</i>	123
<i>Cerae cum oleo in medicamentis quis modus esse debeat</i>	132	<i>Colocynthis duplex genus</i>	40
<i>Ceratomalagmata</i>	274	<i>Colocynthis medullae preparandae modus.</i>	
<i>Cerui cornu</i>	34	ibidem	
<i>Cerussa quomodo fit</i>	34	<i>Conchyliorum coctio</i>	130
quae melior 35. Et quomodo in emplastris coqui debeat	128	<i>Conyza</i>	41
<i>Chalcitis</i> 36. Et quomodo in emplastris coqui debeat	128	<i>Corallium</i>	ibid.
<i>Chamelea</i>	110	<i>Costus</i>	ibid.
<i>Chelidonium</i>	36	<i>Cotonea mala</i>	42
		<i>Crocodili terrestres fimum, siue Crocodilea</i>	ibid.
		<i>Crocomagma</i>	ibid.
		<i>Crocum</i>	42. Et 43
		<i>Cucurbitula syluatica diligentiissime terenda</i>	40
		Cya	

# I N D E X.

Cyaneus, siue Cœruleus lapis	43	Emplastrorū materia	123
Cyclamen	44	Emplastrorum differentiæ	124
Cypirus	ibid.	Emplastra catagmatica	
Cyphi thymiana	45	102. &	124
Cyprus	ibid.	Emplastra cicatricem ducentia	124
D		Emplastra colletica	ibid.
Dacrydion	98	Emplastra quæ cōcoquant	ibid.
Diphryges	45. &	Emplastra digerentia	ibi
quomodo in emplastris		dem &	257
coquatur	130	Emplastra emollientia	is
Dipsacum	46	bidem	
Dracunculus	ibid.	Emplastra enema	125
Dropax duplicem recipit		Emplastra extrahentia	
præparationem, materiā		124. &	257
acopis & emplastris		Emplastra quæ leniunt	
confinem	133	125	
Dulcis radix	46	Emplastra pus mouentia	
E		ibid.	
Ebenus	46	Emplastra siccantia	124
Elaterium	47	Emplastrorū uiridium u-	
Elaterij durationis tempus		sus	179
48		Emplastrorum uiridium	
Elleborus uomitione pur-		commixtio, & propor-	
gat	113	tio	180
Elleborus albus quomodo		Emplastra quomodo uiri-	
præparandus	ibid.	dia fiant	182
Elleborum fortissimo duci			
æquatur	ibid.		
			Em



Emplaſtri uiridis ſimplicis conſectio & uirtus	175	ſpuma & ceruſſa	164
Emplaſtra melina	186	Emplaſtri eiſdē pōd.	166
Emplaſtra ruſa, quę dixi- mus, id eſt incerti coloris dicuntur	189	Emplaſtra candida quomo- do componenda aduerſus ulcera, cocoēthe, & cica- tricem difficulter admit- tentia	167. & ſeq.
Emplaſtrum ruſum Galeni	190	In Emplaſtris colorum ua- rietas	171
Emplaſtra cicatricem indu- centia	191	Epithemata	131
Emplaſtra cephalica	192	Epithymum	48
Emplaſtra propriē cepha- lica	193	Epithymi doſis	49
Emplaſtra glutinantia	194	Eruina farina	ibidem
Emplaſtrum nigrum	197	Euphorbium	ibidem
Emplaſtri nigri coſctio ibi.		Euphorbij doſis	50
Emplaſton pharmacum & ἡ χαλκίτις	143. & ſeq.	F	
Emplaſtrū ex argenti ſpu- ma præparatum	155	Fæx	50
Emplaſtrum candidū quo- modo fit	157	Fel	51
Emplaſtrū ex argenti ſpu- ma & hydreleo	157	Fici lixiuium	ibidem
Emplaſtrū ex argenti ſpu- ma & oxaleo	159	Fici ſylueſtris & ſatiue ſuccus	ibidem
Emplaſtrum ex argēti ſpu- ma & ceneleo	160	Fœniculi ſuccus	ibidem
Emplaſtra alba ex argenti		Fœnum græcum, & eiſ cō- ſectio ex Aëtio	52
		Fucus marinus	ibidem
		Fuligo	ibidem
		Fumaria	ibidem
		Fumarię exhibitionis mo- dus	53

# I N D E X.

<b>G</b>		<b>H</b>	<b>I</b>
<b>G</b> Agates lapis	53	Hyoscyamus	ibidem
<b>G</b> Galbanum 53. & quo		Hypocisthis	58
modo in emplastris co-		Hyssopum	ibidem
quatur	128		
Galenī documentum de la-		<b>I</b>	
pidibus abluendis	22	<b>I</b> Cthyocolla	55
Galla	54	<b>I</b> Indicationes ad ulcera cu-	
Gallinacei ueteri ius	ibid.	randa	253
Galli gallinacei delectus	54	Indicum	59
Gallinacei decocti dosis	55	Inunctionum aliæ simpli-	
Genista	102	ces, aliæ compositæ	135
Gentianæ succus	55	Inunctionum simpliciū ma-	
Gingiber	ibidem	teria	ibidem
Glās unguētaria 25. &	55	Iris	59
Glutinum	55	Iris Mesuæ	ibidem
Glutinum piscium	ibid.	Iris Florentina	60
Gramen	56	Iuueus odoratus	ibid.
<b>H</b>		<b>L</b>	
<b>H</b> Aematites	56	<b>L</b> Ac	61
<b>H</b> Helenius	57	<b>L</b> Laetluca syluestris ibi.	
Hermodactylus	ibidem	Ladanum	61
Herbæ quomodo emplastra		Lana et lanarum medicina	
ingrediantur	130	62	
Hermodactylis legendis tē-		Lapidum coctio	130
pus accommodum	ibid.	Laserpitium	62
Hermodactylus rotundus		Lathyrus	63
ibidem		Lentiscus	ibidem
Horminum syluestre	57	Ligusticum	63
		Lilium	ibidem
		Lora	ibidem
		Lycium	

Lycium	64	bdana	163
Lyncis urina, siue Lynceum	ibidem	Medicamenta specialia	198
		& seq.	
		Medicamentorum ex metallicis confectio, ad neruorum uulnera	219
M		Medicamentum ex euphorbio	225
Agnes	65	Medicamentum ex liquabilibus	230
Malabathrū	ibid.	Medicamentum ex ladano	252
Malagmata	259	Medicamentū liquidū	263
Malagmatum genera	131	Medicamentis siccis, in ulceribus ad cicatricē egruentibus & malignis, quomodo utendū sit	246
Mandragoras	65	Medicamina malactica primi ordinis	267
Manna	66	Medicamina malactica secundī ordinis	268
Mannæ adulteratio	ibid.	Medicamina relaxantia	270
Mannæ thuris coctio	128	Medicamentum consistētiæ ordo	273
Marchasita	43	Medulle	67. & 265
Marrubium	66		Mel
Mastiche	ibidem		
Meconium	79		
Medicamenta arida	118		
Medicamēta stomatica	120		
Medicamentorum stomaticorum usus uariis	ibid.		
Medicamenta que emplastris ingrediuntur quomodo coquantur	125		
Medicamenta qui probè cōpositurus est, quæ præscribere eū cōuenit	138. & seq.		
Medicaminum compositorum usus	140		
Medicamentum ex molybdæna			

Mel	67	Nardum Celticum	72
Melanteria	ibidem	Nervorum uulneratorum	
Melilotos	68	curationis modus	198
Mesuae error	93	Nitrum	72
Mesuae somnium	112	Nitri spuma	73
Metalla quæ liquefiunt	156	Nitri coctio	130
Metallorum frictio cum aceteto ad solem	177	O	
Mezereon	111	Oenanthe	73
Mezerei dosis	ibidem	Oesypum	ibidem
Minij coctio	126	Oleæ Aethiopicæ lachryma	74
Misy quomodo emplastra ingrediatur	129	Oleum candidum	ibidem
Molybdæna	68	Oleæ sylvestris succus	75
Molybdoides lapis	83	Oleum Sicyonium	ibidem
Mori succus	68	Oleum Omphacinum	76
Mori radix	ibidem	Olei cum cera in medicina mentis quis modus esse debeat	132
Muscus	69	Olei differentia	178
Myrobalani Cepuli, Em-pelitici, Belethxici, Nigri	69	Oleum tenuissimum	209
Myrrha	70	Olei coctio	129
Myrrhæ coctio	129	Oleū simplex acopon	274
Myrrha troglodytica	70	Omphacium	76
Myrrha Bæotica	ibidem	Opium	76. & 79
Myrtus	71	Opopanacis coctio	129
Myrtidanum	ibidem	P	
N	N	Palma Elate	77
		Palmarum nuclei	ibi.
Nardi genera	71	Panaces	ibidem
			Panis

# I N D E X.

<i>Panis porcinus</i>	44	<i>guia</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pancreatium</i>	78	<i>Pissasphaltum</i>	<i>ibid.</i>
<i>Papaveris calyces</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pityusa</i>	<i>ibid.</i>
<i>Papaveris nigri capita &amp;</i>		<i>Pityusæ modus</i>	112
<i>folia</i>	78.79	<i>Pix arida</i>	81
<i>Papaveris lachryma quo-</i>		<i>Picis coctio</i>	129
<i>modo emplastra ingre-</i>		<i>Plumbaginis coctio</i>	<i>ibid.</i>
<i>diatur</i>	128	<i>Plumbum elotum</i>	82
<i>Pastillorũ tres species</i>	117	<i>Plumbum ustum</i>	<i>ibid.</i>
<i>Peplis</i>	79	<i>Plumbiusti coctio</i>	129
<i>Pepo</i>	<i>ibid.</i>	<i>Plumbi recrementum</i>	83
<i>Peucedanum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Polium</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pharmaca abstergentia</i>		<i>Polypodium</i>	<i>ibid.</i>
<i>184. &amp; seq.</i>		<i>Polypodij notæ</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pharmacum ex columba-</i>		<i>Pompholyx</i>	84
<i>rum stercore</i>	233	<i>Pompholygis coctio</i>	126
<i>Pharmacũ ex herbis</i>	234	<i>Populus</i>	87
<i>Pharmacorum sumptuoso</i>		<i>Propolis</i>	<i>ibid.</i>
<i>rum confecturæ ad ner-</i>		<i>Propolis coctio</i>	130
<i>uos vulneratos</i>	235	<i>Pruna</i>	87
<i>Phrygius lapis</i>	80	<i>Pruna prandium inchoa-</i>	
<i>Phu</i>	<i>ibid.</i>	<i>re debent</i>	88
<i>Piceæ fuligo</i>	<i>ibid.</i>	<i>Prunorum decocti modus</i>	
<i>Picis liquidæ fuligo</i>	<i>ibid.</i>	<i>ibidem</i>	
<i>Picinum oleum</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pseudocasia</i>	31
<i>Pini fuligo</i>	<i>ibid.</i>	<i>Pseudocinnanomum</i>	38
<i>Pinorum crucæ</i>	27	<i>Psoricum</i>	88. & 36
<i>Piper nigrum</i>	81	<i>Psyllium</i>	88
<i>Piscium fluviatiliũ pin-</i>		<i>Psyllium commẽdatur se-</i>	

# I N D E X.

mine	ibid.	Rhaponticum	ibid.
Pumex	ibid.	Rhu	ibid.
Pumicis coctio	130	Ricinus	ibid.
Punicum málum domesti-		Rosarum succus	92
cum & sylvestre	88	Rosei pastilli	ibid.
Pycnocomon	ibid.	Rosarum quæ præferenda	
Pyrites	44. & 89	ibidem	
<b>Q</b>		Rosæ damascenæ	93
		<b>S</b>	
Vo tempore, quibus		Agapenium	93
locis stirpes legere		Sagapenũ optimũ	94
conueniat	1	Sagapenum purgatorium	
<b>R</b>		non est	ibid.
		Sagapeni coctio	130
Adicum coctio	130	Sal	94
Resina liquida è pinu		Salis flos	95
& picea	89	Salis spuma	ibid.
Resinæ coctio	130	Salis coctio	130
Resina lentiscina	66	Salix	95
Resinæ	229	Samia terra	ibid.
Resinarum differentie		Samus lapis	ibid.
176. &	213	Sampsuchum	ibid.
Resinæ cur malagmatis mi-		Sandaracha	ibid.
sceantur	265	Sandarachæ coctio	126
Resinæ Colophonie du-		Sarcocolla	96
plex nota	265	Scammonia	ibid.
Rhabarbarum	90	Scammoniũ colligendi mo-	
Rhabarbari optimi notæ		di duo ex Diosc.	96.
ibidem		ex Mesuæ quatuor	97
Rhabarbarum correctore		Scam	
non eget	91		

# I N D E X.

Scammonio colligēdo tem	Spatha	77
pus accommodum 97	Spica	91
Scammonij optimi fidelis	Spodium	86
probatio 98	Spongiæ	102
Scammonium deterrimum	Squamma ex Acie decussa	
ibidem	10	
Scammonij dosis 98. & 99	Squilla	100
Schistus lapis 99	Stellatus lapis	43
Scilla ibid.	Styrax	103
Scordium 100	Styracis differentiæ & ele	
Seminum coctio 130	ctio	264
Sene 100	Sulfur	103
Serapionis error 41	Sulfuris coctio	130
Sertula Campana 68	Sycomori succus	104
Serum 101	T	
Seri lactis optimæ note	T Amarindi	104
ibidem	T Tamarindorum adul	
Sigillum Mariæ 44	teratio	ibid.
Simapi 101	Tamarindorum conserva=	
Simapifinus quomodo fiat	tio	ibid.
133	Terebinthina	ibid.
Simapifinus quibus utilis fit	Terebinthina quomodo ut	
134	ratur	105
Simapifinus quibus uitādus	Terra Ampelitis	ibid.
fit ibid.	Terra Chia	ibid.
Solanum hortense 101	Terra Cimolia	ibid.
Sori ibid.	Terra Eretrias	ibid.
Sori coctio 130	Terra Lemnia	106
Spartion 102	Terra Melia	ibid.

# I N D E X.

<i>Terræ omnis electio</i>	106	<i>Tithymalus Cyparissius</i>	
<i>Terræ Selinusia</i>	ibid.		ibidem
<i>Terræ cuiuslibet coctio</i>	139	<i>Tragacantha</i>	111
<i>Thapsia</i>	107	<i>Tragos</i>	ibidem
<i>Thapsiæ coctio</i>	131	<i>Tragoriganum</i>	ibidem
<i>Thus</i>	108	<i>Turpet</i>	ibidem
<i>Thuris fuligo</i>	109	<i>Tripolij dosis</i>	112
<i>Thuris cortex</i>	ibidem	V	
<i>Thuris lachryma quomodo emplastra ingrediatur</i>	128	<b>V</b> <i>Eratrum album</i>	113
<i>Thuris manna</i>	102	<i>Veratri albi dosis</i>	113.
<i>Thymelæa</i>	110	<i>Et</i>	114
<i>Thymelææ modus, siue do sis</i>	ibidem	<i>Veratrum nigrum</i>	114
<i>Thymus</i>	111	<i>Viole succus</i>	115
<i>Thymu dosis</i>	ibidem	<i>Vipera</i>	ibidem
<i>Tithymalus Characias</i>	106	<i>Viscum</i>	116
<i>Tithymalus Paralus</i>	107	<i>Vlceris canis curandi ratio</i>	
<i>Tithymalus Helioscop. ib.</i>		171. & seq.	
		<i>Vnguis odoratus</i>	116
		<i>Vnguentorum coctio</i>	131

# F I N I S.



# Apparatus, & delectus

SIMPLICIUM MEDI-

CAMENTORVM.

\*

*Quo tempore, quibus locis stirpes  
legere conueniat.*

EX PRAEFAT. DIOSCORIDIS.



**I**N PRIMIS curam impendere oportet, ut suis temporibus singula & demetantur & recondantur. certè pro horum ratione aut ualēt uiribus, aut euacido nulloq; munere funguntur. Sere-  
na igitur coeli constitutione demetenda sunt. Magni siquidem refert inter colligendum, si uel squalores uel umbres infesti sint: quemadmodum si loca, in quibus prodeūt, cliuosa, & uentis exposita sint & perflata, frigidaq; & aquis carentia. in his enim locis uires eorum longè ualidiores intelliguntur. Contrà, quæ in campestribus, riguis, & opacis, cæterisq; locis à uento silentibus enascuntur, plerunq; degenerant, & minus uiribus ualent: multoq; magis, si nō suo tempore, nec opportunè colligantur, aut si per imbecillitatē intabuerint. Neque ignorandum, sæpe pro peculiari loci natura, aut anni clementia, maturius aut serius adulescere. Nonnulla propria ui, hyeme florent & folia pariūt: quedam

bis anno florifera. Quare cui in animo est horum peritiam assequi, necesse est eum prima germinatione solo emergentibus, adultis, & senescentibus adesse. Nam qui pullulanti herbae duntaxat astiterit, adultam cognoscere non potest: neque qui adultam tantum inspexerit, nuper erumpentem noscet. Quò fit ut propter mutatam foliorum faciem, caulium proceritates, florum seminisq; magnitudinem, & id genus alias peculiares notas, nonnulli qui olim has rerum uarietates non perspexerunt, magno in errore uersentur. Quæ causa etiam nonnullis scriptoribus imposuit, qui herbas quasdam, uerbi gratia gramen, quinquefolium, & tusilaginem, emittere florem, fructum & caulem negant. Ergo qui sæpius ad uisendas herbas & earum natales se contulerit, earum cognitionem maxime consequetur. Scire etiamnum cõuenit, sola ex herbaceis medicaminibus ueratri genera, nigrum, inquam, & candidum, multis edurare annis: reliqua à trimatu inutilia. Quæ uerò fruticosa sunt, sicut stoechas, trixago, polium, abrotonum, seriphum, absinthium, byssopum, & alia id genus semine prægnantia demetantur.

Flores quoq; antea, quàm sponte sua decidant. Fructus autem, ut maturi decerpantur necesse est. Semina, ubi siccare coeperint, priusquam defluant. Herbarum succus, & foliorum elici debet, germinantibus tum primum cauliculis. Lac & lachrymæ excipiantur, inciso per summum adolescentiæ uigorem caule. Radices, & liquamenta, corticisue ut recondantur exunere conuenit, cum herbae suis folijs exuuntur. Siccantur etiã expurgatæ inibi, locis asperginem non redolentibus: sed quæ

quæ luto aut puluere sunt obsitæ, aqua elui debêt. Flores & omnia quæ iucundum odorem efflant, arculis ti-  
liaceis, nullo situ obductis reponantur. Nonnunquam  
charta aut folijs semina, ut perennent, aptè inuoluuntur.

Liquidis medicaminibus densior materia argentea, ui-  
trea, aut cornea cōuenit. Fictilis etiã, si modò rara non  
sit, accommodatur: & lignea, præsertim e buxo: sed ænea  
uasa ocularijs medicamentis liquidisq; & omnibus ijs,  
quæ aceto, pice liquida, aut cedria cōponuntur. Adipem  
autem & medullas stagnéis uasis recondi conuenit.

A



**ABSINTHII** existimatur li- Absinthium.  
quamentum herbæ eosdem præ-  
stare effectus. Attamen potioni-  
bus improbat, quoniam stoma-  
chum malè habet, & capitis ciet  
dolorem. Sunt qui cocta amurca  
liquamentum adulterant. Diosc.

Dosis. Eius decoctum, aut madesacti dilutum, seu, ut dosis absin-  
dicitur, infusio sumitur Mefuæ ab uncijis quinq; usq; ad thij.  
octo. Puluis à drachmis duabus usq; ad drachmas tres.  
Et succus à drachmis tribus usq; ad quatuor. Sed hic, ut  
diximus, inutilis stomacho capitiq; est. Eligendum est delectus.  
uulgare, quod generis appellatione Absinthium nuncu-  
patur. Reliquæ enim species stomacho aduersantur. At-  
que illud folia candida, læuia & plana habeat, & longè  
à mari sit semotum, atq; in solo libero crescat. Mefue.

**Acacia.** ACACIA in Aegypto nascens, habet semen lupino simile in folliculis. ex quo succus expressus siccatur in delectus. umbra, niger ex maturo semine, subrufus ex uiridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimunt ex folijs & semine succum. Manat & gummi ex ea spina. Lauatur oculorū medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonum halitu perflata. Praefertur eius spinæ gummi, quod in uermiculorū speciem contrahatur, & utri modo per luceat, ligni expers, proximum est candidum. sordidum uerò ac resinofum, inutile. Alterum ACACIAE genus in Cappadocia Pontog; prouenit, Aegyptiæ spinæ similitudine, uiribus iam dicto inferius. Diosc.

**Acorum.** ACORVM optimum est densum, candidum, plenum carie, non exesum, odoratum, cuiusmodi Colchidicum & Galaticum, quod aspletion dicunt. Diosc.

**Adeps.** ADEPS anserinus aut gallinaceus recens & sine sale conditus, ad uuluae uitia proficit. sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, uuluae inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tantopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligenter uase, flagrantissimo soli exponitur. eliquescent inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur. mox loco uehemēter frigido reconditur. & ad usus digeritur. Alij fictile fulciunt super aquam calidam,

dam, aut tenuem & elanguidam prunā, quæ solis uicem penset. Est & alia curandi ratio: Exemptis membranis teritur, coniectusq; in ollam eliquatur, adiecto minuti salis momento. mox lineo colo transfusus reponitur. Vti liter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant. Suillus adeps & ursinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimum detraclus, in largiore aqua cœlesti & quàm frigidissima, exemptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimendo ferme siccatur, subindeq; noua aqua abluitur. cæterum fictili capacitatis duplæ inditus, in aquam demergitur, & subditis leuib; prunis spatha mouetur: eliquatusq; colo transfunditur in aquam. ubi uerò refrixit, & guttatim aquam omnem exclusit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quò facilius sæculentum uirus pessum eat. postea in pilam spongia madefacta transfunditur. ubi coire cœpit, residens in imo sordes eximitur. tertio citra aquam eliquatur, repurgatusq; fictili bene operculato, perquàm frigidis locis reponitur. Hircinū seuum, ouillam, ceruinumq; ita curato: Elotum ex his quodcunq; tunicis, ut in suilli mentione dictum est, exemptis, pile emolliendum tradito, ac manibus fricato, affusa paulatim aqua, donec ne amplius quidem cruentū uirus excernatur, aut pingue aliquod innatet, sed nitida spectetur. deinde in ollam fictilem conijcito, & adiecta aqua ut superemineat, leui pruna liquefacito, & moueto, atque in aquam colato. cumq; refrixerit, iterū in loto fictili eliquato, & quæ antè diximus facito. tertio sine aqua

liquefactuan, in perfusam liquore pilam colato, refrigeratumq; , ut in suilli ratione diximus, recõdito. Bubulum autem seuum, renibus maximè detractum, exemptis membranis, aqua marina ex alto petita eluendum est : mox in pila trandum diligenter, affusa maris aqua. cum uerò dissolutum fuerit, in fictilem ollam coniiciendum, & marina aqua, quæ non minus dodrante superemineat, proluendum. decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrænicæ ceræ drachmis. excolationq; , detractis quæ possum ierant sordibus, in nouo fictili reponendum. operatumq; soli inter diu credendum, ut ad candorem reducat, & odoris uirus euanescat. Priuatim taurorum pingue sic curari debet : Renibus euulsum pingue profluentè annis aqua abluito, detractisq; tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salein insperferis, liquefacito. dein in nitentem aquam excolato : & ubi concretere cœpit, manibus iterum confricando uehementer lauato, aqua sæpius infusa refusaq; , donec quamoptimè elotum uideatur. rursus in olla cum pari modo uini odorati decoquizzato. & cum iterum efferbuerit, dempto ab igni uase, ibidem finito pernoctare. postridie si grauiter adhuc oleat, noua olla repetitum, uino odorato perfundatur. eadem quæ prius fiant, dum omne uirus euanescat. Colliquatur & sine sale, præsertim affectionum earum causa, quibus sal aduersari solet. sed ita paratum non inagnopere albescit. Eodem modo pardorum ac leonum pingua curari oportet. Taurinum autem & uitudinum pingue, necnon ceruinum, atq; etiam huius animalis medulla, odoramen

tis imbuitur, hac ratione : Pingue quod odoratum reddi debet, demptis, quo diximus modo, membranis, elotum & uino quamodoratissimo nullamtris aqua diluto seruefactum, pernoctare sinitur, alterum id genus uinū eadem mensura infunditur, colliquatur, & exquisitè colatur. nouenq; eius heminis, iunci Arabici septē drachmæ adiiciuntur. Quod si ipsum odoris fragrantioris fieri uoles, quadraginta floris eiusdem drachmæ, cum paribus palmæ, calami, & casie modis adduntur, & xylobalsani, aspalathi singulæ drachmæ, cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ uncie. omnia exactius tunduntur, & affuso uino odorato, in uase operto, quod supra carbones firmiter collocatum sit, ter efferverescunt, & semoto ab igni uase inibi pernoctant. postridie uinum effunditur, aliudq; generis eiusdem adijcitur. ter simili modo bene conferuescat, deinde matutinis exempto adipe uinum effundatur: & abluto uase, si quid imo subsidens hæsit, detergatur. postremò eliquatum pingue & excolatum, ad usus reconditur. Hoc autem modo odoramentis imbuitur, quod antea curatum est. uerū ante dicta prius inspissari solent, quò facilius sibi odoramentorum uires adsciscant. Itaq; assumens quodcunq; horū uoles, cum uino seruefacito, impositis unā myrti ramulis, serpillio, cypero, item aspalatho plenius tuso. aliqui tamen ad hunc usum, uno dimittunt horum contenti sunt. cum autem ter efferbuit, exemptum leniter, & liuteo colatū, aromatis, uti expositum est, imbuitur. Adipibus spissamenta sic fiunt (quemcunq; acceperis, oportet ut recens tundatur) Sacerus & sanguinis expers adeps, reliquas

habens notas quas sæpe retulimus, in ollam nouā demittitur, infuso uino albo, uetere, odorato, quod semipedis altitudinem superet. lento igni seruescat, dum uernaculus odor aboleatur, planèq; uinum redoleat. at ubi deposito uase refrixit, duæ adipis minæ in ollam mittuntur, & duo uini eiusdem sextarij, & seminis loti, eius inquā cuius è ligno ludicræ tibiæ faciuntur, tusi minæ quatuor adijciuntur. lento igni subinde miscendo decoquantur. cūq; odoris uirus euanuerit, excolatusq; adeps refrixerit, una contusi asspalathi mina, cum amaracini floris minis quatuor, & uetere uino subigitur. nocte una hæc odorem rapiunt, combibuntur. postridie in fictilem ollam tricongialem ea omnia cum adipe iniecta, additis sextarijs tribus uini, unā seruescunt, quousq; & uim & odorem spissamentorum adeps ipse contraxerit. qui eliquescent colatur, & reponitur. Quod si maiorem odoris fragrantiam efflagites, drachmas octo quam pinguis sinæ myrrhæ uino macerate, quod multos in annos asseruatum est, misceto. Gallinaceus anserinusq; sic odoribus imbui solent: Cuiusuis eorum percurati sextarij duo fictili olla excipiuntur. erysiceptri, xylobalsami, palmæ elatæ, & calami planè contusi, singulorum sesuncia admiscetur. uini Lesby ueteris cyathus unus adijcitur. ea ter efferuescunt prunis. mox uase sublato ab igne die noctūq; refrigerantur. postridie liquata per linteum crassum mundum in uas excolatur. ubi uerò adeps coierit, concha excipitur, fictiliq; nouo densius operto perfrigidis locis reponitur. Hyberno tempore id instituere oportet. æstate siquidem pingua non coguntur.

Nec



Nec desunt qui Tyrrhenicæ ceræ momentum adijciant, quò facilius in unum corpus omnia coalescant. Eadem ratione suillus adeps & ursinus cæteriq; id genus, odoramentis imbuuntur. Verum sampsuchi odorem adeps ipse repræsentabit hoc modo: Curati quamoptime adipis, præsertim taurini, mina una, tempestiuq; sampsuchi exquisitè confracti sesquimina miscentur, & insperso largiore uino digeruntur in offas, quæ in uase cooperito nocte quiescunt. matutinis in fictili olla leuiusculo igni, affusa aqua leuiter coquantur. dumq; suum adeps odorem exuerit, defæcatus ac bene opertus, nocte tota permanet. postero die deteresa sorde quæ pessum ierat, sampsuchi, ut dictum est, contusi iterum sesquimina priori pastillo adijcitur, eodemq; modo in offas cogitur. alijs quæ diximus peractis, decoquitur & colatur. & si qua fundo hæsit spurcitia, deraditur, & frigido loco reconditur. Si quis tamen incuratum adipem anserinum, gallinaceum, aut iatulinum, à putredine tueri uelit, ita faciendum est: Quemuis adipem diligenter clotum & siccatum in umbra super cribrum per linteamunda manibus uehementer exprimat, linoq; consutum umbroso in loco suspendat. & post multos dies noua charta inuolutum, frigido loco recondat. Pinguis autem indito melle uindicantur à putredinis uitio. Diosc.

AERIS FLOS, quem nonnulli clauorum ueterum Aeris flos. psegina, quasi resegmen aut segmentū, nominarunt, optimus est friabilis, in attritu fuluescens, nilij effigie, & numero, breuis, pōderosus, modicè splendens, atq; constringens, qui delumatam æris scobem non recepit, qua sæpe

adulteratur. Sed id facile deprehēditur, cum dentiū illi-  
su, dilatantur ramenta. Fit autem, cum æs fornacibus fu-  
sum, in receptacula delabitur, per cola fistularum ad ea  
pertinentiū. tum huic negotio additi ministri, sordes  
expurgantes, aquam clarissimam infundunt, refrigeran-  
di proposito. Itaq; repentino concretu, ac addensatione,  
uelut expuitur, & erumpit antedictus flos. Diosc.

Aeris squam-  
ma.

AERIS SQVAMMA excussa ex Cyprijs officina-  
rum clauis, crassa quidem ipsa præstator quæ belitis, id  
est clauar is, nominatur. sed ex uili promiscuoq; ære, aut  
candido, uitiosa intelligitur. Quam, utpote tenuē & ina-  
validam, dānamus, maximē approbātes crassam, rufam,  
præsertim si aceti respersu æruginem cōtrahat. Laua-  
tur hoc modo: Siccæ aeris squammæ expurgatæ selibra,  
cum nitida aqua in mortario manu diligenter conturbat-  
tur quousq; pessum ierit. abijcitur quod subsidit, & ef-  
fusa aqua, hemina coelestis imbris adijcitur, & distenta  
manu, squamma, quasi destringenda sit, uehementer con-  
fricatur. dumq; lentorem emittere coeperit, aqua sensim  
ad sex heminas usq; superinfunditur, terendo ualidé.  
squamma ad latus mortarij colligitur, ibiq; apprimitur.  
quo facto, expressus humor pyxide ex ære rubro facta,  
excipitur. hoc est enim uelut flos squammæ, ualens uiri-  
bus, & ad ocularia medicamenta cum primis efficax.  
Inutile imbecillumq; quod superest, lauatur donec nullā  
prorsus lentitiā excernat, & linteo opertū biduo con-  
quiescere sinitur, effusāque extante aqua, ubi siccatum  
erit, reconditur pyxidicula. Alij ut cadmiam lauant, &  
reponunt. SQVAMMAE ex acie, aut mucronibus des-  
cussæ,

Squammæ ex  
acie.

cussa, quam uocant stomoma, eadem uis. Lauatur modo simili, & reconditur. Sed ad moliendam alui deiectionem inefficacior est. Diosc.

**AES VSTVM** probatur rubrum, & quod contritu **Aes vstum** colore cinnabarim imitetur. nigrum uerò, plus quàm deceat, exustum est. Fit autem è clauis solutarum nauium, fictili crudo cōpositis, subperso sulphure cum sale pari, omnibus uicissim insparsis, fictile, circumlito figulari creta spiramento, fornacibus inditur, donec siglinum percoquatur. Quidam pro sulphure & sale alumen inspariunt. Alij sine sulphure ac sale, fictili multos dies urunt. Alij sulphure solo utuntur, fuliginem tamen excutiant. Alij oblitos scissili alumine clauos, cū sulphure & aceto, fictili crudo cremant. Alij in aenea olla aceto respersos, urunt, & iterum ac tertio idem efficiūt, postea recondunt. Principem locum tenet in Memphis combustum, proximū in Cypro. Lauatur ut Cadmia, mutata quater die aqua, donec nulla prorsus sordes emergat.

**AERIS SCORIA**, id est, recrementū eodem modo **Aeris scoria** lauatur, & eandem uim sed imbecilliores habet. Diosc.

**AERUGO** rasa fit ijs modis: In cadum aut aliud con simile uas acetum quam acerrimum infunditur. superpo= **Aerugo** nitur inde inuersum aeneum uas, praesertim concaneration: sin minus, planum. sitq; obstructum, nullumq; habeat spiramentum. exempto, quo doliolum obturaueris, operculo decimum post diem, insidens aerugo deraditur. Aut aeris lamina in cadis super acetum ita suspenditur, ne ipsam attingat, & totidem post dies raditur. Aut massula aeris, aut lamina una plures ue, uinaceis non recensibur,

tibus, sed iam acescentibus cōduntur, & simili modo uersantur. Quinetiam ex delinata æris scobe æruginem facere licet. nec non è laminis, quibus bractæ auri conclusæ malleo ducuntur: si quis eas aceto respargat, & ter aut quater uerset, donec æruginem contrahant. Tradunt æruginem in Cyprijs metallis gigni, lapidibus quibusdam nonnihil æris habentibus, quibus ærugo efflorescit. adduntq; per caniculæ æstus, è quodam specum manare: sed illam paucam & optimam esse: hanc speluncis effluentem, copiosam quidem, & boni coloris, sed uitiosam, quòd lapides multos collegerit. Pluribus autem modis adulterant. aliqui pumice admisto, alij marmore, alij atramento sutorio. Sed deprehēdemus pumicem aut marmor, dum pollice sinistræ manus madefacto, æruginis portiunculam altero atterimus. siquidem eam diffundi constat. marmoris autem pumicisq; partes, coeunt non dissipatæ, deinumq; tractatione crebra & humoris complexu dealbescunt. quin & dentium appressu. siquidem sincera cedit, læuis, & sine asperitate. Atramentum uero sutorium igne coarguitur. nanq; si fictile, aut lamina, adulterata ærugine illinatur, & feruenti cinere aut carbombus incalasciat alterutrum, mutabitur, rubescetq; id quod atramentum sutorium acceperit: quòd id ustum suapte natura talem sortitur colorē. Aeruginis quæ uocant scoleciam, duo sunt genera. quædam fossilis est. altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi acrisq; pistillo capreo conterito, donec strigmenti crassitudinem imitetur. deinde aluminis rotundi drachmam unam, cum salis fossitij, translu

translucentis, aut marini quàm albiſſimi, ſolidiꝫ, aut cer-  
 te cum nitri pari pōdere terito in ſole, æſtuoſiſſimis die-  
 bus, ſub ſyduſ caniculæ, donec colorem æruginis cōtra-  
 bat, & concretu ſtrigmentofum fiat. ubi autem ſe in uer-  
 miculorum Rhodiæ ſimiliu ſpeciem coëgerit, recon-  
 dito. Efficax & ualde boni coloris redditur, ſi duas par-  
 teis urinae ueteris, cum una aceti adieceris, & alia, quæ  
 dicta ſunt, peregeris. Sunt qui æruginem raſilem, quæ in  
 apparatu non reſpondit, gnommi miſto digerant in for-  
 mas, & ita uendant. quod genus, ut uitioſum, improba-  
 tur. Fit & quædam ærugo ab aurificibus, mortario &  
 piſtillo Cyprij æris, cum urina pueri impubis, qua aurū  
 ferruſ ſoluant. Antedicta æruginum genera, uſto æri om-  
 nino reſpōdent, ſed magis eſſectū ualent. Sciendum ſoſi-  
 lem ſcolecia præſantiſſimā eſſe: de raſam ſequi: poſtre-  
 mo loco factitiā. mordaciſſima tamen eſt hæc, & magis  
 adſtringens. aurificū autē ærugo raſæ reſpondet. Dioſc.

AGARICI duo genera. ſœmina, quæ præſertur, Agaricum.  
 rectis intus uenarum diſcurſibus conſtat. mas rotundus  
 eſt, & undiq; compaſtior. Vtriq; guſtus in initio dulcis,  
 mox in amaritudinem tranſit. Gignitur in Sarmatiæ re-  
 gione, quæ Agaria dicitur. Dioſc. Agarico ſœminæ  
 quinq; hæ præcipuè dotes ex ſapientum opinione tri-  
 buit Meſue, nempe ut ſit albus, leuis, friabilis, admodū  
 rarus. Paulus eligendū conſulit albiſſimum, quod delectus.  
 facillimè frangatur, nec ſit ualde lignoſum, aut perfora-  
 tum. Noſtri quoq; pharmacopola unum bonitatis indi-  
 cium eſſe affirmant in Agarico, cū eſt friabile. Dioſc. Dioſcorides.  
 ſcorides tamē infirmum illud Agaricum eſſe dicit, quod  
 friab

friabile est. Cuiusmodi esse adfirmat, quod in Galatia & maliagarici Cilicia in cedris gignitur. Leuissimum, optimum: densum, graue & lignosum, deterrimum lib. de Antidotis Gal. Mari pariter & sceminae commune est, ut in primo dosi. gustu dulce appareat. Contriti Agarici potio est Mesuae à drachma una usq; ad duas. Eiusdē uero decocti seu infusionis (ut loquitur) dosis est eidem à drachmis duabus usq; ad quatuor. Datur obolis quatuor contritū, Plinio, ex aceto mulso. Aëtius drachmas duas ex oxymelite uel melicrato propinat. Dioscor. modò obolos duos, modò tres: modò drachmā unā, modò duas exhibet, pro uiribus, ætate, & morbi ratione: nunc ex aqua, nunc ex uino: his ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa. Mesue.

Alcyonium. ALCYONII quinque esse genera compertum est. unum enim spissum, acerbi saporis, spongiosa facie, item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in litoribus inuenitur. alterum pinnulae oculorum aut spongiae simile, fistulosum, & leue, odorem algæ referens. tertium uermiculi forma, & colore magis purpureum, quod Milesium quidam uocant. quartum succidis uelleribus non dissimile, multis inanitatibus hians, leue. quintum figura fungi, sine odore, asperum, parte interna quodam modo pianicosum, foris leue, acre. quod plurimum in propontide iuxta insulam Besbicon appellatā gignitur, patrio nomine halos achnen uocant. Si quisquā alcyonium cremare uelit, cum sale in crudum fictile mittat, & oblinens uasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinū percoctum fuerit, extrahens ad usus recondat. Lavatur, ut Cadmia. Diosc.

**ALOE** plurima præpinguisq; in India gignitur, ex Aloë:  
 qua coactus succus adfertur. Nascitur etiam in Asia &  
 Arabia, in locis quibusdam maritimis: & in insulis, ut  
 in Andro, non ualde succo extrahendo idonea, sed ad  
 glutinanda uulnera sanè quàm utilis, si detrita illinatur.  
 Duo succi genera, quoddam arenosum, quod sedimentũ  
 purissimæ esse uidetur. alterum ad iocineris imaginem  
 uergit. Eligi debet boni odoris, syncera, quæ nihil delectus:  
 doli sensit, nitida, calculorum expers, rufi coloris, fria-  
 bilis, ac iocineris modo coacta, facillè liquefcens, eximie  
 amaritudinis. improbatur nigra & fractu contumax.  
 Gummi eam adulterant. quod deprehenditur gustu, ama-  
 ritudine, & ualido odore. eoq; argumento, quòd digitis  
 friata non ad minima usq; frustra resoluitur. Nec desunt  
 qui acaciam immisceant. Oculorum medicamentis torre-  
 tur, in munda & candenti testa, pennaq; subinde uersa-  
 tur, ut possit æqualiter torrerì. Lauatur, ut quod sit are-  
 nosissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pin-  
 guissimum assumatur. Diosc.

Optima Aloë censetur,

Pinguis.

Nitida, splendida ac syncera.

Calculorum expers, Diosc. & Aëtio. hoc est  
 non lapidosa aut arenosa.

Iocineris modo coacta. Diosc. densa Aëtio.

Iocineris colore & subfulua, Aëtio.

Rufi coloris, Diosco. aliàs subflaua.

Facile liquefcens, seu humescens.

Friabilis.

Odorata.

Eximie amaritudinis. id est, amarissima.

Optimæ aloë  
 es notæ.

Saporis etiam parum astringentis, Galeno.

Nigram duram, fractu contumacem, tanquam improbam atque inutilem reijcito.

**Dosis.** Dosis Aloës in substantia Mesue est ab aureo uno ad drachmas duas. Macerata uerò Aloës portio eidem est ab aureo uno usque ad drachmas tres. Aëtius drachmas duas Aloës exhibet cum melicrato, uel tres aut quinque pilulas, citrij uel brassicæ succo exceptas, magnitudine ciceris, his qui ea opus habent. Aliqui à drachmis duabus ad quatuor exhibent. Mesue.

**Alumen.** Omne ALUMINIS genus ferè in Aegypto, & in eisdem metallis inuenitur. etenim scissile quoddam, quasi flos glebosi intelligitur. Gignitur & in alijs quibusdam locis, in Melo, in Macedonia, in Liparis, Sardinia, Hierapoli Phrygiæ, Aphrica, Armenia, & plerisq; alijs regionibus, sicut & rubrica. Plurimæ eius species. uerum ad medendi usum, scissile, rotundum, & liquidum expetuntur. Optimum est scissile, præsertim recens, candidissimum, gustu perquam adstringens, graue olens, calcu-  
lorum expers, nec glebulose aut assulose compactum, sed sigillatim in capillamenta quædam canescētia debiscens, quale est quod trichites, quasi capillare nominatur, in Aegypto natum. Reperitur quoq; lapis huic alumini persimilis, qui gustus iudicio dignoscitur, quod non adstringat. Dannatur in rotundi genere, quod manu confectum est, sed ex figura deprehenditur. Assumendum autē suapte natura rotundum, bullis turgens, albo propius, atq; ualidius adstringens, præterea nonnihil palloris cum quadam pinguitudine præ se ferens, sine arenis, friabile, natione



tione Aegyptium, aut ex insula Melo. Liquidum probatio, ut sit limpidum, lacteum, æquale, & semper succo madens, sine lapidibus, atq; quendam coloris igniculum expirans. Diosc.

AMMONIACVM serulæ succus est, quam iuxta Cy Ammoniacū reuen Aphrica gignit. cuius fruticem cum radice agasylim uocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est friaturan, appellant: quod uerò terram & calculos collegit, phyrana. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante serulacea arbore. Diosc.

AMOMVM exigue fruticat, ex ligno se conuoluens Amomum. in racemi modum: flore, ceu candidæ uiolæ, paruo: folijs uitis albæ simulibus. Laudatur quammaximè Armenia cum, fuluo auri colore, ligno subrufo, ualde odorato. Medicum, quoniam in campestribus & aquosis enascitur, infirmus esse constat. Est autem magnum, subuiri de, tactu tenerum, frutice uenoso, odore origani. Ponticum uerò subrufum, paruum, fragile, racemosum, fructu tur gens, & odore nares feriens. Deligito recens, electio. candidam uel subrubrum, quod nec astrictum cohereat, nec conuoluatur, sed solum diffundatur, seminis plenum, uuis paruis simile, graue, odoratum, modò cariem non cōtraxerit, acre, gustu mordens, simplici colore non euariante. Adulteratur herba amomo simili, quæ Amomomis uocatur, sed sine odore, sine fructu. Nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiuscemodi probatio=

nibus fragmenta fugienda sunt : eligenda autem, quæ ab una radice integros surculos emittunt. Diosc.

Amurca. AMURCA expressæ oliuæ recrementum est. decocta in cupreo uase ad crassitudinem mellis adstringit, cæteros præbens licy effectus, insuperq; alios. Diosc.

Amygdale dulces. AMYGDALAE dulces cibo idoneæ: sed multo minus ualent in remedijs quàm amaræ. Diosc.

Amylum. AMYLUM ex eo appellatū est, quòd sine mola fiat. Optimum ex trimestri, natione Creticum aut Aegyptiū. Ratio faciundi amyli hæc est: Purgatum trimestre triticum madescit quinquies die, & si fieri potest, nocte. cum emollitū fuerit, effunditur sensim, sine agitatione, aqua: quò minus cremor utilis unà excludatur. ubi mollissimū esse uidetur, mutata aqua pedibus calcari oportet. rursum infusa, ter. tum demum enatantes ibi surfures in cerniculo eximendi. reliquumq; quallo sportusq; siccātū tegulis nouis confectum torreatur flagrantissimo in sole. namq; si paulisper uidum maneat, acorē concipit. Fit etiā amyli ex zea, quæ maceratur, ac eluitur uno aut altero die, & subactæ farine modo manibus subigitur. pressaq; feruentissimo in sole, ut antè retulimus, exiccatur, nullius in medicina usus. ad alia tamen cōueniens. Diosc.

Anisum. ANISVM melius semper recens, plenum, non sursum, odore præstans. inter prima laudatum est Creticum, proximo loco Aegyptium. Diosc.

Aqua. De AQUIS in uniuersum decernere, propter locorum proprietates, & peculiare naturas, cælum, & alia pleraque, difficile est. Magna tamen ex parte optima est dulcis, sincera, nullius omnino qualitatis particeps. & que

que ne minimo quidem tempore in præcordijs cõmoratur. ad hæc, quæ & facili uia fertur, & citra molestiã, nec inflationes creat, & minime computrescit. Diosc.

ARGENTI spuma quedã gignitur ex arena, quam Argenti spuma. molybditin uocant, in fornacibus conflata, donec perfecta. Et igni incandescat. altera ex argento. tertia ex plumbo. Probatissima est Attica, secunda Hispaniensis. hæc sequitur quæ fit Dicearchiæ, id est Puteolis, Baijs, in Campania, & Sicilia. plurima enim hisce locis est flagrantibus laminis plumbeis gignitur. Quæ flauo colore splendet, chrysitis appellatur omnium optima: quæ in Sicilia, argyritis: quæ ex argento, calabritis. Vritur argenti spuma, confractis partibus ad magnitudinem iuglandiũ, prunæ superpositus: ita accensa follibus, ut conflagret, abstergitur infidens spurcitia, & reconditur. Aliqui ter aceto aut uino restinguentes, rursus urunt, & eadem præsequuti, reponunt. Lauatur ut cadmia. Vt argyritidi nominatae, aut, si desideretur, alteri candor detur, ea in partem magnitudine fabarum confracta, choenice atticæ mensura, fistili nouo superfusa aqua, addito candidi tritici paripondere, priuatimq; pugillo hordei, limbeolo puro, raro, ansulis uasis alligato, coquitur, donec hordeum fractum dissiliat. deinde omnia in nouũ craterem oris ampli transfunduntur. triticum abijcitur. spuma argenti uehementer manibus affricando infusa aqua lauatur, assiccataque in Thebaico mortario teritur, affusa feruente aqua, donec soluta fatiscat. excolata aqua, iterum tota die teritur, & uesperis infusa calida aqua sinitur. mane colis excernitur, alia infunditur, atque ter die excolatur. id septem diebus

fieri solet. postea additis ad singulas minas spumæ argenti, quinis salis fossilis drachmis, infusaq; calida aqua, ter die teritur, & addita aqua excolatur. cumq; inalbuerit, calida infusa, idem facito, dum nullam prorsus salsedinē resipiat. deinum ardētissimo sole siccata: ciecto prius humore, reconditur. Sin minus, muna spumæ argyritidis diligenter teritur, addito sale fossili trito, triplicato pondere, in fictile nouum conijcitur, aqua infunditur, ita ut superemineat. mouetur quotidie mane & uesperī, aquaque superinfunditur, priore nequaquam effusa. hoc fit triginta diebus. nanq; nisi moueatur, crassescit, usq; in duritiē testæ. Post hæc effusa leniter muria, in Thebaico mortario spuma argenti teritur, coniectaq; in fictile aquā continens, manibus diligēter agitur, mutata subinde aqua, donec nullum salsuginis indicium præbeat. deinde quod ex argenti spuma candidum apparet, in uas aliud transfertur, & reductum in pastillos, plumbea pyxide conditur. Alij spumam argenti in fabarum magnitudines confectam, in uentre suillo crudo ex aqua coquunt, dum uiscus eliquescent contabescat, exemptamq; cum sale pariterunt, & ut suprā dictum est lauant. Sunt qui salis libram unam, & spumæ argenti tantundem, in sole terāt, aqua continuē mutata, dum candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantā uis argenti spumam: ubi lana candida inuolueris, fictili nouo indita aqua, cum pugillo fabarum recentium repurgatarumq; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiscant, lanaq; non denigretur, exemptā argenti spumam, & altera lana inuolutā, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiciens. eadem

tertio,

tertio, quæ suprâ, facito. in summa, tantisper, dum lana iam non inficiatur. Insuper transfundens in mortarium, ad singulas salis fossitij libras, adycito octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensq; natri quàm albißimi cum aqua diluti drachmas quadraginta septem indito. iterum terito, donec satis candoris contraxisse uideatur. ita autem fundens eam ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, ubi considerare desierit, colato. tum nouam superadijciens aquam, manibus probè uersatam, finito ut confidat, ac rursus per colum traicito. alternis eadem proseguere, dum pura aqua dulcisq; effluat, & nullam salsedinem præ se ferat. postremo in fictile nouum translata, colato sensum omni humore, soli quadraginta diebus, sub caniculæ sydus exponito, & siccata utitor. Elotam autem constat ad oculorum collyria prodesse, & ad cicatricum fœditates tollendas, ad rugosas facies, et cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas. Diosc.

ARGENTVM uiuum fit ex minio, quod abusiue Argentum cinnabaris dicitur, patinis fictilibus, imposita ferrea con-  
vinum.  
 cha cinnabarin cõtinente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt. siquidem deterfa fuligò, quæ calici insidet, refrigerata in argentum uiuum cont. Quinetiam inuenitur in argenti fodinarum tellus, stillatim concretum. Alij per sese in metallis inueniri tradunt. Seruatur in uitreis, aut plumbeis, aut stagnéis, aut argenteis uasis. siquidem aliam materiam omnem exedit, & defluere facit. Diosc.

ARISTOLOCHIA RVM radices effodere mæsiæ Aristolochia

bus est tempestivum, ita desquamato terreno servatur. Quinque aut sex annos durant. Maxime cōmendatur Pontica, & in uno quoq; genere ponderosissima. Quæ oblonga radice, tenuiori q; est, gratior habetur: carnosissimi enim est corticis, unguentis quoq; nardinis conuenientissime dicata. Dosis Aristolochiæ Mesuæ est, à drachma una usq; ad aureum unum. Aëtius seminus Aristolochiæ surculosæ exiccati drachmam unam propinat, ad bilem pituitanq; expurgandam. Mes.

Armenius lapis.

Dosis Armenici lapidis.

Galenii documentū de lapidibus ablucendis.

ARMENIUM optimum esse Plinius dicit, quod maxime uiret, communicato colore cum cœruleo. Dioscorid. laudat Armenium, qui sit leuis, colore cœruleo, perquam æquabilis, calculo carens, & friabilis. Eadem quæ Chrysocolla præstat, sed inefficacius. Aëtius scrupulos quatuor eiusmodi lapidis offert. Alexander illoti scrupulos tres uel quatuor: loti uero quinque uel sex exhibet. Vult autem ut quinquagesies abluatur. Verumenimvero tutius iuxta Galeni sententiam fuerit, toties ipsum lauare, aquamq; tandiu mutare, donec pura ab omni sordide uideatur, omniq; sapore medicamento caereat. Quod Galeni documentum non tantum peculiari-ter de hoc lapide à Pharmacopola accipiendum est, sed in uniuersum de quavis re lapidosa quæ sit abluenda. Ceterum nō loti potio est Mesuæ à drachma semis, usq; ad sesquidrachmam, loti uero à drachma una usque ad drachmas duas. Mesue.

Asarum.

ASARUM alium instar albi Ellebori deijcit senis drachmis pota ex aqua mulsæ. Eius autem infusionis potio est Mesuæ ab aureis duobus, usq; ad drachmas quatuor:

tuor: & pulueris à drachma una usque ad aureos duos. Si autem ad exactum leuorem ac curiosè teratur, magis per urinas purgat, quàm per aluum. Idem auctor radicem hanc Asaron Græcis nuncupatâ, præfert quæ crassa & densa sit, iucundo odore, & sapore acri cum modica stypticitate. Optimum autem Asarum, nasci ait Electio. Plinius in Ponto. proximum in Phrygia. tertium in Illyrico. Mesue.

ASIVS lapis assumi debet pumicis colore, levis, sive Afius lapis. gossus, item friabilis, scissiles uenas lutei coloris ad inum actas habens. Eius flos, salsugo subflaua est, summo lapide insidens, compage tenui, colore in aliquibus albo, in alijs pumici simili, ad luteum uer gente. admotus lingue aliquantùm mordet. Longè ualidior est lapide. Diosc.

ASPALATHVS spinosus frutex nascitur in Istro, Aspalathus. Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula. quo ad unguentorum spissamētā unguentarij utuntur. Optimus est gra delectus. uis, detractō cortice rubens, aut in purpuram uer gens, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore, quod deterius habetur. Dioscorides.

ATRAMENTVM quo scribimus, fuligine è tedis atramentū coacta colligitur. in singulas libras gionis, ternæ fuliginis librarium. nus uncia adiiciuntur. Fit etiam è resinarum & pictoria fuligine, de qua paulo antè diximus. Assumitur autem fuliginis mina, gummis sesquilibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum fescuncia. Dioscorides.

ATRAMENTVM sutorium genere quidem unum atramentū & idem est, molle & concretum: sed in specie differē sutorium.

tias treis habet. unum nanque humoribus stillatim in cuniculos quosdam colatus, concrefcit. quare ab ijs qui Cypria metalla perficiunt, stillatitium appellatur. Petesius ipsum pinarion uocat, alij stalacticon, id est stillatitium, alterum simplici ratione fit in speluncis: postea transfusum in excauatos scrobes, concrementum capeßit. quod peßton, id est concretitium, propriè nominatur. tertium dicitur coctile, & in Hispania fieri solet. sed inutile, ac inualidissimum esse constat. Ratio parandi hæc est: Aqua madefactum decoquunt, mox in piscinas transfundunt, & residere patiuntur. hoc certis diebus coalescit, in complureis formulas digestum, tesserarum speciem reddentes, quæ racematim inter se coherescunt. Optimum esse creditur, cæruleum, graue, concretum, translucens. cuiusmodi stillatitium est, ab alijs lonchoton nominatum. proximum, concretitium. coctile uerò ad infectus & denigrationes, aptius cæteris esse cõpertum est. sed ad medicinæ usum inualidius esse, experientia docent. Vritur, ut paulo post in mentione chalcitis ostendemus. Dioscorides.

Auripigmentum.

AURIPIGMENTVM in eisdem metallis, quibus sandaracha, gignitur. Optimum existimatur crustosum, aureo colore micans, nulli materiæ permixtum, in squamas fissile, quale in Mysia Helleßonti nascitur. Huius duo genera fluxerunt. unum supra dictum est. alterum glandis effigie, pallidum, & colore sandarachâ mutans, glebosum, ex Ponto & Cappadocia defertur. quod etiã secundum locum tenet. Torretur in testa noua uiuis carbonibus subiectis: assiduòq; uersatur, donec igne flagret,



gret, & mutet colorem. deinde refrigeratum, tritumq;  
reconditur.

B



**B**ALANVS myrepsice, hoc Balanus my  
est glans unguetaria, praefertur replice.  
Dioscoridi, recens, & farcta, delectus ben.

item candida, & quae facile à pu-  
tanunibus soluitur, id est, quae  
suo cortice facile spoliatur. Plin-  
nius Petream, id est ex oppido  
quod Petram uocant, optimam esse dicit, nigro cortice,  
& candido nucleo. Errat Mesue qui Ben antiquum di-  
cit melius esse recenti. Glans unguentaria aluum sol-  
uit ex hydromelite, Dioscoridi, sed stomacho aduersa-  
tur. Drachmae pondere pota eidem auctori lienem absu-  
mut. Dosis eius est Mesue à drachma semis usq; ad dra-  
chmam unam & semis. Oleum quoque quod ex ea ex-  
primitur, uentrem potu ciet.

Glans vngue-  
taria.

Dosis.

**B**ALSAMVM in Iudaea solum quadà ualle & Ae- Balsamum.  
gypto nascitur. his diffèrens modis, scabritia, proce-  
ritate, gracilitate. Quod igitur tenui & capillacea coma  
est, theristrum uocant, quasi demessile. fortassis quoniã  
ob gracilitatem facile demetatur. Aestiuus sub ortu  
Canis ardoribus, arbor unguibus ferreis inciditur, ma-  
natq; è plaga succus, quem opobalsanum uocant: sed tan  
exiguo stillatu, ut annis singulis, ne plures quidem quàm  
seu septeniue cõgij cogantur. inibiq; pondus, duplo re-  
penditur argento. Succu probatio est, ut sit recens, ualide  
di odoris, sñcerus, non ad acorem uergens, dilui faci-

lis, lævis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed uariè uitiatur, musto ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani unguento: item susino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. quod maleficium facile deprehenditur. Nanque merus in lancam uestem susus, neque maculam facit, neque si eluatur notam relinquit: uitiatus autem inhaeret. & lac instillatus coagulat, quod adulteratus non efficit. Quinetiam syncerus in aqua aut lacte celerrime liquatur, coloreq; lactescit: uitiatus uerò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stellæ modum diffundens. Syncerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum ire, & ad ima siderē arbitrantur, postea dissipatum supernatāre. E ligni genere, quod xylobalsamum uocant, probatur recens, sarmento tenui, fuluum, odoratum, quadam tenuis opobalsamum spirans. Necessarius etiam seminis erumpit usus. quare eligatur flauum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum olens. Adulteratur semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur. Sed coarguitur magnitudine, inanitate, uirium ignauia, sapore piperis. Diosc.

**Bdellium.**

**BDELLIVM** alij bolchon appellant, alij madelcon. lachryma est Saracenitæ arboris. probatur gustu amarum, translucidum, taurini glutinis in morem, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac sordis expert, suffitu odoratum, ungui simile. Est etiamnum bdellij genus sordidum, nigrum, uberioribus glebulis in offas cōuolutum, aspalathi odore, ex India aduectum. defertur etiam à Petra oppido siccum, resinosum, liuescens, sed facultate secundum,

cundum. Adulteratur gummi. sed ita uitiatum non perinde gustui amaritudinem repræsentat, nec usque adeò suffitionibus odoratum. Diosc.

**BITVMEN** Iudaicum cæteris antepositur. Cuius Bitumen.  
probatio est, ut purpure modo splendeat, sitq; pondero delectus.  
sum, ac ualidum odorem uibret. nigrum autem & sordidum, uitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zacyntho, & Sydone. Liquidum inuenitur in Agragantino Siciliæ, fontibus innatans. quo utuntur ad lucernarum lumina, olei uice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant. nanque liquidi bituminis genus esse constat. Dioscorides.

**BRYONIAE** radice succus exprimitur Vere. Bryonia.

Dosis radice Fesceræ seu Alfesceræ, hoc est uitis al dosis Alfesceræ, id est Bryonia.  
bæ, præscribitur Mesue ab aureo uno usque ad aureos duos: & succi eiusdem, à drachma una, usque ad drachmas duas. similiter & Fesceresin, quæ eidem factionis Arabicæ auctori species est Alfesceræ. Mesue.

**BRITANICAE** folijs exprimitur succus, qui Britanica.  
igni aut sole cogitur. Dioscorides.

Simili modo ut cantharides, reconduntur **BVPRE** Buprestes: &  
**STES**, genera quædam cantharidum: & **PINORVM** Pinorum eru  
erucæ. quæ supra cribrum suspensum seruati cinere paul ex.  
lisper intostæ, reponuntur. Dioscorides.

**BUTYRI** fuligo. Colligendæ ex eo fuliginis ratio Butyri fuligo  
hæc est: Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fistiliq; operculato quod supernè in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos clibani modo habeat, crematur. & subinde aliud in absumpti locum suffusa

sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueris. penna pōt deraditur ad usus. Diosc.

## C

Cadmia.



AD M I A E ex generibus optima est Cypria, botrytis nomine, densa, modicè grauis, et in leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodij, quæ fracta cinerulenta est, et ærugiosa. Proxima habetur foris cœrulea, intus candidior, internatus uenarum discursibus, onychitæ lapidi similis. cuiusmodi sunt, quæ è ueteribus metallis effodiuntur. Quædam etiam placodes, id est crustosa, dicitur, segmentis quibusdam perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitim appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, et magna ex parte nigra. sed quæ testaceam faciem habet, terram amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botrytis nomine, et onychitis, utiles: reliquæ ad emplastra, et farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. ad eadem Cypria prodest. ex Macedonia uerò, Thracia, et Hispania delate improbantur. Gignitur cadmia ex ære in fornacibus candente, fuligine egesta flatu, et lateribus camesisq; fornacum inbærente. Prægrandes autem ac ferreæ sunt rudes, ab officinis appellatæ acestides, per summa fastigia cōnexæ et concameratæ, ut quæ ab ære iactantur sursum corpuscula cohæreant, et inibi detineantur. quæ cum spissius insident, in corpus cōcrescunt, et modò ge

dò genus unum eius, modò duo, modò omnia perficiunt. Extrahitur & cadmia in Cypro è monte qui Solis incūbit, cremato lapide cui pyritæ cognomen est. in quo etiā monte quædam quasi uenæ chalcitis, nysos, soreos, melanteriæ, cærulei, chrysocolle, atramenti sutori, diphrygisq; inueniuntur. Nec desunt qui cadmiam in lapidum fodinis inueniri tradāt, falsi quadam lapidum cognatione. qualis inuenitur & apud Cumas lapis, nullā sui uim ostendens. Ii eo deprehenduntur, quòd sunt cadmia leuiiores, nullumq; alienum mandentibus saporē exhibent. commanducatus item lapis, dentes offendit. cadmia, utpote cum cedat, esum non respuit. Alio autem discerni possunt argumento: Cadmia in farinam detrita, & aceto subacta, atque in sole siccata, coit. quod in lapide non accidit. Item tritus & igni appositus lapis, prosilit, & fumum igni similem eiaculatur. cadmia uerò quieta manet, fuliginemq; luteo colore aut æreo splendentem expuit, uario Zonarum discursu. Insuper lapis ignem expertus, atque refrigeratus, colorem mutabit, ac leuior multo fiet. sed cadmia nihil euariat, nisi quis eam multis diebus cremauerit. Fit & in argenti fornacibus candidior, ac minus ponderosa, sed uiribus nequaquam comparanda ærariæ. Vritur cadmia superior carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrei stercoris modo bullet. mox extinguitur uino Aminæo, quæ ad emplastra præparatur: sed quæ ad psorarum medicamenta præparatur, aceto. Alij hoc modo exustam conterunt in uino, rursumq; fictili crudo torrent, donec pumicosa uideatur. iterumq; tritam ex uino, teritiò urunt, donec

donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinēs. hoc spodij uice utuntur. Lauatur autem in mortario trita, effusa subinde aqua, dum sordidum nihil emergat. dein coacta in pastillos, reponitur. Diosc.

Calam<sup>o</sup> odoratus.

CALAMVS odoratus in India nascitur. melior est fuluus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum fistula, albicans, lentus in mandendo, & astringens, ac cum aliquanta acrimonia amarus. Diosc.

Calx uiua.

CALX uiua hoc modo fit: Marinorum buccinorum testas igni condito, aut feruenti clibano, nocte dimittito: postera die, si candidissimæ fuerint, extrahito: sin aliter, iterum urito, usque dum penitus albescant. Frigida deinde restinctas nouo fictili indito, diligenterq; uetere lacinia operculatas, integram noctem finito. Postridie si omnino in calcem mutatae uidebuntur, reponito. Fit etiā coctis fluuiatilibus calculis: item ex uulgari albo lapide, reliquis laudatior. Efficacissima recens, & aquas nondum aspersa. Diosc.

Cantharides.

E frumentis congestæ CANTARIDES ad recon= dendum idoneæ sunt. quæ fictili uase non picato cõduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum conuerso suspenduntur super aceti feruentis quàm acerrimi halitum, donec aestu exanimentur. postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes uariæ, luteis lineis, quas in pennis transuersas habent. promissoq; corpore, crasse ac blattarum modo per pingues. sed inertes ac imbecillæ, quæ unius sunt coloris. Dioscorides. Aliqui pennas pedesq; contra potarum ueneficia, remedio esse tradiderunt.

CARDAMOMVM optimum est, quod ex Coma- Cardamo-  
gene, Armenia, Bosphoroq; deuebitur. In India quoque mum.  
& Arabia prouenit. Eligi debet plenum, frangenti con-  
tumax, occlusum, fractumq;. Quod enim huiusmodi non  
est, exoletum iudicatur, & gustu acre, subamarum, &  
odore caput tentans. Diosc.

CASIA, cuius complura sunt genera, iuxta odorise- Casia.  
ram Arabiam gignitur, crassi corticis sarmento, folijs pi-  
peris. Eligenda est fuluescens, pulchri coloris, corali-  
amula, perquam angusta, longa, crassa, & fistulosa, gu-  
stu mordens, & cum aliquanto seruore astringens, aro-  
matica, uinoso odore. cuiusmodi est quæ ab incolis, achy  
appellatur: ab Alexandria negotiatoribus, daphnitis.  
Huic præfertur crassa, purpurea, & nigricans, Zigir co-  
gnomine, quæ rosam odore imitatur præcipui in medici-  
na usus. Secundum locū tenet antedicta. Tertia, cui mo-  
syletico blasto, id est germani cognomen est. Reliquæ ui-  
les, ut quæ asympheimon dicitur, nigra, insuauis, cortice  
tenui ac rimoso: & quæ darca, & kittò uocitantur bar-  
baro nomine. Simulior huic est PSEUDOCASIA, Pseudocasia.  
quàm ut explicari possit, quæ gustu coarguitur, cum nec  
acris, nec odorata sit, hærentemq; medullæ corticem hæ-  
beat. Inuenitur etiam lata quædam fistula, mollis, leuis,  
surculosa, quæ antedictæ præfertur. Damnatur candi-  
cans, scabra, hircinum uirus redolens, & quæ tenui fi-  
stula & scabra cute sit. Diosc.

CASIA fistularis, quam Græci veteres  
ignorarunt.

Siliquas CASIAE deligere oportet ponderosas, Casia fistu-  
laris.  
collum

collucentes, per plenas : quas si concusseris, inclusa intus  
 DOSIS. grana non obstrepant. Dosis medullæ Casiæ, est à  
 senuincia ad sescunciam, id est unciam unam & semis.  
 Mesue.

Castorium. CASTORIS eligi debent testes qui ex uno ortu  
 connexi sunt ( fieri enim non potest, ut gemini folliculi  
 in una membrana coniuncti reperiantur ) liquore intus  
 ueluti ceroso, odore graui, & uirus redolente, gustu  
 acri, mordente, ac friabili, naturalibus tunicis circunda-  
 to. Quem fraude aliqui corrumpunt, conijciētes in sollem  
 gummi, aut ammoniacū cum sanguine & castorio suba-  
 ctum, & ita exiccantes. Vanum est quod traditur, testes  
 ab ipsis euelli, & à sese abijci, quum uenatu ur gentur.  
 siquidem tangi nequeunt, ita, ut in sue, substricti. Opera  
 autem precium est, diuisa pelle melleum liquorem cum  
 cuestiēte tunica assumere, & siccātū potui dare. Diosc.

Cedrus, & CEDRVS arbor magna est, ex qua picem colligūt,  
 Cedria. quæ CEDRIA uocatur. Cedria optima est crassa, per-  
 lucida, grauis odoris. quæ dum effunditur, guttatim non  
 dissipata coit. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri o-  
 portet. quæ eandem quam picea fuligo uim præbet. Fit  
 & oleum, à cedria separatū, dum coquitur, uelleribus  
 supra halitum eius expansis, ut in pice. Eiusdem ad om-  
 nia usus. Diosc.

Centaurium magnum. CENTAVRII magni succum in Lycia exprimunt,  
 quo pro lycio utuntur. Diosc.

Centaurium minus. CENTAVRII minoris succi extrahēdi ratio : Le-  
 gitur herba semine prægnans, & diebus quinque mada-  
 facta, decoquitur donec superemineat aquæ. mox ubi  
 refria



refrixit, linteolo exprimitur. & eiecta herba, iterũ decoquitur, usque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recentem grauidanq; contundunt, atque succum fictili non picato exprimunt, & in sole, lignearum de assidue mouentes, inspissant. quod si quid concretum faucibus uasis adhaerescat, deradunt, reliquoq; humori permiscunt, noctu diligenter operiunt. namq; ros nocturnus, liquores coalescere non sinit. Quae autem siccis radicibus aut herbis liquamenta exprimuntur, decocta, ut in gentianae mentione retulimus, preparantur. sed quae ex corticibus humidis, aut contusis herbis faciliuntur, in sole, uti ante dictum est, coguntur. sic e thapsia, sic e mandragora, reliquisq; simulibus succus, sic ex acerbis uuis melligo elicitur. lycium tamen & absinthium, hypocistis & consimilia, decocta, eo quo diximus modo, coguntur. Dioscorid. Purgat aluum drachmae pondere sumptum in hemina aquae, cum exiguo salis, & aceti: hi- que centaurei. lemq; & crassos humores per aluum exigit. Maioris uero Centaurei radix duabus drachmis, & interdum drachma una bibitur Dioscoridi & Galeno. si febris sit, in aqua trita: ceteris, in uino. Medetur & morbis plurimis decocta succus. Mesue. Quod ad electionem attinet, falsum est quod scribit Mesue: Nempe minorem Centauream meliorem esse in omni re. Alia enim in re utraque prestantior est. Tagautius.

CERA optima est subfulua, suppinguis, pura, odore rata, & balitum qualem tenuis melleum referens, natione Pontica, aut Cretica. secundum locum obtinet candidans, & suapte natura pinguis. Candida fit hoc modo:

Ex ea radunt album syncerumq; atque transfundunt in uas, quod satis habeat marinæ ex alto petilæ, inspersoq; niri momento, decoquunt. cumq; iterum tertio in inferibuit, separatim uas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sorde, si qua sortè adhæsit. tum denuò indita noua maris aqua feruet, uti retulimus. & uase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactum, in ceram summam suspensa manu intingunt, quò celerius concreseat, & quamminima portio extrahatur. suscepto primo ceræ orbiculo, iterum uasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. orbiculi liuo confuti, interuacante spatio suspenduntur. & interdum, continuo sub sole, noctu subluna asperguntur, usque dum perfectè albescant. uerum si eximus ille candor desideretur, eadem facilitari, & identidem recoqui operæ præciū est. Nec desunt qui pro marina, in muria quam acerrima semel aut iterum excoquant. deiu laguncula tenui, rotunda, ansam habete, extrahunt. postea orbiculos, substrato affatim cesspite herboso, insolant, donec candorem summum contraxerit. Præcipiunt hoc obeundum munus uere, cum sol remissa uehementia humorem pariat, ut non facile liquetur. Dioscorides.

Cerui cornu.

CERVI cornu concisum, crudo fictili, luto circumlito, & in furnum indito, uritur donec albescat. id eadem miæ modo elotum, ulceribus oculorum & defluxionibus salutare est. Diosc.

Cerusa.

CERUSA fit hoc modo: Infuso in urceum oris lati, aut fictile labellum quàm acerrimo aceto, laminam plumbeam

bean supra fistilis spiraculum, subiecta prius arundinea tegete, firmato: superiectisq; uelaminibus, ne baliztum expir et acetum, ubi resoluta fuerit, defluensq; deciderit, humor em purum ad summa delatum colato, crassamentumq; transfundito. debet quoque siccari in sole, mox trusatili mola teri, aut aliàs tritum cribrari. postea quod superest duri in tenues partes redigendum, cribrandumq; . uicissim eadem tertio quartoq; facienda. Melior, quæ primò cribrata est, & medicamentis oculi delectus. lorum assumenda: secundum locum tenet, sequens: & reliquæ suo ordine. Nec desunt qui ligneas rudes, in medio uase appendant, & derafo ceu situ imposito, ita ut acetum non contingat, inditoq; operculo circumlinentes dimittunt. post dies decem laxato obturamento uisunt. cumq; resoluta materia fuerit, reliqua, ut suprâ diximus, exequuntur. Si autem quis in pastillos uelit digerere, acetum acri subacta, diuiditur in pastillos, qui in sole siccantur. Aestate tamen suprâdictum opus obeundum est. ita enim candida atque efficax redditur. Quinetiam hyeme paratur, urceis supra furnos, balnea, aut fornaces impositis, ascendens enim calor, idem quod sol præstat. Laudatissimam fieri putant Rhodi, & Corinthi, aut, Lacedæmone, proximam Puteolis. Torretur hoc modo: Flagrantibus igni carbonibus, fistili nouo, maximè Attico, tritam cerusam imposito, & assidue uersato. cumq; cinereum color em traxit, eximens refrigerato, & utitor. Est & aliud urendi genus: Trita patinis nouis supra prunas imponitur, & ferulacea rude mouetur, donec colore similis sandarachæ fiat. Extractaq; ad usus muni-

stratur . quæ uerò ita parata est, sandyx à quibusdam dicitur . Lauatur cerusa cadmiæ modo . Diosc.

Chalcitis. CHALCITIS præfertur similis æri, friabilis, nec lapidosa, nec inueterata, intercurfantibus oblōgis uenis, Pforicon. splendentibusq; . Diosc. PSORICON appellatum è Chalcite fit medicamentum, duabus eius partibus, cum una cadmiæ additis, & ex aceto tritis . oportet autem in fictili, obruere fimo, diebus quadraginta, per Caniculæ ardores, sic enim fit acrius . Idem quod Chalcitis potest . Alij pares utriusque portiones in uino terunt, & eadem prosequuntur . Vrinæ Chalcitis fictili nouo, uiuis carbonibus superposito . modus autem uestionis in his midioribus est, dum ipsa Chalcitis bullas excitare desierit, & perfectè inaruerit : in reliquis uero dum mutata in roseum colorem fuerit, & sanguineū aut iuniatum colorem contraxerit, tum demum eximenda est : insidens autem spurcitia flatu expellenda, mox reponenda . Torretur etiamnum per flatis carbonibus, usque dum luteo colore palleat : aut fictili subditis candentibus prunis, subinde uersata, donec igni conflagret & colorem mutet . Diosc.

Chelidoniū maius. CHELIDONII maioris folijs, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate, & siccatus in umbra digeritur in pastillos . Diosc.

Chrysocolla CHRYSOCOLLA laudatissima Armeniaca, colorem porri quàm sinillimè reddens, secundum locum sibi uendicat Macedonica : & proximum Cypria . quo in genere præfertur pura . damnatur, quæ terram aut calculos collegerit . Ratio lauandi hæc est : Tusam infusa aqua,

aqua, mortario expassa manu ad pilam uehementer fricato, & statim quam confederit, colato. alter an infundens aquam, rursum terito. Diosc.

CICUTAE succus exprimitur contusus cacumini- Cicuta.  
bus, priusquam senuna & comæ siccescant. qui sole den-  
satur in pastillos. Efficacissima uis Creticæ, Megarensi,  
mox Atticæ, & in Chio & Cilicia nascenti. Diosc.

Hallucinantur qui CINNABARIN minio eandem Cinnabaris.  
esse existimant. Miniū enim in Hispanijs ex lapide quo-  
dam argenteæ arenæ perusto, temperari solet. alioqui  
non dignoscitur. fornacibus autem in florentissimum fla-  
grantissimumq; colorem permutatur. in metallis uerò  
strangulantem halitum eructat. itaque facies incolæ ue-  
siciis obuelant, ut per illas spectent, nec respirando no-  
xium aërem attrahant. eo pictores ad sumptuosa parie-  
tum ornamenta utuntur. Cinnabaris uerò ex Aphrica  
defertur, & magno constat. hætenus inuenitur, ut uix  
uersicoloribus pictorum lineis satisfaciat. intento colo-  
re uec diluto præditum. quare quidam sanguinem esse  
draconis existimauerunt. Vim habet cinnabaris hæma-  
titæ lapillo eandem. Diosc.

CINNAMOMI genera plura, patrium sibi nomen Cinnamo-  
uendicantia. Præfertur tamen Mosyliticum, quod casia, mum.  
cui Mosyliti nomen est, aliquam referat effigiem. Sed in  
eo genere recens, nigrum, ex uinoso in cinereum uer-  
gens, læue, tenuibus ramulis, ac frequentibus nodis ciui-  
clum, perquam iucunde olens. Optimi serè indicium, iu-  
cundi odoris proprietate constat. Inuenitur enim cum  
optimo, eoq; quod peculiare est, odor rutæ aut cardamo

mo proximus. Insuper, acre, mordens, & cū calfactio-  
ne quadam tenuis salsum, quod non citò confricanti aspe-  
rum, aut frianti lanuginosum, leuibus tamen interno-  
dijs appareat. Si certior fieri uoles, uellito ab radice sur-  
culum. facilis est huiuscemodi probatio: nanque frag-  
menta miscellanea quedam esse uidentur. Quæ autem  
melius spirant, suo balitu cum nares primum consulun-  
tur, olfactum expleant, deterioris dignotionem impe-  
diunt. Est etiamnum montanum, crassum, pumilum, ful-  
uescens admodum. Tertiū à Mosylitico, perquàm suau-  
iter olet, nigrum, fruticosum, paucis intercedētibz ge-  
niculis. Quartum, fungosum, candicans, aspectu tubero-  
sum, uile, ac friabile, magnam habens radicem, quæ ca-  
siam planè repræsentat. Quintum genus, odore nares fe-  
riens, subrusum, & cortice fuluæ casie simile, tangenti  
firmum, minus neruosum, densa radice firmatum. Iis  
quæ thuris, casie, myrti, aut amomi odorem spirant, mi-  
nus suauitatis inest. Deligito scabrum, album, rugosum:  
at leue, & lignosum circa radicem, ut inutile reycito.

Est etiamnum simile aliud, cui pseudocinnamo cogno-  
men est, inualidi odoris, solitarumq; uirium. Vocatur  
etiam zingiber, cum tamen sit xylocinnamomum, præ-  
bens quandam cinnamomi faciem. Est autem lignosum  
cinnamomum, sarmenta longa robustaq; ferens, odore  
longè cinnamomo inferiore. Sunt qui xylocinnamomū  
à cinnamomo genere differre dicant, quod à natura eius  
abhorreat. Tritum uino excipitur, umbraq; siccatur,  
quò diutius eduret, reconditur. Est & quoddam cinna-  
momum, quod aliqui pseudocinnamomum appellant,  
perquàm

perquàm denso atque crasso sarmento, longe tamen inualidius cinnamomo, & odore & gustu. Dioscorides.

CNICVS redigitur in offulas, quas placentulas uocant, adiectis succo amygdalis, nitro, aniso, & melle decocto, quæ aluum emolliunt. Hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant, è quibus ante coenam duas uel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est: Cnici candidi sextarius, amygdalorum tostorum & delibratorum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, cum carnibus triginta caricarum. Cnici semen tunditur, & succus exprimitur. Diosc. Semen Cartami ex sententia Mesuæ Cartami deligendum est, candidum, planum, hoc est leue, grandiusculum, & plenum, cuius medulla est unctuosa & pinguis, cortice tenui. Paulus coquit drachmas quinque dosi. medullæ Cartami, cum Ptisana, & paucis salibus, ut educat aquam. Seminis tusi succus adiectis amygdalis, nitro, anetho, & melle decocto, cogitur in placentulas Dioscoridi, quæ aluum emolliunt. Hæ in frusta seu globulos quatuor finduntur, qui nucis iuglandis magnitudinē impleant, è quibus duas uel tres ante coenam sumpsisse satis est.

COCCVM optimum gignitur in Galatia & Armenia. deinde Asia & Cilicia. ultimum ex omnibus Hispanicum. Nasceitur quoque in Cilicia, è quercubus, cochlearum exilium similitudine, quod illius regionis mulieres ore legunt, & coccum uocitant. Diosc.

COERULEVS lapis præcessit in Cyaneo.

Cœruleus lapis.

Colocynthis duplex genus apud Mesuen.

Mesue duplex genus COLOCYNTHIDIS constituit. Nempe marem & foeminan. Mas grauis, durus, asper, nigricans, & lanuginosus est. Foemina eadem auctori praefertur mari, praesertim magna, siue ut dicunt grossa, laevis, laxa, candida, lenis, & perfecte matura: & cuius pars interior, siue medulla, pulposa, laxa, laevis, hoc est non aspera, & insigniter alba est. Colocynthis medulla Aëtio eligenda est, alba & mollis.

Siccior uero & nigricans, tanquam mala reicienda. Optima Venetijs enutur Colocynthis, & quae ex orientalibus regionibus, utpote calidioribus, ad nos aduehitur. Quae apud nos nascitur, inefficacior est, & aegre album soluit. Ceterum probatissima syluestris huius Cucurbitae medulla, siue, ut loquuntur pulpa antequam in usum assumatur, primum incidenda est. Deinde terenda diligenter, & saepius cribranda. At usus tempore rursum cum mulsâ in mortario exquisitissime subigenda. Id enim illi, inquit Aëtius, peculiare est, ut trita antequam madescat, subtilissima appareat: sed post mulsae infusionem ita intumescat, ut qui uideat cribratam, nunime putet. Quoddam igitur frustulum eorum quae intumuerint, saepe uentri aut stomacho inhaeret, saepius tamen intestinorum anfractibus implicatur. Cumque sit naturaliter acris & mordax, ulcerat intestina, & ob consensum neruis affectum inducit, torminaque parit & contractiones.

Cucurbitula syluatica diligentissime terenda.

Propterea exquisitissima diligentia ad ultimam minutiam redigenda est. Sed mulso prius aut rutae decoctio infunditur, tum exiccata in puluerem redigitur. Paulus & Auicenna, quem est Mesue secutus, ipsam Colocynthida



thida etiam plurimum teri iubent. Quoniam ( ut inquit Paulus ) nisi exactè teratur, asperæ eius partes interioribus hærentes, ulcera excitant, quibus nervi compatiuntur. Serapion autem contrarium, sed male, asserit, eam uidelicet non esse multū terendam. Dosis pulpæ Colocynthidis ad summum est decem ceratia Mesuæ. Paulus drachmam integram dare non ueretur, quæ eiusdem sententia, pendet ceratia decem & octo. Datur Aëtio Colocynthidis medulla scrupulorum duorum pondere, ex duobus mulsæ cyathis. Imbecillibus tamen, inquit, scrupulus sufficit. Quatuor obolis sumpta purgat Dioscoridi melle cocto, myrrha & nitro excepta, atque in catapodium coacta.

Serapionis  
error.  
Dosis.  
Mesuæ.  
Paulus.  
Aëtius.

CONYZAE genus tertium reliquis infirmius est. Conyza. Dioscorides.

CORALLIVM laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cædens, æquabili usquequaq; concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quam ramosissimum, forma fruticis, cinnamoni æmulum. Quod autem in lapidis duritiam coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, uitiosum existimatur. Quod Antipathes uocant, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet. Dioscorides.

Antipathes.

COSTVS præcellit Arabicus, candidus, levis, eximia odoris suauitate. Secundum locum sibi uendicat indicus, levis, uber, ut ferula niger. Tertius est Syriacus, gravis, colore buxeus, & odore feriens. Optimus est re-

cens, albus, abundè plenus, densus, aridus, à teredinibus non crosus, sine grauecolētia, gustu calidus, & mordens. Sunt qui admittis helenuij comageni præduris radicibus, adulterent. quod deprehensu facile est. Siquidem neque gustu seruet helenum, neque ualidum odorem uibrat, ut caput tentare possit. Diosc.

Cotonea  
māla.

COTONEA eligi oportet uera, quæ sanè sunt rotunda, parua & odorata. quæ uerò struthia dicuntur, magna quidem sunt, sed minus utilia. Diosc.

Crocodili fi-  
mum.

CROCODILI terrestris finum crocodileam uocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. Optima est candidissima & friabilis, anyli modo, minimè ponderosa, in humore statim eliquescent: quæ cum teritur, fermenti acorem quadam tenuis refert. Adulterant eam sturnorū fimo, quos captos oryza pascunt. ipsumq; non dissimule uendunt. Alij anylum aut cimoslian muscent, & adscito anchusæ colore per rarum cribrum paulatim exprimunt, ut se contrahat in uermiculorum speciem. qui siccati pro crocodilea ueneunt. Diosc.

Crocoma-  
gma.

CROCOMAGMA fit expressis unguenti crocini odoramentis, & in formas digestis. Optimum est odoratum, modicè myrrham olens, graue, nigrum, ligni exarspers, leue, subamarum, quod madefactum croci colorē reddit, gustatumq; uehemēter dentes ac linguam inficit, multis durans annis. quale est, quod à Syria defertur. Dioscorides.

Crocum.

CROCVM, optimum in medendi usu Coryceum, recens, & boni coloris, paulū candidi gerens in capreolo, oblongum, omnibus suis partibus constans, non fragile,

gile, plenum, à quo detractum est nihil, quod madefactū manus inficit, nec situm redolet, aut cariem sentit, suba- cre. sin huius generis non est, aut uetus, aut humore per- fusum creditur. Secundus locus datur Coryceo, è tractu Lyciæ contermino. Tertius Lycio, è monte Olympo. dein ex Aegibus Aetoliæ. Cyrenaicum & Centuripiniū inter Sicilica omnia uiribus infirmius est. Omnium natu- ra oleracea. Itali tamen ob succi copiam, & coloris ue- nustatem, tingendis mortarijs dicauerunt. quibus de cau- sis magno uenditur. Vtilissimum in medicina quod ante- descripsimus. Adulteratur immixto crocomagmate raso, atque etiam sapæ subtili: contrita, quò pondus adijciatur simul argenti spuma, aut plumbagine. sed maleficium deprehenditur puluerulento aspectu, & de fruti odore. Dioscorides.

CYANEVS, id est COERVLEVS. Cœrulei oris go ex ærarijs metallis in Cypro. copiosior ex arena li- torali, secundum quosdam sub cauatos specus maris inue- nitur: qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Uri- tur ut chalcitis. Lauatur ut cadmia. Diosc. Serapio præfert, qui perfectissimum colorem cyaneum habet, & guttas aureas admixtas, quiq; alterum lapidem mixtum non habet, nec facile frangitur. Nostri pharmacopole lapidem hunc imperfectissimum ostendunt: quippe cui eius color desit perfectus.

Animaduertendum est communi lapidis stellati no- menclatura Cyaneum simul, & Marchasitam, hoc est pyriten esse complexos Arabes. Dosis lapidis stellati Mesue est à drachma una usq; ad drachmas duas & se- mis.

Cyaneus, id est, Cœru- leus lapis.

Lapis stellat⁹ & Marchasita.

Dosis lapidis Stellati, id est Pyritis & Cy- anei.

mis. Reperio apud Galenū, & Paulū, ac reliquos alios scriptores medicos, Cyanon siue lapidem Lazuli, acri facultate esse præditum, & purgatoriā ac discussoriā vim habere. Pyriten uero quem Marchasitam uocant, nullus unquam (quod saltem nouerim) inter purgatoria medicamenta reposuit. Hic autem ualde discutit tumores, sanguinemq; in grumos concretum: cuius loco, cum eius copia non est, molari utuntur medici.

Pyrites lapis  
purgatorius  
non est.

Cyclamen.

Dosis radicis  
Cyclamini. i.  
Panis porci-  
ni.

CYCLAMINI succus exprimitur tusa radice, & dosi radicis ad mellis crassitudinem decoquitur. Diosc. Cyclami radix cum hydromelite pota, pituitam per inferna detrabit. Eadem cum passo aut diluto mulso trium drachmarum pōdere epota, arquat morbum, id est icteritiam discutit, siccata & scyllæ modo concisa reponitur. De altera Cyclamino (quam Sigillum Mariæ uocant) scribit Dioscorides, quod huius acini drachmæ unius pondere, in uini albi cyathis duobus, per quadraginta dies epoti, lienem per urinam & aluum paulatim absument. Dosis Arthanitæ Mesuæ est, ab aureis duobus usque ad drachmas quatuor, & proprie succi eius:

Dosis alterius  
Cyclamini. i.  
Sigillimariæ.

Aëtius.

Aëtius radicis cyclamini minutissime tritæ drachmas tres uel quatuor, pro uirtutis ratione ē mulsæ propinat, ad bilem & pituitam ducendam. Sed huic per sudorem præcipue purgat, seu potius euacuat.

Cypirus.

CYPIRVS optima est grauissima, densa, fractu con- tumax, plena & aspera, odoris cum quadam acrimonia iucundi, qualis est Cilicia, Syriaca, & quæ à Cycladi- bus insulis petitur. Aliud Cypiri genus tradunt in India nasci, gingiberis effigie, quod manducatum croci rum reddit,

reddat, gustu amaro, illitum psilothrum est. Diosc.

CYPHI thymianatis compositio est, dicata dijs, qua Cyphi thy,  
abunde Aegypti sacerdotes utuntur. In antidota misce= <sup>miana.</sup>  
ri solet. suffiriosis datur in potu. Permulte componen=  
di rationes, quarum una hæc est: Sumito cyperi dinia=  
dium sextarium, cum pari baccarum iuniperi adultæ  
modo: uuæ passæ pinguis, exemptis uinaceis, minas  
duodecim: resinæ repurgatæ minas quinque: calami &  
iunci odoratorum, & asspalathi, singulorum minan:  
myrrhæ duodecim: uini ueteris sextarios nouem, cum  
duabus mellis minis. uuan passam detractis uinaceis tu=  
sam, cum uino & myrrha subigito: cætera tusa & cri=  
brata adijcito. die uno humorem combibere finito: dein  
mel coquito, dum sibi glutinis asciscat crassitudinem. eli=  
quaton resinam accurate permisceto cum reliquis dili=  
genter contritis, & in fictile uas recondito. Diosc.

CYPRVS optima nascitur in Canope, & Ascaloz Cyprus.  
ne. Diosc.

## D



IPHRYGIS tria genera est Diphryges.  
se creduntur. Quoddâ enim me=  
tallicum est, quod in Cypro sola  
gignitur. lutosum nanque extra=  
bitur, ex luto cuiusdâ inibi spe=  
cus: extractum, sole siccatur,  
mox circumpositis sarmentis u=  
ritur. diphryges ideo uocatum est, quod & à sole & à  
sarmentis uratur, crescat, & ferme torreatur. Alterum  
perfecti aris, quasi subsidens fæx est. siquidem post fri=  
gidæ

gidæ aque offusionem, ut suprâ retulimus, cum de flore æris differeremus, sublato ære, fornacũ ima parte coherens id genus inuenitur, & adstrictionẽ & gustum æris habens. Tertium sic fit: Lapidẽ pyriten, ut calcem multos dies cremât in camino: cumq; colorem rubricæ contraxerit, eximẽtes recondunt. Quidã tradunt, hoc ex sola materia quæ lapidẽ æris gignit, fieri: quãdo in dictis arẽis assata & in scrobes translata perurit̃ur: tunc e nim ambientem scrobis locum cõprehendit, & exemptis lapidibus nihilominus inuenitur. præfertur quod sapore æris reddit, æruginisq; adstringẽs, & uehementer excicans linguam. quod sibi exusta ochra nõ uendicat: quæ cremata, diphyrgis uice uenit. Diosc.

**Dipsacum.** DIPSACI radix tusa & decocta in uino, usq; dũ sit crassitudo ceræ, sanat rimas sedis & fistulas. Medicamentum ærea pyxide recondendum. Diosc.

**Dracūculus.** DRACUNCULI radix messibus effoditur, lotaq; frustatim cõciditur, & lino traiecta, siccatur in umbra, & ita reconditur. Diosc.

**Dulcis radix** DULCIS radiceis succus exprimitur è radicibus, qui densatur lycij exemplo. Diosc.

## E

**Ebenus.**



BENVS optima habetur æthiopica & nigra, nullos habens uenarum discursus, facilius corneus leuore. cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. sufficit iucundo odore supra carbones, sine fumi tedio.

tædio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinē accenditur, & trita ad cotem flauescit. Altera est Indica, internatis segmentis candicantibus, & modice fuluis, item frequentibus maculis. cæterum prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamina, aut spinea ligna consilia pro ebena ueneunt. quod discernitur ex eo, quod fungosa sunt, & in purpureas assidas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentiæ in suffitu præsentia. Diosc. Ebenus uritur in fictili nouo donec in carbones redigatur. Lauatur plumbi usti modo, & ita siccis scabrisq; lippitudinibus conducit. Diosc.

E fructu syluestris cucumeris, fit medicamentum quod ELATERIVM uocatur, ad hunc modum: De Elaterium. cerpti cucumeres, qui tacti protinus exiliunt, seruantur nocte una. postridie imposito supra craterē rariore cribro, utrisque manibus prehensi, sigillatim supino cultro, sursum uersus aciem habente, finduntur, atque per cribrum humor in subiectum uas exprimitur: simulq; cænosum quod hæsit cribro, quò facilius excidat, eliditur. quod ita pressum est, residere sinitur, atque in uicinam peluam demittitur. coaceruata autem in cribro segmina, dulci aqua perfunduntur, & denuò pressa abijciuntur, humor in pelui agitatur, & linteo opertus, soli exponitur. dumq; steterit, tota supernatans aqua cum humore concreto, effunditur. hoc uerò identidem fieri solet, donec existens aqua liquecat: qua stillatim exhausta, sedimentum mortario suscipitur, & conterendo cogitur in pastillos. Sunt qui ad hauriendam protinus succi abundantiam, cribratos cineres humi inspargant, & medium

cauantes, triplicatum linteum obtendant, per quod elaterium cum sua humiditate diffundunt, siccatumq; in pila, ut dictum est, conterunt. Aliqui pro dulci aqua marinam persuadentes, ita eluunt. Alij in nouissima lotione,

delectus. *mulsam aquam respergunt.* ELATERIVM optimum esse constat, læue, non ponderosum, cum candore leniter humectum, gustu amarissimum, quodq; lucernarum luminibus obiectum, facile flagret. Porraceum tamen scabrumq;, si turbidum spectetur, atque et uicinisq; plenum sit, graue & uitiosum esse solet. Nec desunt qui cucumis succo, amyllum immisceant, ut candorem ipsum & leuitatem imitetur. Elaterium usu purgationum à bimatu incipit esse tempestiuum Dioscoridi, duratq; decennio. Mesuæ conseruatur solum triennio, & post sex menses administratur. Theophrastus ducētos annos uim eius pollere adfirmat. Quo uetustius, eo esse melius dixit Plinius.

dos. *Maxima potio Elaterij est solidus obolus, Dioscoridi: minima mensura, semiobolus. Pueris sufficit diachalcon, id est calci duo, hoc est pondus granorum quatuor. Si maiore copia sumatur, periculosum est. Bilem pituitamq; alterutra parte extrahit. Vetandi autem sunt dormire, qui potant.*

Epithymū. EPITHYMVM nasci plurimum in Creta & Syria Mesue scribit. Cui etiam auctori præfertur Cretense, subrusum, & acuti, ut loquitur, odoris. Diosc.

dos. Epi- *Mesue pulueris Epithymi drachmas septem exhiberi posse statuit. Cum tamen ueteres multo minorem*  
thymi. *quantitatem præscripserint. Dioscorides namq; quatuor*

Dioscor.

tantum



tantum drachmas concedit cum melle ac sale & aceti exi-  
 guo. Idē pondus exhibet Galenus in sero lactis uel mul- Galen.  
 sa, libro decimoquarto methodi medendi. Oribasius in 4  
 suo compendio uix drachmas tres transcendit. Aëtius Oribas.  
 tantum scrupulos duos triti & cribrati, ætate uigentibus 3  
 offert. Paulus tamen Aegineta libro septimo dandas esse Paulo.  
 drachmas quinque cum lactis hemina contritas permut- 5  
 tit. Plinius uero lib. 26. cap. 8. ad sex usque drachmas Plinio.  
 progreditur. Auicēna potionem Epithymi quatuor esse 6  
 aureos præcipit: adeo ut nemo sit præter unum Mesuē, Auicēna. aurei  
 qui ad septem usque drachmas progredi ausus sit. Pro- 4  
 inde consultum erit, ut quinque tantum uel summum sex Legitima do-  
 drachmas, idq; paucissimis concedamus. Potio uero sis drachmæ.  
 ipsius Epithymi infusi seu macerati offerri potest, ab un- 5  
 cia una, usque ad uncias duas. Dosis infusi  
epithymi.

ERVINAE parandæ farinae ratio hæc est: Vberio- Eruiua fa-  
 ra grana candidaq; deliguntur, permiscendoq; aqua re- rina.  
 sparguntur, donec sufficienter combibant. postea torren-  
 tur, usque dum hians cortex disrumpatur. molitaq; fa-  
 rinario cribro incernuntur. postremo farina recondi-  
 tur. Diosc.

EUPHORBIVM libyca arbor est, ferulæ speciem Euphorbiū  
 habens, quæ in monte Atlante, iuxta Mauritaniam inue-  
 nitur. ea acerrimo succo turget. cuius eximium seruerē  
 expauescentes incolæ, ouillos uentres elutos, arbori cir-  
 cumligant, & eminus caulē contis incidunt. confestimq;  
 è plaga, perinde atq; uase quodam, in uentriculos copio-  
 sus lactis humor effluit, præter id quod humi sparsum,  
 uulnus eiaculatur. Duo succi genera. unum orobi ma-

gnitudine, sarcocollæ modo emicat. alterum in uentriculis concrefcit, atque uitreum fpeculatur. Eligendum eft translucens, & acre. Euphorbium adulteratur farscollæ & glutini miftione. fed difficile quidem experimentum. quippe cum leui gultu, os accenfum diu detineat, adeò ut quicquid ori obijciatur, planè euphorbium refipiat. Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Diofc. Paulus drachmam unam exhibet euphorbij, cum melle cocto, ad pituitam & aquam educendam. Plinius tres obolos ex aqua aut mulfo. Rafis, Serapion & Auicenna, dicunt tres drachmas interficere. Quadriennio conferuatur. Mefuæ annuum perniciofum eft.

Dofis Euphorbij.

## F

Fxx.



**F**ÆX eligenda maximè à uino uetere, Italico : fin minus, ab alio confimili. Fæx aceti uiribus longè acrior eft. Crematur ut alcyonium, antè diligenter ficcata. Sunt qui noua tefta igni largo urât, ufque dum penitus incendatur. Alij uiuis carbonibus fæcis glebam obruunt, & idem opus profequuntur. Experimentum eft legitimæ uftionis, ut aërio nitore inalbefcat, linguamq; taftu urere uideatur. Eadem urendæ fæcis aceti ratio. Sed recenti utendum eft, quoniam celeriter exanimatur. proinde non nifi in recõditorio, & uafe aliquo reponi debet. Lauatur, ut pompholyx: & oculorũ medicamentis elotta, ut fphodos, adijcitur. Diof.

Fel

**FEL** omne curatur hoc modo: Recens præligato ore Fel.  
 folliculi lino tandiu denussum in feruentem aquam, dum  
 quas spatium trium stadiorum percursaret, mox exem-  
 ptum siccatur umbroso loco, asperginem non redolente.  
 Sed quod ad oculorum medicamenta adijci solet, ligatum  
 lino in uitreū uas, quod mel habeat, immittitur, circum-  
 uoluto ad os uasis lini principio: & operto uase recondi-  
 tur. Efficacius fel marini scorpionis esse uidetur, &  
 piscis callionym, marinæ testudinis, hyænæq;: itē per-  
 dicis, aquilæ, gallinæ cādidiæ, & sylvestris capræ. quod  
 priuim prodest contra suffusiones incipientes, & ocul-  
 lorum caligines, argemas, & genarum scabritias. ouil-  
 lo, suillo, hircino, atque ursino, taurinum multo effica-  
 cius. Diosc.

**FICVS** ex cinere tam sylvestris quàm satiuæ lixi- Fici lixiuiū.  
 uium fit crematis ramorum cauliculis: quod subinde ma-  
 cerari opus est & inueterascere. siquidem inter cau-  
 stica intelligitur. Diosc.

**FICI** sylvestris & satiuæ lacteo succo idem præstat Fici sylvestris  
 succus ē teneris ramis sylvestris fici. qui lacte prægnat- & satiuæ suc-  
 tes, silente adhuc oculo tusi exprimuntur: & siccatus in<sup>cus.</sup>  
 umbra reponitur. Diosc.

**FOENICULI** succus caule & folijs exprimitur, & Foeniculi  
 in sole siccatus, in medicamenta adijcitur, quæ ad excitā<sup>succus.</sup>  
 dan oculorum aciem commodè temperatur. Extrahitur  
 succus ad eadem ualens, etiam semine uiridi ramulisq;  
 & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia quæ  
 ad occidentem spectat succum reddit gummi similem.  
 Caulem medium, dum herba floret rustici demetunt,

igniꝑ; admovent, quò facilius ui caloris exudans, gummi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamenta oculorum. Dioscorides.

Confectio succi fœnogræci ex Aëtii  
libro septimo, capite 15.

Fœnum græcum.

FOENOGRAECVM diligentissimè purgari oportet, deinde plurimum ablui, postea in aqua dulci purissima die ac nocte madefactum in fictili exaërie decoqui, uitariꝑ; in decoctione uas æneum. Postridie effusa priori aqua, & alia pura coniecta ad ignem splendidum fumo carentem decoquito. ideo uero primam & secundam aquam abijcimus, ut omnis inde amaritudo eximatur. tertio igitur purissima aqua adiecta, et exquisitissimè operata ad liquidioris mellis consistentiam decoquito, inde per linteum excolabis, fœnogræcum nequaquã exprimens, sed eo tantum succo contentus, qui sponte defluet, quem ad prædictos usus seruabis. Seruari autem in alteram diem, uel quàm longissimè in tertiam potest, ulterius enim moratus acescit. Sed ubi ulcera satis purgata sint, u succo fœnogræci abstinebis. Cum hoc succo collyria dissoluuntur, ubi ulcera oculorum sordida sunt: & si abundent sordes, mel addetur. Lentorem habet, & relaxandi uirtute pollet. Hæc Aëtius.

Fucus marinus.

FUCI marini generibus uti humidis conuenit, prius quàm exarescant. Diosc.

Fuligo.

FULIGO quæ pictores utuntur, ex uitrarijs officinis colligi solet. siquidem ei palma tribuitur. Diosc.

Fumaria electior.

Meliorẽ FUMARIAM existimat Mesue, cuius herba

herba uiridis & tenera est, folia quoq; tenera & plana,  
 & flos subuiolaceus. Et melius (inquit) tempus collectio-  
 nis herbae eius & operationis succi ipsius est principiū  
 ueris: & seminis eius, finis ipsius ueris. Potio succi <sup>modus exhi-</sup>  
 sumi terrae, est Mesuae, ab uncia media ad duas. Ego au- <sup>bitionis.</sup>  
 tem uix puto esse cuiquam tan mollem uentran, qui ea  
 quantitate leniatur. Auicenna usque ad octo uncias ex-  
 hibet. Multi sunt qui Auicennae etiam modum excedūt.  
 Decoctum eius exhibetur ab uncijis decem usque ad quin-  
 decim. Et puluis à drachmis tribus usque ad quinque.

## G



**GAGATES** praeferendus, qui <sup>Gagates</sup>  
 celeriter accenditur, & odorem <sup>lapis.</sup>  
 bituminis reddit. Niger est ple-  
 runq; & squallidus, crustosus,  
 perquam levis. Vocatur locus in  
 Cilicia & amnis Gagae, in cu-  
 ius faucibus ij lapides inueniun-  
 tur, proximè oppidum Plagiopolin. Diosc.

**GALBANVM** succus est nascentis in Syria ferulae, <sup>Galbanum.</sup>  
 quod nonnulli metopium uocāt. Maximè laudatur car-  
 tilaginosum, merum, thuris effigiem praebeus, pingue,  
 minus lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis, &  
 ferulae, graui odore, neque ualde humidum, neque nimis  
 aridum. Adulteratur faba fresca, resina, & ammoniaco.

Si purgare galbanum uoles, in fruentem aquam de-  
 mittito. namque cum liquefactum fuerit, eius sordes flui-  
 tabunt. quas hoc modo facile separabis: mundo lin-

teo raroq; alligatum in fictili aut ærea pyxide ita pen-  
deat, ut inuicem uasis ne tangat: opertoq; uase in serui-  
dant aquam demittito. sic enim sincerum, ueluti per-  
colum eliquescet, & lignosum in liuteo remanebit. Dio-  
scorides.

Galla. GALLA fructus est quercus. Aliqua omphacitis  
appellatur, parua quidem sed tuberosa, solida, nullo fora-  
mine peruia, altera plana, leuis, perforata. Eligi debet  
omphacitis, quæ efficacior est. Diosc.

Gallinacei ve- IVS ē uetere GALLINACEO alium deiicit. Ab-  
teris ius. iectus itaque inter ancis sale conijci oportet, & consu-  
to uentre decoqui in uiginti sextarijs aquæ, donec ad tres  
heminas redigantur. totum id refrigeratum sub diuo, da-  
tur. Aliqui incoquunt oliu marinum, mercurialem, cui-

Galli gallina cum, aut filiculam. Diosc. Gallus in hunc usum eli-  
cei delectus. gendus est rufus & antiquissimus (quo enim antiquior  
eo melior censetur) salax & in coitum pronus, pu-  
gnax, & animosus, mediocris habitus inter pinguem  
& macrum. Talem igitur Aletryona, id est galli-  
naceum gallum, diebus aliquot fursare cibato, uel ut con-  
sulunt alij, melle & modico sale, deinde ipsum cursu  
& uerberibus usque ad lassitudinem fatigato: nisi ma-  
lis eundem, contra alterum gallinaceum etiam pugna-  
cem & animosum, dimicando defatigari. Mox abscis-  
so capite exenterandus est, & ut loquuntur, euiscera-  
ndus, & modo quo supra ex Dioscoride annotauimus  
in aqua decoquendus. Mesue aquæ mensuram non præ-  
scribit, sed ex ea quantum satis est assumit, & coquit,  
ut eius uerbis utar, usque ad consumptionem duarum  
partium.

partium. Eius autem iuris siue decocti Dosis eidem est <sup>posiuris</sup> dosisiuris circiter libras duas. Quæ certe quantitas nimium ex <sup>gallinacci.</sup> gallinacci cedit. Plinius decoquit gallinaceum hunc gallum decrepitum in tribus congijs aquæ, donec reducatur usque ad tres cotylas.

**GENTIANAE** succi extrahendi ratio hæc est: Gentianæ Contusa radix quinque diebus aqua maceratur. postea <sup>succus.</sup> succus in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices. & ubi refrixit aqua, linteo excolatur. mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat: ficiiliq; reconditur. Dioscorides.

**GINGIBERIS** radices eligi debent, quæ teredines <sup>Gingiberis.</sup> Gingiberis non nouerunt. A multis tamen ob id conduntur, quod celeriter cariem sentiant. Diosc.

**GLANS** unguentaria nascitur in Aethiopia, Aethiopia <sup>Glans ungué</sup> gypso, Arabia, & Petra oppido secus Iudæan. Præ <sup>taria.</sup> taria fertur plena, recens, candida, quæ facile delibretur. Dioscorides.

**GLAUCIUM** aliqui ex corniculati papaueris gene <sup>Glaucium.</sup> Glaucium, re facilitari existimârunt, falsi quadam foliorum cognatione. Diosc.

**GLUTINUM**, quod xylocollan, alij taurocollan uo <sup>Glutinum.</sup> Glutinum cant, præstantissimum Rhodiaceum, quod ex bubulis corijs conficitur. id candidum est & translucens. Nigrum uerò minus probatur. Diosc.

**ICHTHYOCOLLA**, gluten piscium, uenter est pi <sup>Glutinum pi</sup> Glutinum piscis cetacei. Præstat candidans, natione Ponticum, sub <sup>scium.</sup> scium. asperum, minimè scabrum, & quod celerrimè liquefcit. Dioscorides.

**Gramen.** GRAMINIS quod in Parnaso monte gignitur succus, si in uino cum melle pari, & myrrhæ dinudio decoquatur, adiicianturq; piperis & thuris tertia portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. id in area pyxide reconditur. Diosc.

## H

**Hæmatites.**



**HÆMATITES** optimus habetur friabilis, saturato colore niger, durus & suo pte ingenio equalis, nulla sorde admista, uul loq; zonarum discursu. Vritur ut Phrygius, sine uino duntaxat. Modus uestionis est, ut modice leuis fiat, & bullis quibusdam intumescat. Sunt qui hæmatiten ita adulterant: Densam glebā rotundamq; schisti lapidis, cuiusmodi sunt quæ cuius radices uocantur, in uiscum figlini operis, qui seruientem cinerem contineat, condūt, paucaq; interiecta mora eximiūt, experiunturq; si trita ad cotem hæmatitæ colorē reddat. quod si ita res se habet, reponunt: sin minus, iter ū obruant, & subinde conspicientes, periculū faciunt. siquidē in cinere diu dimissus, colore mutato diffunditur. Coarguitur malè confectus, primū scissilibus uenis. quippe in rectos uenarū discursus resingitur. at hæmatites longē secus se in colore habet. nanq; hic floridū reddit: hæmatites uero saturatiorē, atq; cinnabarin imitantē. Inuenitur in Sinopica rubrica. Fit & ē magnete lapide, uehementer ambusto. in Aegypto sponte naturæ cum metallis enascitur. Diosc.

Helcnij



HELENII radix ætate foditur, particulatimq; dissecta siccatur. Idem stomacho utile in passio conditum. siquidem salgamarum paululum siccata radicem, mox decoctam, & frigida aqua madefactam, in saponem coniungunt, & ad usus recondunt. Diosc.

HERMODACTYLVS ille melior censetur Me<sup>lus.</sup> Hermodactylus, qui & foris & intus ualde cãdicat: qui crassus est, & moderatam habet duritiem: quique iuxta Scyllam electio. aut Raphanum crescit. Rarus uerò, laxus, & levis, imbecillus est uirtutis. At rubri & nigri mali eidem existimantur. Item qui in locis pinguius, aut humidis nascuntur. hi enim superflua ac flatuosa humiditate scatent. Tempus autem legendis Hermodactylus magis accom<sup>tempus legē</sup> modum est uer. Itaque hoc tempore collecti Hermodactyli, in usum ante annum dimidium non ueniunt assu<sup>dis Hermodactylis accom</sup> mendi, ut Arabicæ familiæ scriptores consuluerunt. modum.

Cæterum cum dicit Mesue de rotundo Hermodactyl<sup>Hermodactylus rotundus</sup> lo tanquam de meliore se sermonem habiturum, id sane Mesue. intelligendum est. Nempe Hermodactylum rotundum, qui Colchicon est Ephemerum, meliorem ac perfectiorem esse, quod ad ea ad que ualeat pertinet, ut puta ad articulares dolores. Dosis Hermodactyli ipsi Mesue<sup>dosis.</sup> ab aureo uno usque ad duos. Interius autem uellicat, & grauem stomacho exæstuationē adfert, multamq; cruorem strigentis in aluum depellit.

HORMINVM syluestre magis uiribus pollet. Horminum. Dioscorides.

HYOSCYAMI tres differentiæ sunt. una semine nigro: floribus penè purpureis: smilacis folijs: cytinis

præduris, & spinosis. alterius semē subflauum, ut irio-  
nus: flores lutei. folia, & siliquæ simpliciores. ambo ma-  
saniam gignunt, & soporem. ideo in communi usu dan-  
nantur. tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici  
recepere, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris ses-  
minusq; in maritimis ruderibusq; nascens. cuius occasio  
si non adsit, rufum usurpari oportet. niger, ut deterri-  
mus, improbatur. Recenti semine, caulibus folijsq;  
tusis, succus in sole exprimitur, & exiccato humore, u-  
sus ad annum usque prorogatur. nam facile corruptio-  
nem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim  
in aqua calida tuso, & expresso. liquamentum autem suc-  
co lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contu-  
sa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pa-  
stillos, & reconditur. Diosc.

**Hypocisthis.** HYPOCISTHIS, erythronon, aut cytinus à nōnul-  
lis cognominata, iuxta cistibi radices nascitur, floris pu-  
nici similitudine. quædam flaua. altera uirens. tertia can-  
dida. Liguatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant,  
fractamq; macerant, & incoquunt, reliquaq; ut in lycio  
prosequuntur. Vires acaciæ habet. uerum aliquantò ma-  
gis siccatur, & astringit. Diosc.

**Hyssopum.** HYSOPIVM præfertur Hippocrati Cilicium, sed  
è Tauro monte. dein Pamphyliū, & Smyrneum. Ea  
delectus. hyssopus melior est Mesuæ, cuius odor & sapor acu-  
tiores sunt. ex utroque genere (scilicet hortensi & mon-  
tano) magna eidem præfertur. Tempus autem hyssopo  
colligendo accommodum est, dum incipit florere.

Decoctus ad tertias hyssopi manipulus cum sale, uel

contritus cum oxymelite & sale, pituitas trahit, Plinio.  
 Decoctum uero cum aceto mulso, crassum humorē per  
 aluum extrahit, Dioscoridi. Ad aliam quoq; subdu=  
 cendam cum ficis uiridibus detritis, eidem manditur.  
 Decocti eius potio Mesue est, à drachmis sex usque ad <sup>dos.</sup>  
 decem, & pulueris eiusdem quantitas, à tribus drachmis  
 usque ad septem. Manardus maiorem longè quantitatem  
 posse tuto dari arbitratur.

## I



**INDICI** duo genera. Vnum Indicum.  
 sua sponte nascitur, tanquam spu=  
 ma, germinatione Indicis arun=  
 dimbus exiens. alterum infectio=  
 riæ dant officinæ: & est spuma  
 purpurea innatans cortinis, quā  
 detractam artifices siccant.

Optimum existimatur, quod cœrulei speciem præ= delectus.  
 bet, succum suum sorbet, & læue est. Diosc.

**IRIDI** radices subiacent geniculate, duræ, odora= Iris.  
 tæ: quæ frustatim dissectæ, in umbra siccantur, & tra=  
 iectæ lino reconduntur. Teredines in uetustate sentiunt,  
 tunc tamen odoratiores reddi solent. Diosc. Iris lau=  
 datissima apud Illyrios exit, non tamen maritimus, sed  
 parte mediterranea, septentrionalibus obuersa, ubi radi=  
 cis color subrufus, ut in Libya candidus apparet.

Præfertur Mesue Iridis radix cādida, ruboris quo= Iris Mesue.  
 dammodo particeps, grandiuscula, dura, spissa, Violam  
 odore referens, sapore acuto & mordicante, & ( ut in=  
 ter=

terpretis uocibus utar ) habens nodos breues collectos.

In Gallia fenticulo traiectas Iridis ( quam Flammam uocant ) radices, lixiuo macerant, ad exhauriendam succi uim, quo linearum iniurijs, quibus sunt opportune, minus pateant; dein siccatas recondunt. Plerique sic curatas armarijs indunt, ut suo perquam iucundo odore uos. uestes commendent. Dosis radicum Iridis Mesue est à drachmis duabus usque ad sex. Dioscorides drachmas septem exhibet ex hydromelite. Paulus uero obolos octo dicit purgare, ut Agaricum, modo non sit antiqua aut perforata. Alijs, duabus tantum drachmis cum melle sumptæ aliud solunt. Pro Illyrica aut Macedonica, Florentina hodie assumitur. Inter Illyricas & Macedonicas quæ meliores sunt, laudatissima putatur Dioscoridi quæ pumili fere & densa constat radice, frangenti contumax, subrufa colore, gustu amaro, odore perquam suauis ac syncero, ita ut nullam prorsus situm redoleat: quæ dum tunditur sternutamenta mouet. Secundum locum habet eidem auctori Africana, candida, gustuq; amara.

Inncus odoratus.

IVNCVS odoratus, in Africa & Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa: proximus Arabicus, quæ aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitim: pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit. igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radiceq; est usus. Dioscorides.

## L



AC probatur candidum, æquæ Lac.  
li crassitudine, quod ungui instil-  
latum cogitur. Ex omni lacte fit,  
quod schistum, id est scissile, ap-  
pellant. Lac autem fictili nouo  
feruet, ramoq; ficulneo recenti  
mouetur, insparfis, postquam bis  
aut ter efferbuerit, totidem aceti mulsi cyathis, quot sunt  
heminae lactis. ita enim serefcens liquidum ab eo diuidi-  
tur, quod in caseum concreuit. sed cum feruet, ne super-  
fundatur, conueniet spongia ex frigida continuo fictilis  
labrum detergere, sextariumq; argenteum frigida aquæ  
plenum demittere. Bibitur heminis per interualla singu-  
lis, usque ad quinas, ita ut intercedentibus spatijs, potan-  
tes ambulent. Diosc.

LACTVCAE sylvestris succus ad eadem ualet, sed Lactuca sylue-  
uilibus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius, æquæ stris.  
tea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatum.

LADANVM fit ex altero genere cisthi, quod ledon Ladanum.  
aliqui uocant. Siquidem cum cisthi frondes pascuntur ca-  
præ, hirciq; pinguitudinem conspicuè barba carpunt,  
& suo lentore uillosis cruribus adhærescentem repor-  
tant. quam depeccantes incolæ, colantesq; cogunt in of-  
fas, & ita recondunt. Alij uero attractis funiculis, insi-  
dentem fruticibus lentorem abstergunt, conglomerantq;  
in ladanum. Maxime probatur odoratum, subuiride, fa-  
cile mollescens, pingue, quod arenas non collegit, nec  
squallore obsitum est, resinosum. quale in Cypro gigni-  
tur.

tur. Arabicum uerò Lybicumq; uilius. Diosc.

Lana, & lana Succidæ LANAE molles è collo, feminibusq; lauda=  
rū medicina. tißimæ habentur. Crematarum lanarum cinis medica=  
mentis exquiritur. Vruntur autem mundæ, & carptæ,  
in fictili crudo, cæterorum more. Nec secus fimbriati  
marinarum purpurarum flocculi cremari solent. Ali=  
qui cum sordibus lanas carpunt, & melle irrigant, eo  
denique modo urunt. Alij in fictili oris patuli, uerucula  
inter se distantia componunt, & conceptas carmina=  
tasq; lanas oleo ita suffusas, ut ne stillare quidem pos=  
sint, assulis tedæ subiectis, & eisdem lanisq; permutatim  
interstratis, leuiter succedunt, & usum tollunt. Quod  
si è tēda pix, pinguitudōne ulla profluxit, collecta recon=  
ditur. Lauatur ad oculorum medicamenta. Cinerem in  
labellis, aqua addita, manibus confricant, & considerare  
patiuntur: idq; sæpius, mutant aquam, donec linguam  
astringat, nec mordeat. Diosc.

Laserpitium. OLASERPITIVM in Syria, Armenia, Media, &  
Libya nascitur, caule ferulaceo, quem maspetum uocāt.  
Laser è radice atque caule scarificatis colligitur. præfer=  
tur autem rufum, translucens, myrrhæ æmulum, non  
porraceum, odore ualens, suauis gustu. quod dilutum fa=  
cile albescit. Cyrenaicum si quis degustarit, humorem to=  
to corpore ciet, blandissimo odore, adeò ut ne os quidem  
gustati nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum mi=  
nus uiribus ualent, & magis uirosum reddunt odorem.  
Laser omne antè quàm siccescat, adulteratur sagapeno,  
aut fabæ lomento. quod maleficiū deprehenditur gusta=  
odore, uisu, & dilutione. Caulē aliqui silphion, radicem  
magna

ma gudarín, & folia maffeton uocauere. Efficaciffimum lafer, mox folia, poftremò caulis. Diofc.

**LATHYRIDIS** succus tithymalli modo exceptus; Lathyris. eundem effectum præbet. Diofc. Grana huius ſe-  
 ptem aut octo deuorata, aut pota, aluum purgant. Hæc rum catapo-  
 cum ficu ſicca, uel palmulis ſumuntur Dioſcoridi. Sed. tiæ minoris,  
 aqua frigida poſtea ſorbenda. Multis abundè grana id eſt lathyri-  
 tria uel quatuor uentrem deiiciunt, ut quotidiana ruſti-  
 corum experientia diſcitur. Quòd ſi hæc uera ſunt, ſu-  
 bit admirari quomodo Lathyris grana uicena in aqua huius ſenten-  
 pura, aut mulſa ſemel pota, hydropicos ſanare quidam tiæ fuit Plini?  
 memoriæ prodiderunt. Nimis enim excellere mihi hæc  
 doſis uidetur. Folia cum gallinaceo iure, aut oleribus de-  
 cocta, eandem habent ſeminibus operationem, ut nobis  
 auctor fuit Diofc.

**E LENTISCO** liquamentum ita fieri ſolet: Folia, Lentifcus.  
 cortex & radix in aqua coquuntur, & ubi abundè co-  
 cta refrigeratq; ſunt, folia abiiciuntur. aqua denuo co-  
 quitur, donec mellis habeat craſſitudinem. Diofc.

**LIGUSTICO** pro pipere utuntur indigenæ, ad Liguſticum.  
 obſonia. Adulteratur ſemine quodam ſimili. quod facile  
 guſtu diſcernitur: amarum enim eſt. Alij ſemen fœnicu-  
 li aut ſefelis admiſcentes, liguſticum dolo uitiant. Diofc.

**LILII** foliorum ſuccus adiecto melle aut aceto in Lilium.  
 æreo uaſe coquitur, ad ulcera uetuſta, & recentia uul-  
 nera. Diofc.

**LORA**, quam deuteriam, alij potimon appellant, ſic Lora.  
 ri ſolet, adiectis metretis tribus aquæ, in uinacea, quibus  
 triginta uini metretæ extractæ fuerint: calcatis uinacæis,  
 expref=

expressoq; decocto ad tertias parteis, & additis in singulos congios modi eius qui remansit, binis salis sextarijs. post hyemem transfunditur in uasa. Lora intra annum utendum. etenim celeriter exolefcit. Cōuenit ægris, quibus timemus noxam uini, coacti sæpe desiderys eorum obtemperare. item à longa uoletudine se recolligentibus. Fit & uinum quod adynamon uocant, loræ uires habens, hoc modo: Pares aque & musti mensura coquantur molli igne, donec absumatúr aqua. quod, ubi refrixerit, elutriatum, picato uase reconditur. Alij marinæ & cœlestis aquæ, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus insolant. quo ad annum utuntur ad omnia eadem. Diosc.

**Lycium.** LYCIVM nascitur plurimum in Cappadocia, Lycia, & plerisque alijs locis. aspera loca amat. Succus extrahendi ratio hæc est: Rami cum radiculis tusi & ante per multos dies macerati coquantur, tum abiectis lignis itidem liquor, donec mellis crassitudo fiat. Adultescitur id lycium, adiecta decoctioni amurca, aut absinthij succo, aut felle bubulo. Innata spuma inter coquendum exempta, oculorum medicamentis additur. reliquo ad alia utuntur. Simili modo fit lycium, semine expresso & insolato. Optimum quod uri potest, restinctumq; rubentem spumam ostendit, glebis extrinsecus nigris, intus, cum frigeris, rufis, odore minimè uiroso, cum amaritudine adstringens, crocino colore, cuiusmodi Indicū est, cæteris præstantius. Diosc.

**Lyncis urina.** LYNCSIS urinam, quam lyncurium appellant, si mulac excernitur, glaciari coiræue in calculi duritiam, uulgo



vulgo creditum est. quare quod de ea proditum est, uerum esse conuincitur. est enim quod à nonnullis uocatur succinū pterygophoron, quod pēnas allicit. Diosc.

## M



**MAGNES** lapis optimus, qui Magnes. ferrum facile trahit, colore ad cœruleum uergente, densus, nec admodum grauis. Diosc.

**MALABATHRYM** arbi- Malabathri. trantur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris co-

gnatione. permulta enim nardum olent, quemadmodum pabu, asarum, niris. secus autem res se habet. Nanque malabathrum folium sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris modo innatans aquis, sine radice. Id collectum statim lino transsuitur, & siccatum reconditur. Tradunt siccatis æstiuo feruore aquis, humum aridis fruticibus uri: quod ubi non euenierit, ne amplius quidem renasci. Laudatur recens, ex candido nigricans, delectus. integrum, nec fragile, odore caput feriens, quod diu in suaui odore permaneat, & nardum sapore imitetur, nullo salis gustu. Infirmum uerò & minutim contusum, præsertim si cariosum uirus olet, uitiosum est. Easdem nardo sortitur uires, sed efficacius omnia præstat. Vri nam uehementius ciet, ac stomacho magis prodest malabathri uis. Diosc.

**MANDRAGORAE** succus fit è cortice recentis ra Mādragoras dicis tuso, & prælis subiecto: qui insolatus ubi concre-

uerit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquanto ignauior. Delibratur radix, & traiectus linio cortex, ad usum suspenditur. Scarificata punctisq; multifariam aperta radice, erumpens lachryma, cauo uase recipitur. liquamentum autem succo lacteo præstantius est, sed non ubique, ut experientia docet, radices lacteum succum delachrymant. Diosc.

**Manna.** MANNA illa optima censetur, quæ recens est, splens  
 Δροσόμαλι. dens & candicans, gustu melleam dulcedinem repræ-  
 ἀρόμαλι. sentans, nullos surculos aut foliola implicans. huic pro-  
 delectus. xima est subcitrina. pessima est fusca, cœnosa, antiqua.  
 Adulteratio. Impostores Mannam adulterant cum saccharo & folli-  
 culis senæ. Sed fraus detegitur, quod procedente tempo-  
 re mollescit, & liquefit. Itaque tametsi Manna ijs qui-  
 bus infederit ita pertinaciter aliquando hæreat, ut non  
 nisi cum fragminibus eorum decerpatur, ad dolum tamē  
 quitandum, præstat eam eligere quæ nullis lignorum aut  
 dosis. foliorum fragmentis admixta est. Dosis Mannæ Se-  
 rapioni est à drachmis decem ad uiginti: Mesue à dra-  
 chmis sex usque ad quindecim: Alijs ab uncia una dari  
 potest ad uncias tres.

**Marrubium.** MARRUBII succus folijs tufis exprimitur, & so-  
 le cogitur. Diosc.

**Lentiscina** Lentiscus resinam gignit, quæ LENTISCINA co-  
 resina. gnominatur, & ab aliquibus MASTICHE. Optima &  
 Mastiche. copiosissima in insula Chio prouenit. Præfertur nitedu-  
 læ modo resplendescens, & candore Tyrrhenicæ ceræ  
 similis, adulta, retorrída, friabilis, odorata; stridorem  
 ædens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris  
 resina.

resinæq; pineæ nucis mustura. Diosc.

MEDVLLA laudatissima est ceruina. mox uitulina. Medulla. post hanc taurina, dein caprina, & ouilla. Colliguntur æstatis exitu, cum appetit autumnus. quippe cum alijs anni temporibus concrementum sanguinis, & ueluti caro friabilis, in ossibus inueniatur. nec facile cognosci potest, ni quis eam ossibus extrahat & recondat. Curantur recentes, adipis modo, aquæ respersu subactæ, selectisq; ossibus tantisper elotæ, & in linteum expressæ, donec aqua sincera emanet: & deterfa sorde pinna, siqua innatet, liquatæ in duplicato uase in pilam exprimuntur. & ubi coiere, omni facie, quæ ad ima sidit, dearsa, fictili nouo reponuntur. quod si libet incuratas reponere, facito omnia quæ de anserum & gallinarum adipi demonstrauius. Diosc.

Principem locum obtinet MEL, quod Atticæ regio Melnis est, præcipue ex Hymetto, mox Cycladibus insulis, & e Sicilia, cognomine hyblæum. Magis probatur dulcius & acre, odoratius, subflauum, nec humectum, graue, & minimè fluxum, quod ob sequacem lentitiam non facile abrumpitur, tractumq; resilit in digitos. Primatum tenet in mellis genere uernum. deinde æstiuum. hybernum uerò, utpote quod crassius constet, deterrimum reputatur. ceraginis halitum expirat. Diosc.

MELANTERIA geminæ est originis, quedam in Melanteria. faucibus cuniculorum quibus æs eruitur, salis modo, crescit. alia uerò in summa facie supradiCTORUM locorum coit, quæ terrena est. quinetiam inuenitur in Cilicia, & alijs quibusdam regionibus, fossilis quedam. Præstat,

quæ sulphuris colorem trahit, levis, pura, æquabilis, & quæ contactu aquæ confestim nigrescit. Vim causticam eam obtinet, quam & misy. Diosc.

Melilotos, siue Sertula Campana lauatissima in Attica & Cyzico & Chalcedone nata, cuius color uicinus est croco, boni odoris. Nascitur & in Campania circa Nola, colore in luteum languescente, odore infirmo. Diosc.

Misy. MISY assumendum natione Cyprium, auri simile, durum, quod friando auri colorē imitatur, & stellæ modo splendet. Vim habet & uestionem cum chalcitide eandē, præter quàm quòd psoricū ex eo non conficitur, excessus defectusq; ratione tantū differens. Aegyptiū autē ceteris præstat, utpote quod efficacius habeatur. sed ad ocularia medicamenta multo supradictio inferius. Diosc.

Molybdæna. MOLYBDÆNA optima est flaua, argenteæ spumæ acynula, modicè splendēs, cum teritur rufa, cocta cū oleo iocineris colorem trahit. Vitiosa est quæ aërem, aut colorem plumbeū refert. Gignitur ex auro, & argento. Est etiam quædā fossilis ad Sebastia, & Corycū inuenta, quo in genere probatur, quæ lapidosa nō sit, aut recrementosa, sed nitens, & flaua. Vim habet spumæ argenti, aut recremento plūbi simulē. Vritur, lauaturq; eodē modo.

Mori succus. MORI succus, decoctus autem æreo uase atq; insolutus, adstringētiore redditur. Diosc. Sed inolefcit uis eius, adiecto scissili alumine, galla, croco, & myrrha. itē myricæ semine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq; acinorū rhois uice obsonys muscentur, ut

Mori radix, coeliacos iuuent. MORI radix circiter messē incisa, facta in

fit in ambitu scrobe, succum emittit, qui postridie concretus inueniri solet. Diosc.

BRYON, id est MYSCVS, à quibusdam splachnon Bryon. appellatur. in cedro arbore, populo alba, & quercu in- Muscus. uenitur. Optimum est cedrinum: proximum populneū. in quo genere candidum & odoratiùs præstat, nigricans improbatur. Diosc.

MYROBALANI lutei seu flauī, quos citrinos uo- Myrobalani  
cant, ex herbaceo colore flauescētes, eligendi sunt spiss- vel myroba-  
si, graues, seu ponderosi, exili nucleo, cute crassa, & lana secundū  
gummosi. Cepuli, deligendi sunt, ampliores, grauior- Arabes.  
resq; ex fusco rufescentes, hoc est subnigri, uergentes Myροβάλανος.  
ad ruborem, carnosī, spisso cortice. Empelatici, siue Cepuli. 2.  
emblici eligi debent, cute ossibus hærente, lapillorū pe- Empelatici. 3.  
nè figura, carne ampliore, minutis ossibus, densi & gra-  
ues. Belethzici, eadem quasi forma spectatur qua em Belethzici. 4.  
pelitici. eligendi ergo sunt maiores, crassiores, cortice  
densi, & ponderosi. Nigri, quos à colore cæruleo uul Nigri. 5.  
gus Indos nōminat, eligendi sunt solidi, sine nucleis, oli-  
uæ forma, ponderosi. hi à recētiore Græcia Damasonij  
uocitantur. Ea omnia Myrobalanorū genera seu dif-  
ferentiæ, ab officinis ostenduntur. Quibusdā genere neu-  
tro effertur, & hoc ordine digeruntur, Lutea seu fla-  
ua, Inda, Cepula, Empelitica, Belethzica. Dosis My-  
robalanorum est à drachmis duabus ad semunciam, uel  
drachmas sex in infusione: & à drachma una ad duas  
in substantia, ut uoluit Mesue. Myrobalani Aëtio, bi-  
nūm, aut ternūm denariorū pondere triti peculiariter su-  
per uacuū capitis humorē exhauriunt: sed flaua, bilē fla-

uam : atrā, nigra detrahunt: quēadmodū pituitā cepuli.

Myrrha. MYRRHA lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Aegyptiæ spinæ non dissimilis . è cuius uulnere defluit lachryma in subiectas tegetes . alia circum caudicem concreuit . Dicitur ex his aliqua pediasimos, præpinguis, quæ expressa, stacte emittitur . alia gabirea, pinguisima, læto & pingui solo nascens . ea copiosam suæ dat stacten .

Myrrha troglodytica.

Omniū prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subuiridis, ac mordēs . quinetiā legitur tenuis quædam, quæ à troglodytica secunda est, bdelly modo molliis, uerum odore grauiuscula, apricis nascens . Alia caucalis cognominatur, præter modum exoleta, nigra, & retorrida . Omnium deterrima, quæ ergasina dicitur: pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummiis imæginem uergens, & uiribus eiui proxima . improbatur aminnea cognomine . ex ijs pastilli fiunt, sed è pinguibus pingues, & odorati : è siccioribus haudquaquam pingues, & inodorati . minus odore pollet, quæ oleum non admisit, cum in pastillos digerebatur . Adulteratur macerato gummi aqua, in qua myrrha maduerit . Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, undique concolor, quæ confracta uenas unguaiū modo candidas & læues ostendat, minutis glebis, amara, acris, odorata, calfaciens . superuacua & inutilis est pōderosa, coloris picei . Diosc.

Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, & ut postea ostendemus, ad eadem conueniens . Diosc.

Myrrha Beotica.

Beotica MYRRHA, dissecta radix est arboris cuiusdam in Beotia nascentis . Melior est quæ myrrham odore

odore repræsentat. Diosc.

MYRTI baccis uirentibus succus exprimitur, item Myrtus. folijs adfuso uetere uino aut aqua cœlesti. Cuius recentis usus est. Nam exiccatus planè cariem sentit, & uires amittit. Diosc.

MYRTIDANVM dicitur adnatum in æquabile, uer Myrtidanū. rucosum intumescensq; & concolor. quod per inde quasi manus myrti caudicem amplectitur. magis quàm myrtus adstringit. tusum addito austero uino reponitur, coactumq; in pastillos siccatur in umbra: multo efficacius & folio & semine, cerato, pēssis, in seſsionibus, cataplas matis admistum, ubi adstringendum aliquid est. Diosc.

## N



ARDI duo genera: unum Indicum, alterū Syriacum appellatur, nō quod in Syria proueniat, sed quod montis in quo oritur, pars una ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere præcipuum est recens & leue, largā gerens comam, flauum colore, perquàm odoratum, ac cyperū redolens, breui spica, amaro sapore, linguā siccante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis autē nardum quoddam Gangitis uocatur, à fluuio Gange, apud quem enascitur, montem præterfluente. quod genus ob multā loci, in quo prodit, uirginem, uiribus infirmius est, atq; procerius adolescit, plures ferēs spicas ab unica radice, comosas, unaq; conuolutas, ac grauiter olentes. Montanum autē odoratiū, spica

breui ac mutila, odore cypero uicino, cæteras habens Syriaci dotes. Est & genus quoddam cui Sampharitico nomen locus indidit, frutice breui, in magnas se spargens spicas, candidiore interim medio caule, hircorum uirus supra modum redolente, quod improbat. Madefactum uendi solet. quod uitium ex eo deprehenditur, quod candida sit spica & squallida, nulloq; puluere obsita. Adulteratur stilbio cum aqua aut palmeo uino, inspissationis ponderisq; causa inspirato. Intueri autem oportet si luctum radicibus infideat, & incerniculo puluerem excutere, eluendis manibus utilem. Diosc.

Nardum Celticum.

NARDI Celtici caudiculorum & radicū duntaxat usus est, & odoris suauitas. unde pridie fasciculos aqua ablueri expedit, & exempta terra paulo solo atq; humenti subiecta charta reponere, postridie repurgare. sic quidē utile, cū aceroso, alienoq; propter humoris uim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simuli, quæ hirculus uocatur, ab odoris grauitate: sed facili cognitio. nanque herba cādidior est, sine caudiculo, minoribus folijs, radice neq; amara, neq; odorata, uti uerū nardum est. Itaq; radices atq; caudiculi, abiectis folijs triti secernuntur, uino excipiuntur, digerunturq; in pastillos, & ita fictili nouo diligēter operto, asseruari debent. Laudatur maximē recēs, iucūdi odoris, radice numerosa cohærens, plenū, nec fragile. Ad eadem quæ Syriacū pollet: sed uehementius urinā cit, & stomacho utilius est. Diosc.

Nitrum.

Præfertur NITRVM leue, roseo colore, aut candido, in foramina debiscens, perinde quasi spongiosum quiddam. quæ ex Banius affertur. Diosc.

NITRI



NITRI spuma optima esse putatur, leuissima, glebo- Nitri spuma.  
sa, friabilis, colore penè purpureo, aut spumosa, & mor-  
dens. qualis ex Philadelphia Lydiæ defertur. secūda est  
Aegyptia. quin & in Magnesia Cariæ gignitur. Vim  
& uestionem salis habet, tam nitrum quàm spuma eius.  
Aliqui supradicta carbonibus urunt, subiecta prius testa  
nova, donec incandescant. Diosc.

## O



ENANTHE uocatur uitis Oenanthe.  
syluestris fructus, cūm floret.  
Recondi debet fictili non pica-  
to, collectaque, substrato linteo,  
in umbra siccatur. Laudatissima  
in Syria & Cilicia & Phœni-  
ce. Diosc.

OESYPVM uocant Græci, succidarum lauarum pin- Oesypum.  
guitudinem. Cuius parandi ratio hæc est: Succidæ mol-  
les, radícula non curatæ, calida aqua lauantur, & qui-  
buscunque sordibus expressis, & in labellum oris am-  
pli coniectus, aqua infunditur, magnoq; impetu ligula, uti  
respumet, agitur, aut lignea rude ualidi usculè contur-  
batur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde  
marina respergitur. & cōsidente pingui quod superna-  
tabat, collectoq; in altero fictili uase, denuo aqua in label-  
lum fusa agitur. spuma iterum mari perfunditur, &  
deinum eximatur. hoc tantisper fieri solet, dum consum-  
pta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. collectum  
oesypum manibus emollitur. & si qua insedit spurcitia,

confestim demitur. exclusaq; sensim omni aqua, recentiq; affusa, manibus misceatur, donec admotum linguae oesypum, adstringat leuiter, nec mordeat: atque pingue candidumq; spectetur. tum in fictili uase conditur. Verum omnia feruido sole fiant. Nonnulli excolatum pingue frigida aqua eluunt, & manibus, non secus atque ceratum mulieres, confricant. ita enim candidius redditur. Alij elotis lanis & sordibus quibuscunque exemptis, ac lenito igni in æneo uase ex aqua decoctis, pingue quod supernatat collectum, aqua, ut diximus, lauant: colatumq; in fictilem patellam, quæ calidam aquam contineat, limbo operiunt, atque soli mundant, donec candidum fiat, & satis crassum. Alij bidui spatio aqua effundunt, non uanq; adijciunt. Melius est læue, radícula non curatū, quod succidarum uirus oleat, & si manu in concha fricetur cum aqua frigida, albescat, nihil in se duri aut concreti habens. ueluti quod cerato aut adipe adulteratur.

Oesypum in testa noua torretur, donec redactum in cinerem, pinguitudinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, uti demonstrauius. quæ in oculorum medicamenta commodè addi solet. Diosc.

Olex æthiopicae lachryma.

OLEAE Aethiopicae lachryma scammoniae similis est, fulua, stillis exilibus constans, mordax. quæ autem ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates oleæ, oleastriq; sinulem lachrymam sudant. Appellatur autem Aethiopica, & agrestis olea. Diosc.

Oleum candidum.

OLEVM candidum fit hoc modo: Album colore nec anniculo uetustius, in nouum fictile oris patuli funditur, centum

centū heminarum mensura, & sub solē media quaq; die cōcha refunditur: ex altoq; demittitur, ut aſidua deuolutione, iſtūq; agitatū reſpumet: octāua die ſœnum græcū mundum quinquaginta denariorum pondere, calida aqua madefactū donec emolleſcat, in ſupradictum oleum deiicitur, ita ne extillet aqua. poſtea tedæ præpinguis piceæ, aſſulatim caſæ æquale pōdus adiicitur, & tranſactis oſto diebus, oleum concha mouetur. Vbi candorem contraxerit, in uas nouum uetere uino aſfuſum recondi debet, ſubſtratis ſertulæ Cāpanæ corollis drachmas undecim pendentibus, cum pari iridis pondere. ſi minus, rursus ſoli mandandum, & idem munus obeundum, uſque dum inalbeſcat. Dioſc.

OLEAE ſylueſtris exprimitur ſuccus tuſis ſolijs, aſſuſo uino aut aqua, ſiccatusq; ſole in paſtillos digeritur. ſed longè ualidior ad recondendum ſuccus habetur, qui cum uino quàm cum aqua expreſſus eſt. uruntur cum floribus ſolia, ut ſpodij uicem cuius præſtet, in cruda olla, obliſto ore luto, uſque dum figlūm percoquatur. reſtinctaq; uino & rursus ſubacta, eodem modo uruntur. poſtremo ceruſæ modo elota coguntur in paſtillos. Hujuſcemodi cinerem in medicamentis oculorum conſtat ſpodio non cedere, ſed eiſdem uiribus præditum eſſe putandum eſt. Foliorum ſatiuæ oleæ eadem uis intelligitur, ſed aliquanto inferior. unde ocularibus medicamentis ob ſuam nūtiorem uim conuenientior eſt. Sudor ligno uirenti accenſo manans, illitu ſauat lichenas, furfures, & ſcabiem. Dioſc.

OLEI ſicyonii componendi ratio hæc eſt: In lebetem Oleum Sicy.  
oris olium.

oris lati stanno inductum, funditur olei albi quod crudæ oliuæ reddiderūt, congius unus, aquæ semicongius. leui id igne coquitur, leniter mouendo. at ubi bis efferbuit, & substracto igne refrixit, innatans oleum concha decapulatur, & adiecta noua aqua confëruescit, & reliquis ut diximus peractis reponitur. In Sicyonia maxime fieri consuevit, Sicyony inde accepto cognomine. Calfactorian ad quendam usque modum uim habet. Febri ac neruorum uitijis prodest. fœminæ ad commendandum faciei nitorem eo utuntur. Diosc.

Oleum omphacinum.

Omphacinum appellatur OLEVM, quod ex immaturis oliuis exprimitur. Præstat recens, odoratum, quod non mordeat. Tale unguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Diosc.

Omphacium

OMPHACION, succus est acerbæ uuæ, nondum maturescantis è Thasia uite, aut Amunæa. Oportet autem ante canis ortum, expressam melliginem in rubro ære, linteo cooperto, insolare, usque dum cogatur: semperq; quod ceruici uasis cōcretum hæsit, reliquo humori permiscere. noctu à subdialibus locis in lectū referri. quandoquidem nocturni rores ipsum concreescere non siniant. Eligendum est flauum, friabile, uehementer adstringens, & linguam mordens. Sunt qui coquendo melliginem cogant. Diosc.

Opium.

OPIVM optimum habetur graue, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur, læue, candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coëat, & in sole diffundatur. dein admotum luceris, non atra luceat flamma,

extus

extinctum deniq; odoris uim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut syluestris lactucæ succo, adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactucaceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi uitiatum, splendescit, & infirmū est. Nec desunt qui eò dementiæ deuenerint, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorū medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diosc. Vide plura in PAPAVERE.

## P



**PALMA**, quam aliqui Elaten Palma elate, aut Spatham appellant, fructus Spatha.

palmarum adhuc florētium, inuolucrū est calyxq; quo in spissamenta unguentarij utuntur.

Optima habetur odorata, astringens, ponderosa, præclusa, intus

pinguis. Inuolutusq; in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam uocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic unguentis expetitus. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadem facit quæ borassus. Diosc.

**Nuclei PALMARVM**, cæterorum more cremati Palmarum in crudo fictili, & uino restincti, cinere loto, spodij uim nuclei. cem efficiunt. muscenturq; in calliblephara. quod si non iustam unctionem acceperint, denuo cremandi. Diosc.

**PANACES** nascitur in Cyrene Libyæ, & Macedo Panaces. nia. Excipitur succus incisa radice, recenti caulium pullu latu. ea candidū succū emittit, qui siccatus in summa cute croceum

croceum colorem contrahit. Effluentem autem succum excipiunt, folijs excavato solo stratis, quæ siccata tolluntur. Simili modo caule mæsibus inciso, profluentem succum eximunt. Meliores ex radicibus, albæ, rigentes, distentæq; siccæ, quæ cariem non sentiant, aromaticæ, feruentes gustu. Fructus ex media ferula cibo idoneus est: sed ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in hoc succi genere probatur, quamamarißimus, interne albus, aut subfusus, foris ad croci colorem inclinans, lævis, pinguis, friabilis, tener, statim in aqua eliquefcens, graui odore: niger improbat, ac mollis. Adhibetur ammoniaco aut cera. Sed synceri experimentum est, si digitis in aqua friatus resoluatur, & lactescat. Dioscorides.

Pancreatium.

PANCRATIVM scillæ vires & præparationem habet. eodemq; pondere in morbis efficaciter assumitur. cui tamen mitior quàm scillæ facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisq; cum hydromelite, commodissimè dantur. Dioscorides.

Papaveris calyces.

PAPAVERIS calyces tunduntur virides, & digeruntur in pastillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquuntur ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum humor coëat in eclegmatis lentorem. id medicamentum in tussi, arteriæ fluxionibus, & cœliacorum affectu, doloris leuamentum præbet. efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo, & acacia. Dioscorides.

Papaveris nigri capita & folia.

DE MECONIO & OPIO. Aliqui capita ipsa, nigri

nigri PAPAVERIS & folia tundunt, & prælo exprimunt, terentesq; in mortario, digerunt in pastillos. id Meconium uocatur, multum opio ignauius. Porro opij Meconii & Opium. faciundi ratio hæc est: Cùm ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summa cute incidere oportet, lachrymam exeuntem, digito in concham abstergere: nec multo post redire, ut concreta inueniatur. etenim quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in uetere pila teri debet, & in pastillos cogi. cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne uestibus succus deradatur. Diosc.

PEPLI fructus tusus & seruesactus reconditur. Peplis.

Pepli semine poto, aluus soluitur. Media potio est dosis. acetabuli mensura in aquæ hemanis tribus: & cibus inspergitur, obsonijsq; ad molliendam aluum. Peplis colligi, & reponi ac dari, uti peplos, & sale condiri solet. Easdem habet uires. Diosc.

PEPONIS succus cum semine, adiecta farina, sic Pepocatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgât, & nitorem asserunt. Diosc.

PEUCEDANI tenera radix cultello conciditur, Peucedanû. profluensq; è plaga succus umbræ mandatur. in sole si quidem confestim eualescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & uertigo sentiat. assatione radix inutilis fit. Tan lac quàm succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mandragora. uerùm inefficacior succo lachryma habetur, & uelocius expirat. Interdum etiam concreta inuenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhæ

adherens. Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufò, odore graui, feruens gustu. Diosc.

Phrygius lapis.

PHRYGIUS lapis, quo insectores in Phrygia utuntur, à qua nomen accepit, nascitur in Cappadocia. Optimus habetur pallidus, modicè grauis, non solida corporis compage, intercedentibus albis segmentis, ut in cadmia. Vritur autem uino optimo persusus, uiuisq; carbonibus obrutus, perflatur assidue follibus, donec mutato colore rufescat. rursus extractus eodem uino restinguitur. hoc iterum & trinis uicibus faciendum. attendendū tamen, ne minutim confringatur, & in fuliginem euanescat. Lauatur ut cadmia. Diosc.

Phu.

PHU adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine ulla odoris gratia. Diosc.

Piceæ & Pini fuligo.

PICEAE & PINI fuligo ad calliblephara, & librarij atramenti confectiōnem excipitur. Diosc.

Picis liquidæ fuligo.

PICIS fuligo liquidæ fit hoc modo: In lucerna noua quæ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, luscernanq; fictili uase in clibani speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, ut clibani esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem usui fuliginem collegeris. Diosc.

Picinū oleū

Epice fit quod PISSELLAEON appellant, separato liquore aquoso, qui supernatat pici, sicut serum lactis. Nam expansa, quādiu pix coquitur, supra cortinam uellera pura madescent, acceptoq; balitu eius exprimuntur in uas. Quas pix liquida, præbet utilitates. Diosc.

Piper



**PIPER** nigrum, utpote quod tempestiua maturitate Piper nigrū.  
 collectum sit, odoratum esse constat, candido suauius, ac-  
 crius, & ori gratius, necnon ad condimenta utilius. sed  
 candidum, & adhuc in acerbum uergens, albo & longo  
 infirmius est. Eligi oportet grauissimum, plenum, ni-  
 grum, sine multis rugis, recens, minus fursiferosum. In-  
 ueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento  
 defecta, cassa, inania, nullimiꝰ ponderis, quod uocant  
 brasma. Diosc.

**PISCIVM** fluuiatilium pingua perunctis oculis cla Pisciu fluuia-  
 ritate adferunt, si in sole liquecant, & melli admisceant= tiliū pingua.  
 tur. Diosc.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum  
 quæ **PISSASPHALTOS** appellatur. Ea Cerauijs Pissasphaltū.  
 montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, æstuꝰ in  
 litus expuitur, illic coacta in glebas. mustam bitumini pi-  
 cem redolet. Diosc.

**PITYVSÆ** (alsebram uocat Mesue, nostri esuæ Pityusa.  
 lam) corticis radice dosis est, à ceratijs duobus usque ad dosis.  
 septem, & lactis ab uno ad tres. Quæ nimis est exigua  
 quantitas. Dioscorides nanq; radice pityusæ drachmas  
 duas, fructus unam, succi cochlearium, foliorum ternas  
 drachmas exhibet.

**PIX** arida. liquida pix decocta in spissam coit, quam Pix arida.  
 uocant aliqui palimpissam. quo in genere quedam uisci  
 modo lentescit, boscas cognominata. altera sicca est. Pro-  
 batur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis  
 Brutia & Lycia, picis resinæq; simul naturam habent-  
 es. Diosc.

Plumbum  
elotum.

**Lotura PLUMBI** sic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur. linteolo deinde colato, aquam superinfundens, quo facilius quicquid est resolutum incerni possit. hoc iterum facito, usque dum satis tibi habuisse uideatur. ubi confederit, priore aqua effusa, nouam adiiciens, ut cadmiam lauato, donec nulla extet nigritia. postea in pastillos cogens reponito. Quidā scobem mundi plūbi lima quæ sitam, mortario pistilloq; lapideis terunt, aut manibus cū aqua paulatim adiecta fricāt, donec nigrescat. mox ubi id pessumierit, effusa aqua, colligunt in pastillos. nam tritum uehementer, cerusæ simile redditur. Alij elumate scobi modicam plumbaginem adiiciunt: affirmantes ita elotū plumbum præstantius esse. Diosc.

Plumbum  
vstum.

**Vritur PLUMBVM** sic: Super quā tenuissimas plumbi laminas, fictili nouo inditas, sulphur inspargito, additisq; alijs rursus laminis, interiecto semper sulphure, usque dum uas expleueris, succendito. flagrante autem plumbo, ferrea rude uersato, donec perfecte redigatur in cinerem, nihilq; ē plumbo non ustam hæserit. tum demū, obstructis naribus, eximato. alioquin halitus plumbi noxius sentitur. Aut elumatam plumbi scobem in olla cum sulphure uirito. Alij laminas in fictili crudo, ut dictum est, imponunt fornaci, aut foco, & circumlinentes operculum, dato exili spiramento, urunt. Alij pro sulphure cerusam aut hordeum inspargunt. Alij integras laminas imponentes, acri igne utuntur, & rudicula ferrea cōtinuè mouent, dum in cinerem soluantur. sed difficilis

cilis huiusmodi ustio, & si uehementius uratur, contrahit spumæ argenti colorem. magis tamen nobis placet prima urendi ratio. Plumbumustum lauatur ut cadmia, & reconditur. Eosdem effectus habet, quos plumbum elotum, sed multo acriores.

PLUMBI recrementum, quod scoriam uocant, optimum est, densum, fractu cōtūmax, cerusam planè repræsentans, nihil plūbosi habēs, quod ad luteū colorem accedit, & uitri splendorem inuitatur. Eadem quæ plumbū exustum potest, sed magis adstringit. Lauatur in mortarijs infusa aqua, & refusa summa aquæ parte, quæ luteū colorem duxit. idq; sæpius, dum recrementum absumentur. dein ubi confederit crassamentum, aqua effusa, digeritur in pastillos. **MOLYBDOIDES lapis à plumbi similitudine dictus, respondentem recremento uim habet, & eodem modo lauatur. Diosc.**

Plumbi recrementum.

Molybdoides lapis.

POLIVM melius est montanum. Diosc.

Polium.

Melius & efficacius est POLYPODIVM quod in uetustis arborum, & maxime montanarum quercuum nascitur, quàm quod in petris inuenitur. Hoc enim superfluum habet humiditatem, & (ut inquit Mesue) indigestam, quæ flatum, nauſeam & stomachi subuersionē excitat. Illi autem querno Polypodio bonitatis notas octo Mesue attribuit, sed obscure multum, & non conformiter bonus auctoribus. Deligendum itaque censemus Polypodium illud, quod eas habeat proprietates, quas illi suprâ ex Dioscoride & Plinio assignauimus. Dosis Polypodij est Mesue à drachmis duabus usque ad aureos quatuor. Aëtius expurgatæ radicis scrupulos sex,

Polypodij.

Boni polypodij notæ obscure traduntur à Mesue.

Dosis polypodij.

qui in aqua mulsa præferbuerint, exhibet. Orib. drachmas duas coquit in ptisanae succo, datq; bibēdū succum. Sunt qui unciam integram sine noxa dederunt.

**Pompholyx.** POMPHOLYX specie sola, non genere, à spodio distat. Siquidem SPODOS nigricat, & plerunque ponderosior est, palearum pilorumq; plena, quasi purgamentum quoddam, quod ab ærariarum officinarum pavimentis & fornacibus euerritur. Pompholyx uerò pinguis est, & candida, usque adeò levis, ut in auras euolare possit. Cuius duo fluxerunt genera. unum ad aëris colorem uergens, subpingue: alterum magnopere candidum, summamq; leuitatem nactum. Candida fit pompholyx, quoties in perficiundo ære, fabri præstantiorem facere uolētes, detritam cadmiam cumulatiùs insparserint. Namq; tenuissima fauilla, quæ effertur, in pompholygē coit. Cæterum pompholyx non ex æris modò materia & fabrilis industria facitatur, sed ex cadmia quoque, ad gignendam ipsam, eximie follibus proflata. Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemuna contignatione operata, fornax extruitur, iuxta quam mediocris fenestra ad tabulatum à superius partibus pateat. domacilij paries fornaci proximus, tenui foramine ad fornacem usque perforetur, ad excipiendam follis naurem. ostiū mediocre habeat, pro exitu ingressuq; artificis fabricatum. domuncula altera huic coniuncta sit, in qua & solles & flator suo munere fiantur. deinde carbonibus in canūno succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis. idē negotium obit infèrue artificis minister, simulq; carbonēs

nes adijcit, usque dum indita cadmiæ copia prorsus absor-  
batur. itaque egesta suffitu tenuis pars & levis materiæ  
in summam domum euolat, & parietibus, tectis, forni-  
ciq; adhærescit: conflatum autem inde corpus, inter ini-  
tia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea  
maius incrementum capeffens, glomusculis uellerum si-  
mile redditur. ponderosus autem in ima loca se recipit.  
sed hoc fornacibus offunditur, illud domus pauimento  
coheret. quod tenuiore deterius existimandum est, ideo  
quod inultum terræ collegerit, & spurcitia in acerna-  
tione referciatur. Sunt qui hoc modo tantum fieri spo-  
dium arbitrantur, de qua antè dictum est. Optima credi-  
tur Cypria, quæ accepto aceto halitum æris præstat, co-  
lore aliquantum piceo, sapore cæni horrido: & si frau-  
dem non experta flagranti carbone inferuescit, aëreum  
colorem contrahit. Antedictis autem notis, diligenter at-  
tendendum est. Siquidem à nonnullis adulteratur tauri-  
no glutine, ouillo pulmone, aut marino, aut crematis  
grossis, & quibusdam consimilibus. Quod facile cogni-  
tu fuerit. quippe nihil in ijs probādis inuenietur eorum,  
quæ antè dicta sunt. Pompholygem in commune ita lau-  
ri oportet: Ligatam linteo mundo modiceq; raro, aut  
siccam, aut aqua respersam, in labellum demittito, quod  
imbrem contineat, & huc atque illuc fasciculum defe-  
rens, immergito. ita enim limosa pars eius ac utilis ef-  
luet, & omne sedimentum in linteolo remanebit. postea  
residere sinens, aquam cum cinere colis incernito, & no-  
uam infundens, agitato, & effundito: mutata tantisper  
aqua, & colata, dum arenosi nihil sidat. denuum aquam

exprimito, & siccatum cinerem recondito. Alij, quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitetur. deinde linteo faucibus excepturi uasis obtento, aut laxius illigato, coalant: & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant. mox spumofum, quod traiectum est, & supernatat uasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad usus recondunt. quod uerò resedit, sensim cribratū, in aliud uas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat. rursus lapidosa sidere patiuntur, & in uas aliud excolant. hoc identidem faciunt, donec ciuius merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosq; suo pondusculo degrauatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. cæterum cinerē medium separant, & in pilam coniectū, ut cadnuam, eluunt. Quin etiam lauatur uino Chio marina aqua diluto, modis quos suprà diximus. & ita redditur adstringentior, quàm æ-

Spodium. quis elota. Quòd si spodon torrere libet, diligenter tritam & irrigatam aqua, colliges in pastillos, fictilique nouo, subiectis leuibus prunis, orbiculos continuo uersabis, dum assiccati fuluiscant. Neque ignorandum, ex auro, argento, plumboq; fieri spodion. uerum post Cy-

nespodij sue prium, plumbeum maximè commendatur. Quoniam

spodos sæpenumero desideratur, necesse est ostendere, quæ simili uirtute polleant, ut in spodij locum suffici possint, antispoda uocant: quoq; modo sumi debeant. Folia itaque myrti, cum floribus & baccis immaturis, in fictile, le crudum coniecta, indito operculo continua foramina

habent

habente, uruntur fornacibus, donec figlinum percoquat-  
 tur. iterum in fictile aliud crudum transferuntur: quod  
 ubi perassatum fuerit, exempta lauantur ad usus. Idem  
 quoque fit è termite sylvestris oliuæ, si habeatur: sin se-  
 cus, satiuæ cum suis floribus, aut mális cotoneis dissectis,  
 & detractis ossibus, aut gallis, aut laceratis linteolis, itè  
 ex moris immaturis, id est candidis, in sole prius arefa-  
 ctis, aut terebintho, aut lentisco, ænanthe, aut mollibus  
 rubi folijs, uel è buxi coma, uel pseudocypereo cum flo-  
 re. Alij ficulneas frondes in sole antea siccatas, eodè mo-  
 do parant. alij taurinum gluten. alij succidas lanas aspe-  
 ras, pice aut melle irrigatas. Quæ omnia in spodij uicem  
 usantur. Diosc.

POPVLVS resinam fundit, quæ in malagmata addi- Populus.  
 tur. Lachrymam populorum commemorant quæ in Pa-  
 dum anmem defluat, durari, ac coire in succinum, quod  
 electrum uocât, alij chrysophorum. id attritu iucundum  
 odorem spirat, & aurum colore imitatur. Diosc. Propolis.

PROPOLIS eligi debet flaua, odorata, styracè refe-  
 rēs, in uehemēti ariditate mollis, et mastiches more ducti delectus.  
 lis. In alueariorū foribus, cerosæ naturæ inuenitur. Dio.

PRVNIS prima laus à Damasco Syriæ monte co- Pruna.  
 gnominatis, tribuitur, nigra cute, carne suauis, rotundo non hūmida.  
 ligno, exili nucleo. Hæc iam pridem, ut Plinius inquit, in  
 Italia nascuntur. Proxima datur (Ibericis) quæ ab Ibe-  
 ria & Hispania deuehuntur. Inter Damascena optima Electio.  
 censentur Galeno, quæ sint mediocriter adstringentia,  
 magna & laxa. Decocta in melicrato, plus mellis haben-  
 te, uentrem molliunt, magisq; si melicratū superbibatur:

dehinc uinum dulce, & prandium differatur. Aliū etiā

Pruna pran- cient si sola manduntur: sed prandiū inchoare debēt. Sa-  
dium inchoa- tis autē est decocti prunorū tam satiuorum quā sylue-  
redebent. strium singulos cyathos sumi. Sed syluestria aliam &

modus deco- strum singulos cyathos sumi. Sed syluestria aliam &  
cti prunorū. tormina si sunt, presertim in uinō austerō decocta. Mes-  
sue decoctum prunorum exhibet, usq; ad libram unam.  
Porro quo dulciora sunt pruna, eo magis uentrem emol-  
liuit. Ea Græcis (coccymella) nōminantur.

Psoricum.

PSORICVM. uide CHALCITIS.

Psyllij gene-  
ra duo apud  
recentiores.

PSYLLIUM. Recētiore duo eius genera statuerūt.  
unum calamo exili & longo, in cuius spica cōtimetur se-  
mē, pulicis colore, et magnitudine. Alterū sarmētosum,  
floribus canino capiti similibus, fabaceis capitellis, semine  
pulicis effigie, radice tenui & superuacua. Psyllium

Psyllium ma-  
xime cōmen-  
datur semine

maxime cōmendatur semine, in medicina: Plurimo enim,  
inquit Aëtius, usui est. Psylliū ueteres neq; Græci, neq;  
Latini, per os exhibuerunt, sed extrinsecus tantū ad mol-  
liēdū refrigerādūq; imposuerūt. Modus parādē mu-  
scillaginis Psyllij, ex Tralliano & Aëtio est requirēdus.

Pumex.

PVMICIS probatio, ut magnopere leuis, spongio-  
sus, scissilis, nec arenosus, item teri facilis, & candidus.  
Crematur flagrantissimis carbonibus obrutus, & ubi can-  
duerit, extractus, uino restinguitur odorato: iterumq;  
incensus extinguitur: & tertia uestione exemptus, & per  
se refrigeratus, ad usus conditur. Diosc.

Punicum mā-  
lum domesti-  
cum & sylue-  
stre.

PVNICI māli domestici & syluestris flores, id est,  
cytini & balaustia exprimuntur, ut succū remittant, in-  
star hypocistibidis, cuius etiam uires referunt. Diosc.

Pycnoco-  
mon.

PYCNOCOMI succum si libet eximere, tusa radix  
in fœtuli



in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat pinna selectum, exiccatur. Diosc.

**Pyrites** lapidis genus est, à quo æs conflatur. Pyrites. Eligi debet æris similitudine, facile scintillas ædens. delectus.

Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna, continuo flatur folliibus, donec rufescat. Alij in multos carbones igni candentes, lapidem copioso melle perfusum deiciunt, & ubi ad fuluum colorem uergere cœperit, extrahunt: efflatoq; cinere, rursus madefactum cremant, donec æquabiliter aspicatus, friabilis reddatur. Siquidem sæpe facies summa solum uritur. Ita crematus, siccatusq; recoditur. Si eloto opus sit, lauari debet ut Cadmia. Diosc.

## R



**RESINA** liquida è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet. atque olim à Colophone petebatur: hinc Colophonie si bi cognomentum uendicauit. A Gallia quoque subalpina: quam uernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tussi ueteri. Colore inter se distant. siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine: ut Larigna. Cupressus etiam liquidam fundit resinam, quæ ad eadem pollet. Quæ uerò aridarum generi ascribuntur, quædam ex pineis nucibus, aliæ abiete, aliæ picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, translucens, non retorrída, neque diluta, quandam

Refina liquida è pinu & picea.

electio.

cere faciem præbēs, & friabilis. E picea & abiete res sine, cæteras antecedunt. odoratæ enim sunt, atque thuris odore imitantur. Præstantiores à Pytiusa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam sita est. Sed quæ e picea, nucibus pineis & cupresso manarunt; nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Veruntamen eorundem gratia quorum & illæ sumi solent. Lentissima terebinthinæ res spondet. Vritur resina omnis liquida in vase quadruplæ capacitatis ad humorem, qui infunditur. itaque resinæ congius, in duobus aquæ pluviæ coquitur, subiectis leuib. prunis, resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Cæterum ubi refrixit, in fictile non picatum, quod aconitum uocant, id est non illitum, reconditur.

Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quò faculenta sordes excernatur. Vrantur quoque sine aqua, primum lento igne: & ubi coire cæperunt, maior carbonum strues supponitur, & triduo citra intermissione discoquantur, usque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox, ut dictum est reponuntur. Aridas unius diei spatio decoxisse satis est. Fuligo e resina perinde atque thure excipitur. Diosc.

Rha barbari  
apud mesuen  
tria genera.

RHABARBARVM. Tria eius genera fecit Mesue: Indicum, quod ravedsceni appellat, omnium optimum. Barbarum, quod secundum in bonitate locum obtinet. & Turchium (ita enim uocat) multo alijs inferius & inefficacius.

soni Rhabar  
bari notæ.

Laudatur Rhabarbarum Mesuæ,

1 Subnigrum vergens in ruborem.

Græc

- 2 Grane cum sua raritate.
- 3 In quo dum frangitur, inuenitur disgregatio,  
ex rufo & glauco.
- 4 Quod colorem reddit ad crocū inclinantem.

Non eget correctione, quæ fit per spicam Rheon hoc nostrum barbaricum: tum quod commixtas habeat uires, tum quod uera spica caremus: & ea qua hodie utimur, horribilis ualde saporis est. Dosis seu quantitas communis, nostri Rheubarbari in infusione, ut loquuntur, est à drachma una ad drachmas duas uel tres ad summum. In substantia à drachma una ad drachmam unam & semis. Itaque modus Mesue in dando Rheubarbaro, perniciosus est. ipsum enim exhibet à drachmis duabus & semis, usque ad drachmas decem: quæ quantitas non potest sine discrimine semel dari.

RHAPONTICVM optimum habetur quod terebinthes non sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lenescat, manducatumq; colorem reddat pallidum, aut ad crocum inclinantem. Diosc.

RHV liquamentum fit ex aridis folijs, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem, ut lycium conueniens. Semen eosdem effectus exhibet. aqua in quo semen maduit decocta, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi desert, quod dentium canis imprimatur ad dolores finiendos. Diosc.

RICINVS. ρότωρ. Grana eius triginta numero, purgatamini- bus purgata, potu pituitas, bilem & aquas per aluum deiciunt Dioscoridi. Sed iniucunda admodum est & molesta purgatio. Siquidem stomachum uehementer subuertit. Hinc ferè semper accidit; ut qui hæc grana sumpt

non eget correctione.

Spica uera caremus. modus exhibitionis.

Rhapontici.

Rhu.

dosis granorum palmæ christi, id est Ricini.

Superstitio-  
ium.

sumpserint, per superna & inferna purgentur. Sunt ta-  
men qui huius effectus (uomitionis inquam & purgatio-  
nis per aluum) causam aliam assignant, nempe quod dum  
hæc grana euelluntur, alia sursum, alia deorsum ducta  
sint. Dicunt enim rusticæ mulierculas pro comperto ha-  
bere, si quis semina deorsum trahens, euulserit, & eaco-  
mederit, per inferna purgari: si uerò sis sursum, per su-  
perna. Quod an uerum sit, uiderint huius commenti as-  
sertores. Atque hæc de catapotia maiore dicta sufficiant.

Rosarum  
succus.

ROSARVM recētibus folijs succus exprimitur, des-  
sectis forfice unguibus (sic appellatur candidæ foliorum  
partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra  
donec cogatur: & ita ad oculorum circumlitiones res-  
condi. Siccantur etiamnum folia rosarum, continuò ut  
sata, ne inuiceant, nèue situs infideat. Diosc.

Rosei pa-  
stilli.

ROSEI pastilli, rhodides Græcis, hac ratione con-  
ficiuntur: Rosarum uiridium, quæ nullo antea humore  
madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ  
nardi drachmæ decem, myrrhæ drachmæ sex, tritæ di-  
geruntur in pastillos, qui trium obolorū pondus æquēt.  
siccatiq; in umbra, in sicili non picato, atque obturato  
reconduntur. Alij adyiciunt costi drachmas duas, iridis  
Illyricæ totidem, & uinum Chium cum melle nescunt.  
Mulieribus monilium uice collo circumdato usui sunt.  
Dioscorides.

Rosarū quæ  
præferenda.

ROSAE. Inter rosas ea præferenda est quæ colorem  
habet exactè rubrum. Tam alba quàm rubra præstan-  
tior habetur, quæ folia habet pauca, & læuia, seu, ut lo-  
quuntur, plana. Succus rose melior est qui ex com-  
pleta

pleta atque omnino absoluta rosa exprimitur, aut educitur. Sicca rosa magis est adstrictionum particeps. uitanda autē omnino quæ corruptionē sensit. Rosæ præsertim recentes, decoctionem non sustinent, per hanc enim facultas earum deterforia ac purgatoria tota expirat, & deperit. Succus uero earūdem, modice decoctus, subtilior euadit, & magis abstersorius, ut auctor est Mesue. Dosis potionis succi rosarum ipsi Mesue, est ab uncia una usque ad uncias duas cum saccharo. Si cū sero lactis sumatur, satis est uncia una. Potio uero syropi, ex succo rosarum, aut infusione earum facti, eidem est, ab uncijs duabus usque ad quinque. Dioscorides & Galenus, succum rosarum non ad alium quā ad oculorum usum reponunt. Folia decem recētia, alium cuidam decies duxerunt, ut refert Razis. Sicca autem folia, quia ab eis receßit amaror, laxatiua non sunt, sed styptica, & adstringentia. Apertus error est apud Mesuem, qui per albas rosas solutionem fieri nullam scripsit. Rosæ namq; de sceni uocatæ, & uulgò apud quosdam Damasceenæ, cum albißimæ sint, cæteras in purgando excellunt. Tagautius.

## S



AGAPENIVM ferulaceæ Sagapeniū. herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum redolens, gustu acri. Diosc.

Neque

Sagapenum  
optimum.

Sagapenum  
purgatoriū  
non esse.

Neque autem mirum uideri debet de SAGAPENO si Chalbānem seu Galbanū odore referat, cūm hæc duo naturæ adeo propinquæ sint, ut Chalbāne mutetur in Sagapenum, ut Galenus scribit, libro de Antidotis. Porro omnes Dioscoridis Sagapeni notæ in nostro uocato Sagapeno reperiuntur. Nascitur etiam in Italia Plinio, et nunc etiam in Apulia. Medum tanē cæteris est præstantius, et efficacius. hoc Venetias per Alexandria navigationem ad nos adfertur: quod certe alij odorem habet uerius quā porrorum. Veri Sagapeni probatio est Galeno, si aqua infusum aut uino, statim dissoluatur.

Græci Sagapeno uim purgatoriam non adscribunt. Scripsit quidem Dioscorides ipsum crassam ex pulmonibus pituitam expurgare. Verum nemo est inter Græcos aut Latinos, qui per uentrem inferiorem purgare unquam dixerit. hoc igitur et inuentum sit Arabum. Tagantius.

Sal. SALS fossilis efficacior est. communiter, si est candidus, calculis uacans, et perspicuus, densus, æquali compage: peculiariter ammoniacus natione laudatur, si modo findi facile possit, et in recta segmenta diduci. In marino sale eligendus est, cādidus, æqualis, densus. Probatissimus in Cypro sit, et Salamne Cypri, et Megaris, in Sicilia et Aphrica. Sed inter dicta salis genera lacustris præfertur. sed multo ualidissimus est Phrygius, nunc tapeus, aut triteus, aut gantæus. Vritur fictili, diligenter opertus ne exiliat, conditusq; prunis, usque dum effervescat. Aliqui fossilem subacto polline obliniunt, et carbonibus subiciunt, usque dum eius crusta exuratur.

tur. Solet & sal communis hoc modo uri: Aqua semel abluatur, & siccatus in ollam coopertam mittitur, subdito igne, moueturq; donec iam non exiliat. Spuma s A = Spuma salis. L I S, spumosi maris lanugo siue ramentum est, in exilibus petris inuentum, cui uis eadem quæ sali. Diosc.

SALIS flos flumine Nilo defluit. lacubus tanquam qui Salis flos. busdam innatat. Assumendus, qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. interdum longè magis uirius olet, gustuq; mordacior, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbatur. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiam aqua, diluente factitium colorem. Diosc.

SALICIS excipitur succus qui manat ex ea, cum flo Salix. ret, exciso cortice. in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quæ obstat oculis, suam uim præbet. Diosc.

SAMIA præfertur candida, leuis, tangenti lingue Samia terra. glutinis modo adhaerescens, mollis, succosa, friabilis, cuiusmodi est quam aliqui collyrion uocant. Duæ enim species eius. unam antè diximus. altera aster appellatur, crustacea, & cotis modo prædensa. Vritur ac lauatur ut eretria. Vimq; consimilem habet. Diosc.

SAMIUS lapis, in Samia terra inuenitur, quo auris Samius lapis. fices utuntur poliendo auro, ut resplendeat. Probatur candore, & durezza. Diosc.

SAMPSUCHVM in Cypro & Cyziceno laudatur Sampsuchum. tißimum. secundum sibi locum uendicauit Aegyptium. Amaracum gens Sicula & Cyzicena appellat. Diosc.

SANDARACHA probatur rufa & saturator, & Sandarach. aliena

aliena materia uacans, friabilis, cinnabaris colore, sulphuris uirus redolens. Dos eadem & uisio, quæ auris pigmento. Diosc.

**Sarcocolla.** SARCOCOLLA lachryma est arboris in Persiæ de nascentis, pollini thuris sinulis, rufa, gustu amara. Adulteratur admixto gummi. Diosc.

**Scammonia.** SCAMMONIAE legitur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excavatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis inglandium folijs, profundunt succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quamsimillimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum par est, si linguae tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admixto fit tithymali lacte) sed longè magis antea narratis. item si non uehementer linguam exuerat. id quod misti tithymali argumentum est. natione autem Syriacum, & Iudaicum deterrima habetur, grauius, densa, erui farina & tithymalo uitiata. Diosc.

Scammonium quoniam cæteris præstat, quod in Colophone (quæ Insula est Ionie, Appollinis oraculo nobilis) gignitur, ideo & Colophonium nominatur. Itaque eiusmodi succus, qui in quotidiano medicine usu ad purgationes præstantem & maximam uim habet, ad hunc modum colligitur Dioscoridi: Capite radice exempto detractioe, radix ipsa in modum testudinis inuersa, cultro excavatur. Quo fit ut in cauum, seu cauernulam ipsam,

modi 2. colligendi scammonium, ex Dioscoride.



ipsam, lachryma siue succus cōfluat, quā deinde conchis excipitur. Alij fornacem seu scrobes in terra concane-  
 rato sinu fodiunt, in quos subiectis nucum iuglandum fo-  
 lijs, succum effundi patiūtur, quem inibi resiccatum de-  
 mum tollunt. Quatuor modos colligendi eiusmodi suc-  
 ci posuit Mesue, secundum autem modum hunc Diosco-  
 ridis omisit. Primus est, radice in terra adhuc manente,  
 incisa, & excauata, ut modo ex Dioscoride dictum est.  
 Secundus, radice euulsa, & incisa. Tertius, contritis ra-  
 dicibus & expressis. Quartus stipite & folijs simul con-  
 tritis. qui autem hoc ultimo modo exprimitur, ac colli-  
 gitur succus, ad uirorem spectat, & grauis est odoris.  
 Quod tertio modo legitur ac seruat, scammonium ni-  
 grum est, crassum & ponderosum siue graue ipsi Me-  
 sue. Sed quā secundo modo ex radice Scammoniae pro-  
 fluit succus, colore subalbido aut uario conspicitur. Cæ-  
 terum quæ modis his omnibus profunditur lachryma,  
 uel lento atq; moderato igne eidem Mesue decoquitur,  
 uel in sole exiccatur, & in trochiscos seu pastillos, quos  
 impresso sigillo obsignare solebant, digeritur, atque sic  
 usui reseruatur. Nunc uerò quod in officinis ostēdi-  
 tur Scammonium, neque in pastillos conformatur, neque  
 sigillo ullo obsignatur. Porro radix ipsa circa canis  
 ortum excauatur Plinio, libro 26. cap. 8. ut in ipsam,  
 sic ut modò dictum est, confluat succus, qui sole siccatus  
 digeritur in pastillos. Vis bimo nec ante nec postea. Me-  
 dicinas omnes exacuit, & stomacho (ut Galenus scri-  
 bit) inimicum est, atque eius dissolutionem facit. Recen-  
 tior autem Græcia, & officinæ nostræ, lachrymā hanc,

modi 4. ex  
mesue.

1

2

3

4

tempus colli-  
gendo scam-  
monio accō-  
modum.  
tempus dura-  
tionis.

quo minus stomachum offendat, in cotoneo malo deco-  
 Dacrydion. quunt: atque tum illa Dacrydion, quasi dicas lachrymu-  
 lam, uocat: hæ uerò corrupto uocabulo diagredion ap-  
 Plinius. pellant. Tagautius. Plinio uero commendatur natio-  
 ne Colophonium, Mysium, Priennense, specie nitidum,  
 & quàm simillimum taurino glutini, fungosum tenuissi-  
 mis fistulis, citò liquefcens, uirus redolens, gummosum,  
 lingue tactu lactescens, quàm læuissimum, cum diluitur  
 fidelis proba albescent. Verum enim uero non solum hoc experimen-  
 tio boni scā- to niti conuenit, ut lingue tactu aut cū diluitur albescat:  
 monij. hoc enim etiam euenit adulterino, quod ammisso sit Ti-  
 thymali lacte: sed fidelior probatio Dioscoridi & Pli-  
 nio fit, à gustu, ne ualde linguam accendat, ac uebemen-  
 ter deurat, id quod permisti tithymali (inquit Dioscori-  
 des) est argumentum. Tithymalus nanque linguam ex-  
 deterrimum calfacit Bulbi more. Deterrimum uero habetur Scam-  
 scammonij, monium Dioscoridi, natione Syriacum & Iudaicum,  
 graue, densum, Erui, id est, Orobi farina, & Tithymali  
 notæ boni succo uitiatum. Quinque conditiones desiderantur  
 scāmonij. Mesuæ in bono scammonio. Nempe ut sit splendens uel  
 subalbida, aut uaria: lingue attactu, & cum diluitur, la-  
 ctescens, siue albescent (sed hoc experimentum ut dixi-  
 mus, fallax est) tenera ac friabilis: læuis: boni odoris,  
 cum tamen Plinio illud laudetur, quòd uirus redolet.  
 dosis scam- Aëtio inodora est & insuauis Scammonia. Dosis ul-  
 monij. tima scammonij per se, Mesuæ sunt grana duodecim.  
 Aëtio scrupuli duo, uel, ut inquit, pro uirtutis ratione  
 maior aut minor. Galeno & Oribasio exhibetur pōdea  
 drachma una re drachmæ unius. Dioscorides quoque integram drac-  
 chmam

chmam non ueretur offerre : sufficere tamen ad soluen- scāmōnij ex-  
dam alium dicit duos obolos. Quòd si efficacius purgā= hibetur dio-  
re uelis , quaterni oboli , cum duobus ueratri nigri, & scoridi.  
Aloës drachma una , si ipsum Dioscoridem sequamur,  
dari possunt. Ego, inquit Manardus, licet nunquam sim  
ausus tantum dare , duodecim tamen grana transcendere  
non sum ueritus , scioq; quosdam scrupulum integrum  
hausisse sine noxa.

SCHISTOS lapis in Iberia Hispaniæ gignitur . Schistus lapis  
Probaturn maxime, qui croci colorem æmulatur, friabi-  
lis, suapte natura fissilis, concremento & alterno cohe-  
rentium uenarum, discursu, pectinum modo, ammoniaco  
sali similis . Vim exhibet hæmatitæ, sed ad omnia infir-  
miorem. Diosc.

SCILLA uim acrem atque feruentem habet. assatam Scilla.  
ad multa utiliore esse constat. Polline ad crustam sub-  
acto, aut luto oblita, in clibanum cõijcitur, aut carboni-  
bus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta  
fuerit. qua exempta, si non emollescat, altero polline si-  
mili, aut luto circumlinitur, & eadem quæ prius fiunt.  
nam quæ ita non assatur, interaneis maxime noxia est.  
Torretur item in olla, indito operculo, quæ in furnũ de-  
mittatur. Sumi etiam solet quod maxime est medium, di-  
reptis uiuo tenuis tunicis. quod frustatim confectum co-  
quitur, mutata sæpius aqua, donec ipsa nec amaritudinẽ  
nec acrimoniã habeat. Traiecta q; lino frusta siccantur  
in umbra, ita ut ne ulla quidem parte se contingant. his  
scille segminibus ad oleum, uinum, aut acetum scillinum  
utimur. Diosc.

**SQUILLA.** Ea squilla melior censetur, quæ & dulcoris, & amaroris, atq; acrimoniæ particeps est: quæq; candidissima est, & in locis liberis nascitur. Addit Mesue & quæ parè habet. Sola enim (inquit) uenenosa est. Quòd si id uerum est, nemo unquam tuto Scylla utetur, **Dosis.** nisi qui præsens fuerit dum effoderetur. Dosis aceti squillitici Mesue est à drachmis quinque. usque ad duas decim. Oxymelitis uerò potio est ab aureis sex usque ad tres uncias. & trochiscorum scylliticorum à drachmis duabus usque ad quatuor. Ex Dioscoridis uerò sententia datur Squilla cochlearis unius uel duorum mensura, ad aluum leniendam. Idem tribus obolis in eclegmate coctam exhibet ad uarios affectus.

**Scordium,** **SCORDIVM** efficacius Ponticū, Creticumq;. Exprimuntur eo etiam succus. Diosc..

**Sene.** **SENE.** Aſtuuario feruefacti ius potius, quàm tritæ **Dosis Sene,** rima propinatur. Pulueris modus, eidem auctori, drachma; in decocto, ſemuncia; macerati, seu, ut dicunt, infusi potio communiter exhibetur à drachmis tribus ad ſemunciam. Mesue ab aureis tribus ad unciam unā. Decocti ex Sene uncia mediocriter purgat Manardo. Serapio, ut Aſtuarius, dat tritæ Sene drachmam unam, decoctæ quinque. Ceterum cum Sene noſtrum Gallicum purgandis corporibus ualere, multa iam experiētia comprobatum ſit, non erit certe officinis tanquam inutile interdendum: ſed cum inefficacius ſit altero quod orientale uocant, & in communi eſt uſu, maiore paulo menſura erit exhibendum, ne ſua expectatione. & qui ſumunt, & qui inſtituunt, fruſtrentur. Purgant autem efficacius

ficacius senæ siliquæ (quos folliculos uocāt) quā in p<sup>o</sup> d<sup>o</sup> & s<sup>o</sup>is, id est folia: quod ipsum præter Mesuæ auctoritatē, & experientia comprobatur, & ratio etiam dicitur, ob contentorum scilicet in eis seminum potentiam.

SERVM optimum habetur, quod ex lacte caprarum <sup>Serum.</sup>  
iuuenum, nigrarum, recenter foetarum, & bono pastu <sup>Seri lactis o-</sup>  
utentium, assumitur. Secundum locum obtinet, quod ex <sup>ptimæ notæ.</sup>  
ouillo lacte separatur. & tertio loco habetur bubulum.  
Quauis temperatissimum lac muliebre sit, mox capril  
lum, hinc asinum, ouillumq; postremo uaccinum. In se  
uerò consideratum probatur magis, recens, non corru-  
ptum, boni odoris atque saporis. Dosis seri Mesuæ <sup>dosis Seri.</sup>  
est ab uncijis sex usque ad libram unam. Paulus Aegine-  
ta dari uiris iubet sextarios duos, pueris unum.

SINAPIS recenti semine expressus succus in sole <sup>Sinapi.</sup>  
siccatur. Diosc.

SOLANO hortensi, & halicaccabo succus extrahi <sup>Solanū hor-</sup>  
tur, qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem ualens. <sup>tense.</sup>  
Dioscorides.

SORI existimant aliqui melantheriam esse, aber <sup>Sori.</sup>  
rantes. siquidem sui generis est sori, ei non absimile. ue-  
rum sorēi uirus inest graue, & nauseam mouens. Inueni-  
tur etiam in Aegypto, & alijs quibusdam regionibus, ut  
in Libya, Hispania, & Cypro. Præfertur Aegyptium,  
quodq; frianti nigrius apparet, in multa foramina dehi-  
scens, suppingue, insuper adstringens, & olfactu deuo-  
rationeq; magnum uirus olens, ita ut stomachus in uo-  
mitiones effundatur. Quod autem friatum scintillas mi-  
syos modo non emittit, & alterius generis esse, & inua-

lidum censendum est. Vim & unctionem supradictis simi-  
lem habet, scilicet ut nasy & chalcitis. Hæc autem ferè  
omnia, & alia quæ unctionem experta non sunt, perustus  
validiora esse existimantur, præter salem & uini faccè,  
nitrum, calcè, & consimilia, quæ cruda remissiora sunt.  
Combusta enim viribus efficaciora redduntur.

Spartion &  
Genista.

Seminis geni-  
stæ dosis.  
dosis spartij.

DE SPARTIO & GENISTA. Genistæ semen  
in folliculis Phasiolorum modo nascens, purgat sesqui-  
drachma in aquæ mulsæ quatuor cyathis potu matuti-  
no, Plinio. De Spartio scribit Dioscorides, quòd flores  
& semina eius purgant per superna, ellebori uice, citra  
periculum, quinis obolis in aqua mulsæ siue melicrato  
pota. Semen quoque ipsum exinanit aluum trahendo.

\* aliàs, in ace-  
to. Plin.

Sed & ramis eius cum folijs in \* aqua maceratis pluri-  
bus diebus & tussis, succus elicitur, Ischiadicis & angia-  
na laborantibus utilis, unius cyathi potu ieiunis. Quidam  
salsilagine, uel marina aqua macerare malunt, & subter  
Ischiadicis in aluum dare. Detrahit cruenta, strigmen-  
taq; intestinorum. Sed super ijs nihil attentet Pharmas-  
copola, medico inconsulto. Dosìs Albrabin Mesuæ, &  
proprie florum (inquit) est à drachmis duabus usque ad  
quinq; & seminis à duabus drachmis usque ad quatuor.  
Dioscorides, ut diximus, ex semine & floribus spartij  
dat quinque obolos, Plinius sesquidrachman, id est dras-  
chman & dimidiam genistæ exhibet.

Spongiz.

DE SPONGIIS alias mares appellauere, tenui fistu-  
la, spissas: quarum duriores tragos nominarunt. sexus-  
nas autem, quæ contrarias dotes habent. Vriuntur ea, ut  
alcyonium. Cinerem in oculorum medicamentis laua-  
re util

re utilius. Candidæ cura fiunt, è molliſſimis recētes, per æſtus tinctæ ſalis ſpuma, quæ petris cohæret, inſolantur inuerſæ, hoc eſt parte caua ſuſſum ſpectante: & qua abſciſſæ fuerunt, deorſum. ſi uerò æſtiua ſerenitate ad lumen ſternantur, perſuſæ ſalis ſpuma, aut maris aqua, maximum candorem referent. Dioſc.

STYRAX lachryma eſt arboris malo cotoneæ ſimilis Styra-  
lus. Præfertur ſordescens, flauus, reſinoſus, albicantibus  
grumis, quæ plurimum in ſua odoris gratia permanēs.  
qui dum mollitur, melleum liquorem reddit. qualis è Ca-  
taballis, Piſidia, & Cilicia deuehitur. Deterior niger,  
ſi ſiſeroſus, friabilis, canoq; ſitu obduſtus. Cæterum la-  
chryma inuenitur gummi ſimilitudine, perlucida, &  
myrrhæ æmula. uerum per pauca manat. Adulteratur  
ligni ſcobe, quoniam uermiculi erodentes excuſſerunt, mela-  
le, & iridis ſedimento, & quibuſdam alijs. Alij ceram  
aut adipem odoribus imbutum, ſagrantiſſimis ſolibus  
cum ſtyrace ſubigunt, & per laxa cribri ſoramina in fri-  
gida aqua uermiculos exprimunt, uenundantq; . Styra-  
cē hunc quoniam in uermiculorū ſpeciem contrahatur, ſco-  
leciten cognominant. quem tanquam ſcancerum imperiti  
approbant, non animaduertentes ad præcipuam odoris  
fragrantiam. ſiquidem acer admodum eſt, qui adultera-  
tionis uitio caret. Styra-adoletur, & igni torretur,  
ut fiat ex eo, ueluti ex thure fuligo: ad eadem cōueniens,  
ad quæ thuris fuligo. Dioſc.

SULPHUR optimum exiſtimatur uiuū, quod apy= Sulphur.  
ron uocant, nitedulæ modo ſplendidum, perlucens, nu-  
mè lapidoſum. Probatur in genere ſulphuris ignem

experti, quod uiret, ac præpingue spectatur. Plurimum in Melo & Lipara gignitur. Diosc.

**Sycomori succus.** SYCOMORI succus primo uere tenera arbore, ætequam fructum ferat, eximitur, lapidis ictu summo cortice desquamato. si enim altiore plaga uioletur cortex, nihil effluet. Spongia aut uellere lachryma excipitur; que siccata & in pastillos coacta fictili uase reponitur. Dioscorides.

## T

**Tamarindi. delectus.**



**Adulteratio tamarindorum.**

**Adulteratio.** AMARINDI Mesuæ præstantiores sunt nigri, non tamen exacte lucidi siue splendentes, teneri, nuxti cum uillis, recentes quoque & pingues non aridi, dulcacidi, saporis uinosi. Adulterantur admixtione carniū prunorum, sed fraus detegitur nigredine non splendente in ipsis apparente, humore luxuriante, & prunorum tum odore tum sapore. Si incalescant, aut humectentur, putrescunt. optime conseruantur in uase uitreo, exacte obturato, & in loco sicciorē. Imbecillam uim habent purgatoriam, proinde eorum decoctum exhiberi potest ab uncys duabus usque ad quinque.

**Terebinthina.**

**TEREBINTHI** resina ex Arabia petræa deservitur. Prouenit etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Apbrica & Cycladibus insulis. Sed præualeat candida, perlucida, uitreo colore & in coruleum uergente, odorata, terebinthum olens. Terebinthina resinas omnes antecedit. proxima lentiscina, & è pinu, & abiete. has sequitur è picea



picea & pineis nucibus resina. Diosc.

Terebinthina quomodo vratur. Ex Aë-

tio lib. 13. Cap. 99.

TEREBINTHINAM usiam cyphi recipit. Vritur autem hoc modo: Terebinthinam conijce in ollam, & triplum, aut etiam amplius aquæ infunde, & ad ignē adhibe, nihilq; omnino mouēdo coque: ubi uero consumpta fuerit aqua, & terebinthina attenuata ac inualida reddita, ut digitis confringi possit, eam tolle atque in antidoti confectiōnem assume. Si uero insumpta aqua, adhuc mollior appareat terebinthina, aliam aquam superfunde, rursusq; ad ignē adhibe, donec friabilis reddatur.

Ex Ampelitide TERRA, quæ pharmacitis nomine, Terra Ampe in Seleucia Syriæ nascitur, laudatur in primis uigra, piceæ longos carbonēs referens, modicè assulosa, æquabili splendore, quæ detrita, accepto oleo, statim eliquescit. Vitiosa censetur candida, & cinerea, quæ in liquorem non resoluitur. Diosc.

CHIA eligi debet candida, uergens ad cinereum, Sa Terra Chiamie similis. est autem crustosa, albaq; sed fictitijs formis differens. Vis eadem quæ & Samuæ. Diosc.

CIMOLIAE duo genera: candida, & ad purpureum inclinans. Optima existimatur quæ innatam habet pinguitudinem, tactuq; frigida sentitur. Diosc.

ERETRIADES duæ sunt, una uehementer alba Terra Eretriæ, altera cinericia. Optima habetur ad cinereum colorem uergens, perquam mollis, quæ si per æranenta trahum ducatur, lineam uiolaceam refert. Lauatur ut cerussa, aut hunc in modum: Teritur seorsum, & cum aqua,

Et ubi pessum ierit, humor leuiter excolatur. siccata solibus, iterum teritur interdum, adiecta aqua, ut uespere confidat. antelucanis colo excernitur, et demum in sole trita, si fieri potest, digeritur in pastillos. Quod si tosta desideretur, pastilli magnitudine ciceris in fictile perforatum coniiciuntur, oreque uasis diligenter obturato, supra carbones candentes continenter solibus perflantur. ubi uero cinis in fauillas se conuertit, aut aereum colorem contraxit, exempti reconduntur. Diosc.

Terra Lemnia.

Lemnia TERRA cuniculoso in specu nata est Lemno insula, palustri loco desertur, inibi electa, et caprino sanguini permista. quam incolae cogunt in pastillos, et imagine caprae signant. unde et sphragida eos, hoc est sigillum caprae appellauere. Diosc.

Terra melia.

Terrae omnis electio.

Ex omni MELIA TERRA et omni alia in uniuersum, eligi debet, recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quae cum humorem attigerit, facile resoluatur. Diosc.

Terra Selinusia.

SELINYSIA eadem quae Chiapræstat, maxime laudatur, quae uehementer resplendet, candida, friabilis, et humore dilui celerrima. Diosc.

Tithymalus Characias.

E Characia TITHYMALO appetente uindemiarum tempore, succus congestis ramulis, mox dissectus, et uase conclusis, excipitur. Aliqui adijciunt farinam erui, et in pastillos digerunt, qui erui magnitudinem impleant. Alij in aridas ficos, ternas quaternasue guttas instillant, ut cum his inarescant, quas ad usus recondunt. Per se etiam tusus in pila, et in pastillos coactus reponitur. Porro cum extrahit lac, neque quo uentus aspiaret, stare quenuquam, neque manus oculis ad mouere conuenit,

uenit, sed ante quàm colligas, corpus, præsertim faci-  
ciem, collū, scrotumq; genitalis, adipe, aut oleo cū uino  
perungere. Fauces autem exasperat. quapropter cata-  
potia cera aut decocto melle, oblini par est, & hoc mo-  
do dari. binas tamen ternasue ficos, purgationis gratia  
sumpsisse, satis est. Characiæ tithymali legitur semē  
autumno, & siccātū sole leuiter tunditur, seruefactumq;  
loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Diosc.

TITHYMALI fœmunæ succus ut maris colligitur.

TITHYMALVS paralius similiter, & similes ad Tithymalus  
usus, ut mas, reconditur. Paralius.

TITHYMALI helioscopij colligitur succus, semēq; Tithymalus  
ut aliorum. Helioscopi.

TITHYMALIS cyparissæ & dendroidi, eadem Tithymalus  
uis quæ reliquis, similiterq; reconduntur. Diosc. Cyparissius.

THAPSIAE lactis extrahendi ratio hæc est: Facto Thapsia.  
in ambitū scrobe, cortices inciduntur: aut radix in forn-  
cis speciem in se excauata, cooperitur, quò merus succus  
confluat. oportet illuc sequenti die se conferre, & con-  
gestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pi-  
la, & succus organo per quallum expressus, fictili cras-  
so insolatur. Aliqui folium unā terunt. sed inualidior hu-  
iuscemodi succus. Hoc autem interest. quoniam qui ab  
radice manauit, grauius olet, & humidus permanet: è fo-  
lis autem extractus, exiccatur, atq; teredinum iniuriam  
sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus uen-  
to: aut potius, cum dies apricus est, & à flatu fileat. quo-  
niam ob halitus acrimoniam facies uehementer intume-  
scit, nudaq; corpora inuadunt pustulæ. ob id prius li-  
quido

quido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita muniti accedunt. Diosc.

Thus. THVS in ea gignitur Arabia, quæ thurisifera cognominatur. Primatum tenet in eo genere masculum, stagonias appellatum, suapte natura rotundum. tale autem individuum est, candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Indicum uerò fuluescit, & colore liuet. sed rotundum industria fæctitant. nam in quadrangulares formas dissectum fætilibus uersant, donec rotunditatem contrahat. uerum huiusmodi thus tempore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smilo nascens, quod aliqui copiscum uocant, minus multo & fæliuius. Est & genus aliud, cui amonitæ cognomen est, alioqui candidum: quod dum mollitur, mastiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gummi. quod facile deprehendi potest. siquidem suffitum gummi flammam non diaculatur, & resina in fumum euanescit. thus uerò statim ardet. idem malefîcium odor prodit. Diosc. In fætili mudo thus crematur, flagrante glebula succensum à lucerna, donec exuratur. post perfectam uersionem operire oportet, usque dum restinguatur. sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam æneo uase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ut in eius mætionem mox ostendemus. alij crudo fætili luto oblito, & in fornacem indito cremant. Fætili etiam nouo uiuacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem uaporémue emittat. facile enim comminuitur, quod perustum non est. Diosc.

Fuliginem THVRIS sic facito : Forcipicula lucer= Thuris fuli-  
 nis accensas singulatim thuris glebas in nouam fictilem 80.  
 ollam concavam imposito : & aereo uase in medio per a  
 forato, deterfa diligenter forde, obtegito. alteram admo  
 ueto, ex altera eius parte aut utraque, subiectis quater=  
 niam digitorum altitudine lapillis, quò facilius perfpici  
 queat, fi urantur. & qua locus capax fuerit, glebularum  
 lias supponito. & antea quàm prorsus prior gleba res=  
 stinguatur, aliam imposito: donec sufficientem fuliginem  
 uidearis coëgisse. Continuo tamen externæ æramenti  
 partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur. ita  
 enim temperato æris feruore, fuligo omnis inhærebit.  
 quæ alioqui per leuitatem decidua, thuris cineribus ad=  
 nuscetur. Dersa itaque fuligine, cinis cremati thuris  
 seorsum substrahendus est. idem opus, quoad satisfactū  
 tibi uidebitur, obeundum. Simili modo è myrrha, res=  
 sina, styrace, reliquisq; lachrymis, fuligo excipitur, ad  
 eadem conueniens. Diosc.

Præfertur THVRIS cortex crassus, pinguis, odora Thuris cor=  
 tus, recēs, læuis, minime scaber, sine mēbranis. Adultera<sup>tex.</sup>  
 tur admisto pini aut nucis eius cortice. sed horum index  
 ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam in=  
 cendantur, sed sine odore fumum eructant. thuris uerò  
 cortex ardet, & cum odoris fragrantia uaporem eiaku=  
 latur. thuris modo uritur. & uis eadem quæ thuri, sed  
 ualidior astringentiorq; . Diosc.

Manna THVRIS probatur candore, micarum fræ Thuris māna  
 quentia, & puritate. Vim habet eandem, quam & thus,  
 sed in ualidiuſculam. Sunt qui cribrata pini. resina, ac  
 polline,

polline, aut cortice thuris contusi adulterant. sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æquè suffitu ærium uaporem, sed fuliginosum & impurum expuit, & permistum sua uolentia halitus uirus habet. Diosc.

**Thymelæa.** THYMELAEAE folia, quæ pecudiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat: antea tundere, & neruos eximere conuenit. Thymelææ farina uuae acerbæ succo excipitur, & in pastillos diuiditur. Hallucinantur, qui coccon guidium fructum esse chamelææ existimant, decepti quadam foliorum similitudine. Diosc.

De Thymelæa iterum, & chamelæa,  
quæ Arabum est mezereon.

**Cnidij granum.** Granum CNIDIVM ob nimiam acrimoniam cum deuorandum datur, pane aut adipe sepultum infunditur, alioqui gulâ & fauces accendit. Aluum purgat CHAMELAEAE, pituitam enim bilemque detrahit, folijs in duabus partibus absinthij decoctis, succoque eo cum melle poto. Dioscoridi eosdem humores per aluum exigit, folijs præsertim cum duabus partibus absinthij, hydromela nota. litæ exceptis, & in catapotio deuoratis. Sed catapotia eiusmodi, quotquot fuere deuorata, eadē forma qua fuerint ingesta, redduntur. Omnino enim in uentre non uincuntur, nec à calido nativo liquecunt. Dantur etiam Dioscoridi rami Thymelææ cum suis folijs, & bacis, leui igne decoctis ad deijcienda aquosa corporiscrementa: ad extenuandū quoque lienē, incrementi uitio laborantē. Sed hæc medicorū sunt, non pharmacopolarū.

Dosis

Dosis MEZEREI in decoctione datur Mesuæ à drachma media, ad drachmam unam : in puluere à duobus ceratijs ad quinque . Paulus dat quatuor drachmas Chamelæ in aqua mulsæ coctas, purgareq; dicit ut Eleborus. Cnidia uero grana à uiginti usque ad triginta.

THYMVS. Decocti dosis est Mesuæ à drachmis quinque usque ad decem, & pulueris ipsius à drachmis duabus usque ad quatuor. Mediocre sustinet decoctionem. si diu ac curiose teratur, magis urinas ciet, & minus aluum exinanit . Colligi in flore thymum oportet, & in umbra siccare.

TRAGACANTHA præstat pellucens, gracilis, læ Tragaçantha. uis, syncera, & subdulcis. Diosc.

TRAGI herbæ racemorum acini tunduntur à pleuris, & in pastillos digesti asseruantur : quibus utuntur, cum opus est. Diosc.

TRAGORIGANVM optimum est Cilicium, & Tragoriga-Cretense, & Smyrneum, & in Chio Cooq; proueniens. Dioscorides.

TURPET. Τούρπη. Si de re tam ambigua, ac tam controuersa semel statuendū est, quatuor uel forte quinque res erunt, nomen Turbit suscipientes : Radix uidelicet Tripolij, de qua tractat Serapion sub nomine Turbit, quod & Caricamon uocat . Radix Pityusæ, quam Actuarius Turpeton, & quidam Dioscoridis interpretes Turpet uel Turbet appellarunt . Radix itē Alypiæ, quod cādidum Tourpeton idem Græcus auctor Actuarius cognominat . Radix præterea Tithymali fœminæ Myrthites nuncupatæ, quod myrthi folium ferat, qua

nunc

nunc passim sub Turbit nomenclatura utuntur medici,  
 & eorum seplasiarij. Et quantum demum, (nisi penitus  
 somnium est,) quod radix est arboris, quam folio ferulæ  
 constare dixit Mesue. Cæterum tametsi Arabes inter  
 se, & cum Græcis in descriptione Turbit dissentiant,  
 omnes tamen easdem ferè vires illi attribuunt, ut ex eo-  
 rum scriptis licet deprehendere. pariq; mensura ferè  
 ipsum exhibent. Scrapion & Mesue contritum bibenda  
 dum offerunt à drachma una usque ad drachmas duas,  
 in decoctionibus uerò usque ad drachmas quatuor.

**Dosis turbit.** Radix Tripolij duabus drachmis in uino potanda da-  
 tur, Dioscoridi. Pityusæ radix alui deiectionem mo-  
 ditur duobus denarijs in uino etiam pota, Plinio. datur  
 Dioscoridi in aqua mulsæ drachmis duabus. Alypion  
 uel Alypia aluum soluit, in aqua mulsæ, Plinio, addito sa-  
 le modico. Minima potio est duarum drachmarum: me-  
 dia quatuor: maxima sex, ea purgatione, quibus datur  
 è gallinaceo iure. Depellitur atra bilis semine, Dioscori-  
 di, si mensura Epithymo pari, cum sale & aceto sumas-  
 tur. Verum interanea leniter exulcerat. Datur autè Epi-  
 thymum ipsi Dioscoridi acetabuli mensura ad quatuor  
 drachmas, cum melle, sale, & aceti exiguo. Purgat au-  
 tem maximè bilem atram, qua purgata animi tristitia in  
 melancholicis pellitur: à qua ui seu facultate potuit illi  
 nomen fieri. Est enim Græcis Alypon, quod tristitia do-  
 loreq; caret aut liberat. Si nostrum Turbit, quo pass-  
 sim hodie utimur, radix sit Tithymali foemine, ut pus-  
 tatur, drachmæ pondere iuxta præscriptam à Diosco-  
 ride quantitatem siue mensuram, in hydromelite potan-  
 da da-



da dabitur, ut per inferna trahat.

## V



ERATRI albi radices mes- Veratrū albū  
sibus colligendæ. Optimum ha-  
betur candidum, friabile, carno-  
sum, modicè extentum, nec tanē  
iunci modo mucronatum, quod  
frangendo puluerem emittit, &  
tenuem habet medullam, gustu

non admodum seruens, neque saliuam subinde ciens. hu-  
iuscemodi autem strangulat. Primatum Cyrenaicum te-  
net. Galaticum autem & Cappadocicum, candidiora,  
& puluere quodam obsita, celerius strangulatus mouēt.  
Dioscorides.

Ceterum, modum unum præparandi ELLEBO- modus præpa-  
RVM inuenerunt longè facillimum. Raphanis dissectis randi Ellebo-  
inserere iubent Elleborum, rursusq; comprimere rapha- rum album.

nos, ut uis pertransseat, atque eo lenimento dare. Hoc au- Elleborus al-  
tem uomitione magis purgat, præsertim non præpara- bus uomitio-  
tum. Apparent autem res uisu terribiles in uarijs ipsarū ne purgat.

uomitionum coloribus. Sed & subditæ quoque ex eo ba-  
lani (suppositoria uocant) cum aceto uomitiones conci-  
tant, atque eliciunt. Herophilus Elleborum fortissi- Herophilus el-  
mo duci æquabat: concitatis enim intus omnibus, ipsum leborum for-  
in primis exire affirmabat. Ideo & errauisse antiquos, tissimo duci  
parcius id præbendo; cū celerius crumperet quod lar- æquabat.

gius daretur. Reddi post quatuor quoque horas incipit,  
totum opus septenis peragitur horis. Themison bis- dosis veratri  
albi.

nas non amplius drachmas offerebat, sequentes quaternas dedere. Atque hæc de ueratro albo dicta sufficiant.

Radices non uere, ut uoluit Mesue, sed mesibus colligendæ sunt: quæ solæ in usum ueniunt Dioscoridi. Itaque ipsi tenuissimæ radices breuesq; leguntur, sicuti & Plinio, ac uelut decurtatæ etiam hæ. Quod & Mesue innuit cum ait, Et melior pars radicis sunt fustes. Nam summa quæ est crassissima, cepis similes, caribus tantum datur purgationis causa, Plinio. Veteres radicem corticemq; carnosissimum, ut Barbarus annotauit, eligebant, quo tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis spongys opertam, turgescentemq; in longitudinem findebant: deinde fila in umbra siccabant, ipsi utentes. Nunc ramulos à radice sua quàm grauissimæ corticis, ita dentes. Inciditur & nunc Elleborum, & cribratur: cortex remanet, hoc summoto medulla cadit.

Veratrum nigrum.

VERATRUM nigrum radicibus coheret nigris, tenuibus, à capitulo cepæ simili confibratis. quarum est usus. in collibus, asperis, & sitientibus locis nascitur. Optimū est quod ex huiusmodi petitur terris, ut ex Anticyra. Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acre gustu, feruensq; cuiusmodi est in Helicone, Parnasso, & Aetolia natum. attamen Heliconium præcellit. Emedullantur radices eius ueratri albi modo. Diosc.

delectus.

Elleborum nigrum maximè probatur Dioscoridi, quod in Anticyra, quæ in Locride siue Phocide sita est, prouenit. Eligitur carnosissimum, habitissimumq; hoc est maximè corpulentum & plenum, medulla tenui, acre gustu,

gustu, fruensq; . Cuiusmodi est ( inquit Dioscorides )  
Helicone, Parnaso, & Aetolia natum. Quamquam boni-  
tas prima Heliconio tribuitur. Hoc perinde atque album  
emedullatur.

VIOLE succus, & syropus ex ea confectus, eo= Viola succus.  
dem, quo & flores & folia, modo aluum leniunt. Ea electio.  
assumi debet quæ prima se ostendit, cuius uirtus, nec à ca-  
lore resoluta est, nec à pluuia diluta, dissipatæ. Po= dosis.  
tio decocti uiolarum est Mesuæ, ab uncijis quatuor usque  
ad octo. Succus uerò ab uncia una usque ad duas, & sy-  
ropi ab duabus uncijis usque ad quatuor. Condiuntur e-  
tiam uiolæ cum saccharo & melle: ex ea autem condi-  
tura dari potest ab uncia una usque ad tres uncias. Mi-  
xta autem saccharo minus, melli uero magis absterforia  
est. Proinde & minori quantitate assumenda.

VIPERINAE carnes, esui sic præparantur: Detra= Vipera.  
cta cute, caput caudaq;, quoniam carne uacant, amputa-  
ri debent. quippe commentitium est quod præcipitur,  
certam utrinque mensuram præcidi oportere. reliquum  
uerò corpus exemptus interaneis elotum dissectumq; dis-  
coquitur cum oleo, uino, salis exiguo, & anetho. Sal ex  
eis ad eadem conficitur, sed inefficacior est. uiua autem  
uipera in fictile nouum demittitur. adijciuntur salis ca-  
ricarumq; tritarum, singulatum quinque sextarij, mellis  
cyathi sex. mox fictilis operculum luto oblutitur, & for-  
nacibus inassatur, donec sal in carbones redigatur. qui  
postea tritus in pulueris faciem, reconditur. Plerumque,  
ut ori gravior fiat, immiscetur nardi spica, aut folium, aut  
malabathri momentum. Diosc.

**Viscum.** VISCVM optimum est recens, intus porraceum, extra fulvum quod asperi nihil, aut surculosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxco fruticis folio. contusum acinum lavant, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque alijs arboribus. quinetiam inuenitur in quorundam fruticum radicibus. Dioscorides.

**Vnguis odoratus.** VNGVIS odoratus laudatissimus, qui à rubro mari deferitur, candicans, pinguis. Babylonicus nigrescit, atque minor conspicitur. Diosc.

APPARATVS SIMPLICIVM  
MEDICAMENTORVM  
FINIS.

# De compositione me- DICAMINVM GENE- RALIVM, EX PAVLO AEGINETA.

## De Paſtillis.



**P**ASTILLI Græcè trochisci à figura nominantur. Tres sunt eorum species. alij nanque sunt potabiles, alij in aluum dantur, alij delinuntur. Ex his igitur qui potantur, alij compri-  
munt aluum, aut sanguinem, aut aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut desiccando eam cohibentes: quemadmodum qui constat spina Aegyptia, & qui seminibus, consimilesq;: Alij dolorem sopiunt, uel quòd sensum obstupefaciant, uti crocodes dictus, uel quòd humores diffundant, ueluti ex aromatis confecti; alij lienem, aut renes, aut iecur obstructione liberant, ut qui ex amar-  
is amygdalis conficitur. Eorum uerò qui in aluum induntur, nonnulli acrimoniam obtundunt. ut in torminibus intestinorum, quemadmodum ex pompholyge, amylo, terra samia, ex cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo preparati. nonnulli alui aut sanguinis profluium astringunt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio constant, qualis est Philippi, quiq; ex spina constituitur Aegyptia,

cum rosarum aut plataginis infusi succo : nonnulli adu-  
rentes, dysenteriaë, quam ulcera depascentia exercent,  
idonei: ex sandaracha, auripigmento, calce, charta com-  
busta, cõfecti. Inferentur autem cum succo lenticulae aut  
oryzae, sic ut intestinum prius muria elotum sit, ægerq;  
cibum & potũ antea assumpserit, ne aliquid medicamen-  
ti uirtutis reliquum, ad stomachum rapiatur. Cæterum  
utiles sunt pastilli qui ab inferioribus partibus injiciun-  
tur, ad affectus potissimũ, qui infra umbilicum infestant.  
Nam superius uis ipsorum peruenire non potest. At qui  
delinuntur simileis illis uireis obtinent, uerũ astringen-  
tes, in herpete, papulis, quæ dicuntur exanthemata, in-  
tertriginibus, sanguinis eruptionibus, & fluidis ulceri-  
bus proficiũt: cuiusmodi est Andronius & Polyida. qui  
uerò obtundunt, carbunculis & maleficis ulceribus ex-  
pediunt: utpote leucus dictus, & dialotarion. irẽtes, si-  
cut iam comprehensi, cuius generis habetur & Faustia-  
ni, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, pterygis,  
& carnosiss narium uitijis accommodantur.

De medicamentis quibus aridis utimur,  
xeria dicuntur, & Smegmatis.

**A**Ridorum medicamentorum, quæ sanè & catapasa-  
mata ab inspergendo uocantur, alia ulceribus con-  
gruunt, alia cuti applicantur : ex his quæ ulceribus fa-  
ciunt, quædam cauis carnem inducunt, quædam excre-  
scentia reprimunt, quædam cicatricem generant, quædã  
urunt exeduntq;, nonnulla sanguinem coërcent. Quæ  
igitur carni generandæ sunt, uel repurgando sordida,  
carnem

carneam creant, ut quæ constant ex eruo, aristolochia, iride, panace, myrrha, thure, aloë, uel humiditatem superfluam desiccando, ueluti quæ fiunt ex ære, diphryage, squama, charta cōbusta, piceæ cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: uel acrimoniā rofionemq; obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, cerussa, speculario, ostreis crematis, terra samia, & consimilibus, & quæ compositorum ex his uireis habēt. Ex reprimentibus lenia quidem sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: ualentiora uerò sunt, quæ atramēto sutorio, ærugine, misy, chalcitide, ignem non expertis. Vrentia uerò exedentiaq; fiunt ex calce, auripigmento, sandaracha, & fece uini combusta, quam uocant spheclen, hoc est sæculam: atque hæc omnia componuntur. cæterum in tenuissimum redacta pollinem, si ulceribus inspergantur minus rodunt: si spissiora, magis. Sanguinem reprimentia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccando, aut opplendo, aut urendo faciendoq; cruston, illum coërcent, quorum materiam capite de Pastillis sumus exequuti. At eorū quæ cuti admouentur, alia abstergunt, exteruntq;, ut ex cimolia, pumice, lomento, fermento hordei, peponum carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutunt, qualia fiunt ex ueratro, alcyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, cachry, terra lemnia, sepiæ testa: atque hæc, assumpta calce & auripigmento cum liquore aliquo, pilis abolendis idonea & smeigmata fiunt. Quædam capiti admouentur, ut fluxum ex eo ruentem desiccant, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio,

*Et id genus alijs præparata. omnia uero smegmata cuti non inunctæ accommodari debent.*

*De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad oris uitia, unde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis.*

**Q**uanto rarior molliorq; est cutis, quæ corpus totum obtegit, quàm oris tunica, tanto etiam magis stomaticorum medicaminum usus euariat. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta, quæ humoris influxum repellant, cuiusmodi sunt, arida quidem, omphacium, galla omphacitis, succus rhu, & hy pocisthidis, alumen, cortex piceæ & thuris, balaustia, & generatim omnia quæ astringunt, ita ut insuauem ingratamq; & lethalem uim non repræsentet. liquida uero, succus mororum, tum quæ batina, tum quæ sycamina dicuntur, item nucum uiridium corticis, & mali punici, præsertim acidi, & malorum cotoneorum, mustum, aminæumq;. mel autem per initia solum ut medicamenta adhæreant temperatur. At quum humor substiterit, misceri debent quæ concoquant & mediocriter dissipent, cuius generis est crocus, myrrha, & dulcis radiculæ succus. Ac per totum id temporis quod inter principium & declinationem intercedit, rectè miscetur utrunque & repellens & discutiens: & primum quidem superabunt repellentia, deinde digerentia: in morbi declinatione solis uti digerentibus absq; astrictione oportet, qualia sunt nitrum, aphronitrum, origanum, hyssopum, thymus, nepita,



nepita, iris, besasa, consimiliaq; . liquor autem tunc sapa esto, tum quæ ex musto decocto, tum quæ ex caricis & palmulis conficitur, ipsumq; dulce mustum cum melle: ubi uero ueluti reliquiæ quædam inflammationis remanserint, etiam sulfur ignem non expertum miscebimus: succos autem primum cum melle incoquemus, dum liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimum pollinem pertrita inspergemus, postea modicè coquemus, quoad omnia exactè in unitatem cogantur, quo factò in uitreum uas medicamentum transfundemus.

### De collyrijs & agglutinentis.

**V**aria ocularium medicamentorum materies existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particule stirpium, & metallica his inferuntur: ex quibus alia acrimoniam leniunt & ueluti opplent obstruuntq;, utpote pompholyx, spodium, anylum, plumbum, terra sassa, cadmia, eaq; omnia lota, & candidus oui liquor. Quibus ita utendum est, ut caput prius uacuationem experiat: Nam si repletum fuerit, metus est ne oculorum tunice humoribus distentæ perrumpantur. Alia contrariam his naturam obtinent, nempe acrem, recludendis uacuandisq; ys quæ diu impacta fuerunt accommodata, quemadmodum liquores Cyrenaicus, Medicus, sagapenum, euphorbium & consimilia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama æris, ipsumq; æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, stimmi, concremata omnia. Quædam his uicina sunt, smectica ab exterendis sordibus appellata, cuiusmodi est auri-

pigmentum, sandaracha, & lapidis asij flos. Sunt & astringentia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt uehementer lippitudini, ulceribus, & defluentionibus conducunt, nempe rosarum folia, & flores, & fructus, spica nardi, phyllum, crocus, glaucium & hypocisthis.

Quæ uehementiorem astringendi uim repræsentant, oculorum claritati conducentibus potissimum medicinis miscentur, cuius generis est omphacium, acacia, balauftium, satiuæ punice flos, & galla. Alia concoquunt, discutuntq; ut myrrha, crocus, castoriū, lachryma thuris, fœnugræci succus. Porro ex cõpositis oculorum remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationem habent, alia xerocollyria, alia hygrocollyria uocantur.

Quæ igitur delinuntur omnem comprehensam materiâ recipiunt, omnibusq; conferunt affectibus: cæterum uere præsertim præparari debent, æstate siquidẽ uirtus ipsorum perspirat euanescitq; hyeme species gelu rigida temperari nequeunt. Conterere autem ea oportet liquo-  
 re non copiose affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, uerum modicè, ut sordium modo conteratur. Aqua uerò pluuialis erit, tum quòd tenuis sit, tum quòd modicè astringat. Sin uino aut succo aliquo leuigentur, teranturq; eadem, metallica sanè longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo leuigabuntur. demum ubi satis læuia euaserint, gummi adicietur, in formamq; redacta, uasis maximè æreis aut uitreis reponentur. Cæterum ys quæ è succo conficiuntur, protinus uti licet: metallica uetustate redduntur meliora. Porro inter collyria arida quædam consumant exteruntq; callos,

los, ficos, unguis, scabiosaq; uitia, è chalcitide, æruginè  
 & mify composita. Quædam lachrymas mouent, ob=  
 structionibus & hebetudini accommodata. quæ tum ex  
 his tum ex pipere & spica nardi fiūt. Sunt quæ præ=  
 seruent tueanturq; oculos ab humorum influxu, cuiusmo=  
 di ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloë, cadmia,  
 stimmu, croco: omnia in tenuissimum pollinem coacta o=  
 culis applicantur. At liquida collyria fiunt ex melle  
 Attico, opobalsamo, oleo ob uetustatem tenui, feniculi  
 succo, diuersorum animalium felle, liquore cyrenaico,  
 alysq; compluribus. Conferunt hebetudini, suffusioniq;  
 incipienti, cum extenuent, calesciāt, purgentq;. Vtendū  
 his est, & omnibus acribus, ubi caput repletionē caret,  
 sub dio, aëre puro, aquilonio, non nimis frigido, neque  
 item calido nimium. At agglutinamēta quæ anacolle=  
 mata Græcè dicuntur, ex medicamētis præparātur quæ  
 obstruunt, opplentq;, glutinant, compingūt, aut refrige=  
 rant, aut astringunt, siccāntue, qualis est farinæ pollen,  
 māna, terra sanua, myrrha, cochleæ, acacia, opium, cum  
 candido oui liquore. glutinantur autem fronti in quibus  
 humor nō intra caluariā delitescit, sed extrinsecus fluit.

De Emplastris, & medicamentorum quæ  
 ipsis immittuntur coctione, tum qui ce=  
 ræ modus cum oleo esse debeat, ex com=  
 mentariis Antylli.

**M**edicamentorū quæ Emplastra ingrediuntur, alia  
 sunt terrestria, utpote metallica, lapidumq; &  
 terræ

terræ species, fæces, cinis, & conchyilia. alia sunt olea-  
menta, alia lachrymæ, alia liquari possunt: quædã liquo-  
res, quædã succi sunt, semina uerò, herbas, & radices  
pauca recipiunt. Cæterum ex ipsis emplastris nonnul-  
la sunt uulneraria, quæ enema, quòd cruētis iniiciantur:  
colletica, quòd glutinent: & catagmatica, quòd fracturis  
accomodentur, appellamus. Constat autem ex siccantibus  
non summè, uerùm secundi ordinis absoluti, & ter-  
tij incipientis, oportet, cuiusmodi sunt salix, quercus, cu-  
pressus, piceæ & tedæ cortices, myrrha, thuris lachry-  
ma, bitumen, aloë, aristolochia, cinis sarmentaceus, ceru-  
sa, spuma argenti & pleraq; ex metallicis. Coqui debēt  
quousq; manus amplius non inquinēt. Porro quæ ci-  
catricem ducunt emplastra & ipsa ex siccantibus cōpo-  
nuntur, uerùm efficacioribus quàm glutinatoria, quod ge-  
nus est æs combustum, squama tum eius, tum ferri, æru-  
go, chalcitis, æris flos combustus, alumen, galla, plumba-  
go, cadmia, pumex, & ostracea. Digerentia uerò &  
calescentibus & siccantibus modicè fiunt, nempe ari-  
stolochia, thapsia, oleo ueteri, & raphanino, melle, opo-  
balsamo, pice, resina terebinthina, galbano, sale combus-  
to, salis flore. Quæ emolliunt, ex argenti spuma, adia-  
pibus, medullis, oleo ueteri, propoli, ammoniaco, styra-  
ce, galbano, bdellio, mastiche, resina terebinthina, uel ra-  
dice althææ & cucumeris sylvestris, præparantur.

Siccantia, ex sulphure, nitro, sale, cinere, & bitumine.

Ad extrahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro,  
propoli, ærugine, fermento, stercore, sulphure, terebin-  
thina. Quæ concoquunt, ex cera, ladano, uua passa,  
anomo,

anomo, croco, thure, pice, mastiche Aegyptia, styrace, myrrha, galbano, butyro, hyssopo, adipe, æruginē.

Pus mouëtia, ex hydrelæo, polline, pane triticeo, chōdro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, pice, resina.

Quæ uerò leniunt dolores, argenti spuma cōstant, ce-  
russa, oleo, anetho, chamæmelo, amylo, cera tracta. Iā  
uerò enema dicta, recentibus adhuc uulneribus & fra-  
cturis injici debent, adiuuariq; è summa spleniorum par-  
te spongijs posca madentibus simul illigatis, solui tertio  
quoque die, & rursus eadem splenia non alia accommo-  
dari oportet. At quæ emolliunt, extrahūt, digerunt,  
concoquunt, & pus præterea mouent, post cataplasma-  
tum ceratorumq; usum adhibentur. Quæ leniunt e-  
tiam, per initia statim, summis potissimum partibus ap-  
plicantur. Cæterum quomodo coquantur, deinceps exe-  
quemur.

## Quomodo medicamenta quæ Emplastra ingrediuntur coqui debeant.

### Æ R V G O.

**Æ R V G O** uiridibus emplastris post coctionem in-  
ijcitur. In aliquibus autem neutiquam ollæ inditur,  
sed cum aceto detritæ ipsi, manentiq; in pila reliqua su-  
perfunduntur. In melinis emplastris, cum semicocta est  
confectio immittitur: nam moderatam consecuta co-  
ctionem, melinum colorem efficit. At in his, quæ dipro-  
sopa & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem  
incoquimus.

Alumen

## ALUMEN.

*Alumen plerunque post coctionem additur, pecudiam rem uero coctionis modum nullum habet.*

## MINIVM, CADMIA &amp; POMPHOLYX.

*Minium in fine admiscetur, Cadmia & Pompholyx per initia immittuntur.*

## ALOE.

*Aloë post coctionem inspergitur.*

## AURIPIGMENTVM &amp; SANDARACHA.

*Auripigmentum, & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.*

## AES crematum.

*Aes crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquendi est, quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superat, & emplastrum rufum efficit.*

## ARGENTI spuma.

*In medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquetur. conuenit autem leuigatam rursus ex oleo conterere, ut sordium fiat spissitudo. inde leni igne excoquere continenter mouendo. Initio igitur intumescit, & in bullas attollitur: ubi uero iam ferè satis incocta fuerit, colorem facci similiorem recipit. Modus coctionis est, quum à tumore subsidit, & manus non inquinat.*

## ATRAMENTVM Sutorium.

*Atramentum sutorium in media coctione emplastro inditur, coctum uero uehementior em eius colorem efficit, & si alia ei non resistant, nigrum.*

APOCHYMA, *pix nauibus derafa.*

*Apochyma leuigatum cribroq; ab excrementis suis se=*  
*cretum emplastro, postea quàm coctum fuerit, inspergi=*  
*tur. Si autem molle fuerit, cum oleo miscetur. sed prima*  
*ratio coquendi exactior est, quòd scilicet in secunda pon=*  
*dus non conseruetur.*

## ÆRIS FLOS.

*Aeris flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui com=*  
*munis esse coctioni solet.*

## AMMONIACVM.

*Ammoniacum circiter mediam coctionem iniicitur: de=*  
*tritum uerò, si potest fieri, & in tenuem redactum pul=*  
*uerem inspergere conuenit: sin minus, cum liquore quo=*  
*dam leuigatum injicere: si emplastrum cruentis uul=*  
*neribus adaptabitur, cum aceto, aut uino: si fistulis aut*  
*strumis, omnino cum aceto: aut si molle futurũ est, qua=*  
*lia sunt quæ ano accommodantur, cum aqua: inde in sor=*  
*dium spissitudinem coactum alijs refrigeratis infundere,*  
*ne effruescant.*

## BDELLIVM.

**B***DELLIVM in leuorem pertritum, emplastro ab*  
*igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat, &*  
*leuigari non possit, sagapeno similiter ipsum cõtusum,*  
*ac in emplastri figuram coactum, post coctionem simul*  
*cum emplastro molliemus.*

## BITVMEN.

*Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in*  
*leuorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici*  
*granis interioribus simileis obtinet. Quapropter in cras=*  
*siores*

siore partitulas confringendum est, coquendumq; in aceto, sic ut non agitetur usq; dum ebullire desinat: Ego uero (inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi.

## CHALCITIS.

CHALCITIS incoquitur æris modo, coctionemq; ipsius metimur inde, si emplastrum fuluum magis & phœniceum euaserit.

## CERUSA.

Cerusa in alba emplastra postremo mittitur, sic enim colorem conseruat, magisq; albescit: in nigra autem, principio: coacta enim lætius, nigrescit.

## CERA.

Cera priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, neq; cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturq; uerum superiniicitur, uel oleo puro, uel oleoso cuiuspiam liquori cum quodam metallico incocto, aut resinæ, aut pici prius incoctæ.

## GALBANVM.

GALBANVM neutiquam coctionem tolerat, uerum emplaistro ab igne sublato, ut digitos non inquinet, emollitum inditur.

## LACHRYMA papaueris.

LACHRYMA papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila lenigatur, mox etiam emplastrum ei superfunditur.

## LACHRYMA Thuris, &amp; manna.

Lachryma thuris & manna, coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spissitudinē coacta ex melle modico,



dico, aut aceto, aut aqua, aut uino, si emplastrum liquorem recipiat.

## MISY.

**M**ISY postremo adijcitur: quamdiu autem coqui debeat, proprie definitum non est.

## MYRRHA.

Myrrha, ubi iam coctio finita est, inditur.

## OLEVM, &amp; reliqua pingua.

**O**LEVM siquidem per initia fuerit iniectum, resinæ aut pici liquidæ, emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta, rectè indetur, reliqua uerò pingua insulsa, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

## OPOPANAX.

Opopanax multò post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino acetone prius læuigandus est.

## PIX.

**P**IX ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, liquidæ, dum inspissatur: aridæ, maxime dum non amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit.

## PLUMBAGO.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eo usq; dum non modo digitos non inquinet, uerumetiam ex igneo colore in rufum, & uehementer floridum elanguescat.

## PLUMBVM ustum.

Plumbum ustum in media coctione adiungitur.

## PROPOLIS.

Propolin emollire & discoquere oportet: siquidem à coctione neutiquam diffunditur. At si & ceram emplastrū recipiat, propolin cum illa quemadmodum & galbanū, contusam inijcimus.

## RESINA.

**R**ESINA arida, cum cera immittitur: liquida ante omnia alia ipsa priuatim decoquitur, nisi admodum paululum eius assumatur.

## SAL, NITRVM, SVLFVR.

**S**AL & nitrum in medio coctionis: sulfur, in fine adijcitur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

## SAGAPENVVM.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditū cum emplastro ubi ab igne sublatum fuerit, emollitur.

## SEMINA, RADICES, &amp; HERBAE.

\* Semina, radices, & herbae, nullam coctionem sustinent: leuigatis igitur, & in pila etiamnum subsistētibus liquida superfunduntur,

## SORI &amp; DIPHRYGES.

Sori & diphryges demuttuntur in media coctione lebeti: diphryges autem, sicut & squama, eousq; coquitur dum colore reliqua uincat. Sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum reddatur, digitosq; non inquinet.

## TERRA &amp; lapides, pumex, conchyliā.

**T**ERRAM omnem & lapides plerunq; ad coctionis finem inijcimus. item pumicem, & conchyliā combusta.

## THAPSIA.

*Thapsia* inspergitur postrema, uel liquore quodam leuigatur.

## VNGVENTA.

**V**NGVENTVM irinum coctionem quidem fert, sed cyprinum & rosaceum, minus: reliqua neutiquā. quare ad finem coctionis, immittenda sunt.

## De malagmatis, &amp; epithematis.

**I**Nter ea quæ malagmata dicuntur, alia medijs corporis partibus iniiciuntur, longa inflammatione conflantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut per frictionem, fluxionemue expertis: alia articulis quibus humores sint impacti, uel nervis refrigeratis, uel etiam alijs particulis scirro obseſis congruunt. De his igitur tum in capite de emplastris tractatum est, tum ubi ad acopauentū erit differetur. Porro inter malagmata medijs corporis regionibus accommodata (epithemata proprie nuncupantur) quæ quidem stomacho & iocineri admouentur, qualiacunq; illa fuerint, roborantē ex astringentibus uim postulant. Sine his etenim uitæ aliquod discrimē intulerint. cum illa nempe stomachus & iecur communes aliarū partiū alimēti sint officinæ. Quanno brē eiusmodi medicamēta ex aromatis potissimū conficiuntur. Stomachō igitur iniici debent, si non cōcoquit, aut infirmatur, aut inflatione laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloë, absinthio, sampsucho, nardo & mastiche. Iecori autē ex myrobalano cōfecta, ammoniaco, adipibus, & chamelino. At lienī applicantur, quæ cōstant calce uiua, auripigmento, cappari, salicibus, cardamomo, ærugine,

ammoniaco, & aceto: ijs autem qui alui fluore laborant, ex cœnâthe, alumine, melino, & alijs astringētibus præparata. etenum hæc etiam per abusionem communiter malagmata nominât, & si diuersam à molliendo um repræsentent. Si uerò ardor uiscera urgeat, ut in febribus ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo lini seminis, aut intybi, aut polygoni, adipe suillo, & spuma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, pbyllum, casanum, & piper recipiunt. Pectori cum sanguis eicitur, prosunt astringentia, siccantiâq; ex alumine, salice, & bitumine. In tabe quæ pbthisis dicitur, cōducunt ex baccis lauri, marrubio, cardanomo, & lixiuio confecta.

*Qui ceræ modus cum oleo esse debeat.*

**Q**UOD si unguina, ut quæ Græci à leuanda lassitudine acopa appellant cōficere constitueris, oleum ceræ quadruplum immittes: at si liquidum ceratum, ut in fracturis præparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplâstri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionē olei ceræ æqualem miscebimus, si aer ambiens moderatus extiterit: at si cera uetus aut squallida, aer frigidus fuerit, oleū paulò copiosius quàm cera erit: quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit. paulum autem hoc, medij in utrâlibet partē excessus duodecima erit portio, etenim aliâs undecim aliâs tredecim olei uncias, ceræ libræ admiscabis.

De

De acopis, inunctionibus, dropacibus,  
& sinapismis.

**A**COPA inde nomen sortiumtur, quòd præcipuè ad lassitudinis quæ copos Græcè dicitur, puta tensi-  
uæ, ulcerosæ, & eius quæ ossa defatigat, sensum conue-  
niant, quanquam alijs quoque morbis compluribus sint  
ex usu. Alia siquidem ipsorum calefaciendi vim habent,  
alia emolliendi, alia ulcerandi. Quæ calefaciunt, pi-  
pere, pyrethro, cachry, & consimilibus constant: ner-  
uorum uitijs, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo ca-  
lore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliunt,  
ad durities, scirros, & infarctos articularum sinus con-  
ueniunt, quorum materies capite de emplastris compre-  
hensa est. At ulcerantibus quæ adarce, cachry, eu-  
phorbio, cocco gnidio, & id genus alijs componuntur,  
in diuturnis affectibus, & qui ægrè possunt elidi, qui-  
bus etiam sinapismus congruit, utimur. Porro spissitudi-  
nem uniuersa acopa inter cerata & emplastra median  
habere conuenit. Vnguiua uero acopis similia, liqui-  
diorem frè substantiam obtinent. At dropax dupli-  
cem recipit præparationem: hanc emplastro, illam ma-  
lagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illinūt,  
materiam uerò acopis & emplastris cōfinem. Cæterum  
usum cataplasmati exhibet, diuturnis affectibus iisdem  
quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumi-  
tur, quò corpus ad sinapi reddatur idoneum: à sinapis-  
mo etiā adhibetur, ut affectus reliquias discutiat. Si-  
napismus materiam quidem uariam non habet, uerum

diuturnis potissimum affectibus post inutilem aliorum praesidiorum uim efficacissimus est : utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur ( Græci heterocraniam uocant ) in morbo comitiali, uertiginibus, & insania : pectori autem in suspirio, orthopnoea, hoc est quum non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tussi longa. At in diuturna humorum e capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter in longis ipsorum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est praesidium sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omniq; parti resolutæ, aut alio quodam modo perfriktionem expertæ, ut difficulter excalesci possit. Ac tunc profecisse satis id putato, ubi dolor subsecutus fuerit ualidus, & caro liuidior altiorq; euaserit, & postquam ablotū fuerit mutus pustula erupuerint. Quod si etiam sensus perierit, animum adhibere negotio conuenit, parte quam obleueris sæpius detecta : nam si uel immodicè adurantur ita affecti non persentiscunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum delatione, ( cataphora dicitur ) & catoccho, sinapi inducitur, per initia quidem cruribus : ubi uerò materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt ut uix ullo modo queant incallescere, us crura & cubitos sinapi oblinuntur. In his autē qui continua febre laborant, ulcusq; habent, tum in cartilaginosis, tum locis ex carnibus, uitari debet sinapisimus, nam partes carnibus uacuae si obducantur sinapi, truntur, interim etiam uigrescunt.

*Quomodo diuersa olei & unguentorum  
genera conficiantur.*

**I**NVNCTIONVM unguentorumq; uel olei generum,  
I quæ unguenta repræsentent, alia sunt simplicia, una  
olei specie iniecta: alia composita, ex pluribus conflata.  
Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur,  
uerbi causa, rosaceum chamæmelinum, susinum. Quæ-  
dam ex fructibus & seminibus conficiuntur. quedam  
ex surculis quibusdā, ut rute, qui etiam simul cum oleo  
coquantur, ideo cum nullus florum coctionem sustineat,  
insolantur potius. uerū si ualidam odoris gratiam re-  
præsentent, & constantem, ex insolatu plurium dierum  
tenuius ipsorum oleum magisq; utile redditur, quemad-  
modum rosaceum & chamæmelinum. Qui inualidiores  
sunt, faciliusq; diffilari possunt, minus insolatum tole-  
rant, ut quorum uirtus promptè euanescat, utpote lilium  
& uiola. Ex his quæ fructibus & seminibus constant,  
nonnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, ueluti  
melinum. nonnulla contusis uel leuigatis, oleamine ipso-  
rum sequestrato, uel expressis ipsis in prælis: uel ex a-  
qua calida, sic ut ipsa discernatur, exempli causa, caryi-  
non, sesamum, amygdalinum, lentiscinum, laurinum, ri-  
cinum, raphaninum, atque eius notæ alia. Porro quæ  
ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissi-  
mum solent, illis oleo incoctis cum uino uel musto uel  
aqua, atque eisdem deinde exemptis. Liqueoribus autem  
quibusdam oleo temperatis interim & adipibus uel  
medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinē

sortita, simplici sermone unguenta uel inunctiones nominantur, ut gleucinum, uardinum, sicyonium & cyprium. Sunt quæ acopa crassitudine representent, ceram aut resinam aut eiusmodi quippiam recipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decamyron, amaracinum, atque his similia. Iam uerò aliqua una uice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiam, sicuti metopion, mastichinum, sicyonium: aliqua duabus tribusue & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut aspalatho, palmeo surculo, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, anomo, herba sabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. & si eueniat, cera quoque & resins inditis. At balsami liquor nequitquam coquitur, sed post absolutam coctionem, unguento mediocriter refrigerato instillatur. imò ex ipsis unguentis sunt quæ nullam coctionem recipiant, sed tantum misceantur, quale est mendesium. Nonnulli uerò uiride unguentum reddere cogitantes, ubi ab igne sustulerunt, in olei sextarium æruginis rasæ in exactum detritæ læuorem sesunciam immiscent, quemadmodum in cyprino & amaracino. Cæterum simplicia quidem unguenta specierum quæ in ipsa mittuntur, naturam, uel eorum ex quibus contusis facta sunt, obtinent, ut oleum ueluti materiæ rationem obtineat. At quæ uariam magis compositionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata est, sed quædam ualide calefaciunt emolliuntq; ut etiam articulis recentu cicatrice obductis, & sinibus eorum infarctis conueniant, ueluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodum decamyron



myron ualentius, ut etiam superficiem rodāt. Sunt quæ mediocriter calida, tenuiaq; existunt. ea dolores leniunt, & concoquunt, quale est susinum, amaracinum, irinum, crocinum, foliatum. Alia præter quàm quòd calefaciūt, abundè siccant inciduntq; , ueluti cyprinum & sicyonium. Alia calefaciunt quidem insigniter, sed uires magis confirmant, unde stomacho potissimum & uisceribus resolutis competunt, qualia habentur mastichinum, nardinum, & gleucinum. Valentius adhuc corroborat, quod ex labrusca conficitur. Iam nonnullis unguentis obgratum duntaxat odorem mulieres utuntur, ut foliato, spicato, commageno, & quæ moschelæa, quasi dicas, ex moscho & oleo confecta nuncupantur.

F I N I S.

# E primo libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

KATA GENH.

*Quæ præscire conuenit eum qui Medicamenta probè compositurus sit.*



**E**XPOSITVM est alibi, simplicium medicamentorū vires nō solum generatim noscendas esse, ut quidam scripserunt, ponentes ea uel calefacere, uel refrigerare, uel siccare, uel humectare: uerū distincte, membratimque, & ex quo sint ordine singula, uti nos docuimus. Quandoquidem igitur nonnulla medicamina obscure prorsus uinumquodq; prædictorum efficiunt, quædam manifestò, aliqua ualide, sicut alia absolute, nō satis est nouisse pharmacum hoc calefaciendi, aut refrigerandi uirtutem habere, sed quantam habeat, definire oportet. Recalefaciunt enim resinæ omnes, idq; sibi cōmune habent: attamen maioris minorisq; rationem non exiguan in calore sortitæ sunt. Item succi plures non mediocriter, ratione ad maius minusq; facta differentes, excalefaciunt. Nam si panacis succum cyrenæo & medico cōmisceas, uidebitur tibi ille nihil ceu ad hos esse. At quorsum attinet sermonē ab ijs quibus utimur quotidie, diuertere longius, memores adhuc

adhuc illorum differentiae? Anethum siquidem & ruta, cepa; omnia calida medicamenta magno inter se uariant discrimine. Quapropter in curationibus particulæ admodum refrigeratæ, medicamen quod impense calefaciat admouebinus: illi uerò quod paululum à naturali habitu receßit, modico leuiq; calore præditum, sicut insigniter refrigeratæ uehementissimè calefaciens pharmacum adhibebitur. Meritò igitur quatuor nos excalefacientium ordines statuimus: separantes à modicè calidis ea quæ euidenti eiusmodi qualitate præcellunt: tum quæ magna & uehementi adeò, ut urere uideantur. In singulis autem illis quatuor ordinibus diuersis quædam uelut incipientis, nonnulla desinentis, & ei quæ post hanc existit, propinquæ differentiae esse dicuntur: alia in illorum medio consistunt. Itaque sunt ex his quæ propter caloris uim exulcerant; quemadmodum etiam ex illis quæ exedentia Latine, *συντμα* Græce nominantur; alia simulatque corpora contigerint, potestatem suam ostendunt. Quædam duabus tribusue, aut quatuor horis opus habent: nonnulla diem totum, uel etiam post eum noctem, uel maius dein spatium requirunt. Hæc iam ut in calefacientibus, ita quæque in refrigerantibus intelligere eum oportet, qui medicamen aliquod confecturus est. Pari modo in ijs quæ buccæ mestant exiccantq;. Cæterum materiæ medicaminū quædam à plantis, quædam à metallis, nonnulla ab animantibus proueniunt. Quas omnes in commentario de simplicibus medicamentis definite expressas didicisti: nam cum familiaribus hic mihi sermo potissimum est, qui precibus me adegerunt, hæc propter librorum interitum deuotè perscri

perscribere. Iam uerò ut simplicium medicaminum uniuersorum facultates examussum uobis cognoscendæ sunt, quò ubiuus corporibus curationē desiderantibus idonea ex ijs quæ adsint, facile possitis remedia componere: ita etiam omnium præter naturam affectuum species ad unumquem tenere expedit, quas primum quidem libro de morborum, altero de symptomatum differentijs, tertio post illos de morborum causis comprehensas habetis. Ad hæc alijs tribus de symptomatum causis: uno insuper de plenitudine, necnon de febrium differentia commentario, postremo medendi methodo: in quibus affectiones actionem lædentes didicistis. Item curationem harum primam esse, quemadmodum etiam præseruationē causarum eas parientium. Docti pariter estis, primæ curationis consilium à morbi dispositionibus suggeri: cum his unà patientis particula naturam indicari. Præterea aëris nos ambientis temperamēta, constitutionem, ætatem, tempus, locum, uitæ propositum, & mores, plures egregij medici inspiciunt: de quibus ubi eorum usus fuerit, aliqua simul & hic nobis dicentur. Hæc itaque in memoria nos omnia sic exprompta habere expedit, si quouis loco medicamentorum, tum simplicium, tum compositorum copiam habere desideratis. Insuper quomodo unum interrim aliquod pharmacum sponte natum, ac simplex, morbum curare possit: cur interim cōposita nos usurpemus, rationem deinceps explicabimus.

Quis compositorum medicaminum vsus.

**S**I tantum simplicibus medicamentis uniuersos præter naturam affectus curare liceret, nullus utique compositi

siti unquam usus foret. At hoc nunc ita comparatum non est: nam dum corpus subinde aliquatenus calefacere conatur, simplex nullum, quod præstare id queat, habemus. Medicamentum enim affectioni cui adhibetur, potentia nimirum respondere oportet. Quod si affectus sit frigidus, quatuor numeris à naturali habitu recedens, phar-macum totidem gradibus à caloris mediocritate seu sym-metria diuersum adhibendum quis ignorat? Porro cum interim tale simplex non adsit, si duo habeamus, quorum hoc numeris quinque, illud tribus calidius sit, temperantes ea, medium efficiemus, quatuor numeris symmetron ex-uperans. Iam quædam simplicia citra alterius mixturam ne in usu quidem esse possunt: ueluti cum emplastrum pharmacon apponere cuipiam uolumus: quippe simplex nullum ad talem usum idoneum est, neque bitumen, ne-que cera, neque resina, sicut neque pix, neque propolis ac ladanum: multominus ærugo & cerussa, uel spuma argenti, uel molybdæna, uel aliud quoddam metallicum medicamen. Simili modo nec herbe solæ emplaston phar-macum efficiunt. Quare primi emplastrorum au-ctiores non temerè ex oleo quoque metallica coquere conati sunt, quæ liquefieri possint, liquefacere, ac herbas contusas siccas cribratasque eis adijcere. Rursus in alijs affectibus unum medicamentum solum ex ijs quæ suapte natu-ra proueniunt, usurpamus. Cui tamen nonnulla adijci-mus aliquando uirium ipsius uehementiæ obtundendæ, interim insuauitatis mitigandæ gratia: quemadmodum Hippocrates in libro de Victus ratione in morbis acutis hisce uerbis inquit: Si sub transuerso septo dolor sit, ad clauic

clauiculam uerò non ascendat, emolliendus est uenter uel nigro ueratro, uel peplio: nigro quidem daucum, uel selseli, uel cuminum, uel anisum, uel aliud quid odoriferum miscendo: peplio autem silphij succum. Hac ratione manifestò Hippocrates usum quidem pharmaci purgantis esse ostendit, sed insuauitatem eius in potu, moramq; in uentriculo condimentum requirere. Multa siquidẽ quæ bibuntur pharmaca tam sunt assumentibus insuauia, ut stomachũ peruertant, uonitumq; protinus cieant. Quædam licet paululum in uentriculo manere possint, postea tamen euomuntur, prauis eructationes mouentia: quemadmodum ex purgantibus ceu condimẽta sunt eiusmodi medicamina, quorum Hippocrates meminit: ita ex ijs quæ ἀνάλυα appellantur Græcis, alia uehementiam mitigant, ut cum papaueris succum, uel hyoscyami semen miscuerimus, uel mandragoræ radicis corticem. Quare & hic pharmacorum compositionis usus est, maximus autem in morbis, qui diuersas simul facultates desiderant, expellendi uidelicet & digerendi, uel detergendi ac leuigandi, uel incrassandi simul & attenuandi humores: ueluti multiplicis usus medicamenta, Græci πολυφάρμακα uocant, & optima, diuersas in se potestates, ut indicabimus, continent. Verùm his medicamẽti mĩsturæ usus est, cum unum aliquot illorum ad multas uenenatas feras, uel exitialia pharmaca efficax habere uolumus: qui usus etiam theriacan, ut uocant, antidoton comparauit, item muthridation, aliasq; multas. Sunt porrò & aliæ quædem utilitates minores prædictis, attamen quæ crebrò nos ad remediorum compositionem descendere cogunt:

uniuersas

uniuersas hoc in opere docebimini. Nunc enim post em-  
plasti medicaminis, & χαλκήρεος, id est ad plura uti-  
lissimi à me confecti rationem fusius expositam institu-  
tum aggrediar.

De emplasto pharmaco. Αἰχμητικῶς.

**Q**Ua ratione seu industria composuerim emplastrū  
Αἰχμητικῶς, quod à palma Græce φοινικίτης ἀφ-  
πello, medicamen glutinandis ulceribus, cicatrice obdu-  
cendis, & plegnionis curandis accommodum ( quando  
liquefactum humidi cerati crassitudinē obtinet ) uos quo-  
que animum exercete, Empiricis ac Thessali sectatori-  
bus cum inscitia ipsorum relictis, qui optima pharmaca  
à medicis inuenta diuersis constare facultatibus ignorāt.  
Exercete inquam ingenium, ut eisdem mecum usi metho-  
dis medicamenta possitis conficere: persuasi re ipsa ma-  
iores nostros ex ratione omnia illa composuisse: inci-  
dentiam uerò Empiricorum, Græci uocant περιπρωσις,  
esse nugatoriam. Dicenda itaq; nunc est propositi medi-  
camenti compositionis ratio. Oleum uetus, & adeps di-  
gerendi uim obtinent: Chalcitis & palmæ succus repel-  
lendi, astringendiq;. Ex his igitur pharmacum cōposui,  
quo iam cōplures usos esse nouistis: ideo quod omnibus  
sui generis melius esse usu & experiētia comprobarūt.  
Ètenum ratio compositionem inuenit: experientia de in-  
uentorum uirtute decernit, ut etiā rationalium methodo-  
rum imperitis artificiose confecta fidem faciant. Porro  
cum superioribus medicamentis argenti spumā tempera-  
ui, quæ nihil magni adeò momenti adferre potest: neq; re-  
pellētibus quod influit, neq; digerētibus, quod iam parti-  
culis

culis phlegmone laborantibus infixum est : quippe siccandi uirtutem habet, sed non ualidam. Quare ipsam ceu aptum medicamen in emplastri compositionem adiuuati : nam cum prædictis incoquitur, donec substantia eius omnino digitos non inquinet. Adipem uerò insulsum, & quammaximè fieri licet uetustissimum esse cōuenit : tum oleum uetus similiter, quod cū suillo adipe propinquam uirtutem habere didicistis : licet adeps paulò maiorem emolliendi calefaciendiq; um obtineat. Audistis autem uetustate ipsa tenuioris substantiæ fieri, & digerere promptius : eoq; phlegmonis, quæ magnum parti dolorem inferunt, magis blanda ac nutia sunt ipsa recentia : ijs uerò quæ tales non sunt, commodiora uetusta. Et quò phlegmone diuturnior, & contumacior, hoc magis uetera prosunt, ac sola curare ualent : modò postea nihil affluctæ parti influat. Quòd si influxerit, mixtam esse medicamento quoque uirtutem oportet, cuiusmodi habet à me compositum pharmacum, ac propterea chalcitidem & palmam digerentibus adnascui : non ignarus, paucas adeò phlegmonas diuturnas existere, quibus nihil influat. Nam ob humores in eas confluentes diutinae esse solent. Porro dum hæ incipiunt & accrescunt, astringentium refrigerantiumq; medicaminū uirtus recte præpollet : ideoq; hoc emplaston pharmacum adusque humidi cerati spissitudinem liquefactū multis utile redditur, interim uino adiecto, uel aceto, uel aqua illiquefcēs : nonnunquam ex oleo crudo, ὀλίγῳ ἔλαιον appellat, uel alio quodam astringēte, quale est Hispanum, & Histricum : uel ex dulci aliquo astringentis experte, uel etiam uetusto.



vetusto. Ego quoque myrteo & melino, ubi ualidius astringere res postulabat, medicamentum liquefeci. Hæc ipsius compositio tali temperatura constat.

Vetusti adipis, quem institores axungiam appellant, sint pondo duo, olei ueteris pondo tria, argenti spumæ tantundem, chalcitidis pondo uncia quatuor. Hæc ita coquere oportet: Adipis membranulæ omnes eximuntur, reliquum \* contunditur, ut liquari possit: mox ad ignē \* cōfringitur liquefit, deinde per colum distillatur ut purum fiat, nihilq; membranæ habeat, pondo duo prædicta pendens: postea chalcitidis lævigatæ pondo triens cum olei quadrante adipe miscetur: his argenti spumæ pondo tria adiunguntur. Ac omnia ubi simul in mortario coierint, coniunguntur in cacabum, ac rudicula palmæ mouentur. Sufficiet autem ramus unus maiusculus, ut solida ligni parte mouendo utaris in modum spathæ dictæ: uocant enim sic quo confecturas mouent. & nos perspicuitatis gratia similiter nominabimus. Quod autem solidæ rami parti contiguum est, circunciditur, & tenelli procedentes ramusculi decerpti contunduntur, sed cortice prius exuto, ut segmenta iniecta pharmacum succo suo imbuant inficiantq;. Proinde statim ab initio spatha utendum est, sed tenuia palmæ fragmenta iniicere oportet, ubi medicamentum cerati temperaturam habuerit: nam si prius immittas, succus ipsorum, quem manere uolumus, ex decoctione consumetur. Insuper spathæ, qua medicamentum mouetur, pars intincta postquam inarescit, ut proprium succū non amplius seruet, amputata reicitur, reliqua est usui. Hæc rursus quatenus medicamento intin-

Et siccata fuerit, simili modo absecatur. Constat autem nobis arbitror, quod palmæ ramū non multis diebus ante abscissum arbore esse oportet: quippe temporis intervallo arescit, & succum amittit. Pridie igitur per hyemē auferatur, æstate eodem ipso die quo cocturus es pharmacum. Vbi iam coctum crassitiem, ut tactum non inquinet, acquisierit medicamen, illitum facit ad ulcera, quæ cicatricem ægrè ducunt, *δυσκοίλωτα* Græcè uocantur: ad cruēta ualeat oleo liquefactum: benefacit phlegmonis, podagris, articulorum morbis, inguinum inflammationibus, phymatis, ambustis, pernionibus, fracturis ossium, contusionibus, omnibus deniq; affectibus, quos appellant rheumaticos. Iam uerò multi qui hernias absecant, post manus operam statim ipsum cum fomentis & cataplasmatibus præparatum imponunt: si quidē chalcitidis uncie sex immittuntur, quæ est selibra, medicamen ad magna uulnera glutinanda promptius, atq; ad ea quæ cicatricē ægrè ducunt, efficacius fiet. Sunt in hoc etiam alia eiusdem potentie medicamenta: ipsi tamen cum oleo-liquescto magis quàm alijs omnibus in rheumaticis affectionibus fidendum est. Cum enim plurima eiusmodi Romæ existerent, nullum tam celebre probatumq; fuit. Conducit, ut dixi, podagricis, articulorum uitio laborantibus quolibet tempore, cum dolores intensi nō sunt, qui solus & cataplasmata lenientia postulent. Incipientibus igitur atq; augescentibus etiamnum id genus uitij, liquefactum pharmacum refrigerare finito, ac spathomela deradens pile inijecto, cui uinum superfundito: quod ut recipiat, manibus subigito. Erit autem uinum austerius, ætate quidem

dem medium, substantia non crassum, sed quàmmaxime fieri potest lucidum. Nam huiusmodi, utpote substantiæ tenuioris, in altum corpus penetrat: tantisper autem liquefacto medicamini ipsum infundito, manibus continens, dum excipiat tempereturq;: nec humidum restet, quod non cōtrito ac emollito pharmaco mixtum sit. Ad hæc etiam si non prius refrigeratum medicamentum deraferis, liquefacto & adhuc calido uinum superfusum permiscere licet. Itaque in phlegmonē principijs uim repulsoriam ualidiorem esse oportet. In incrementis uerò hæc nonnihil imminuenda: quæ digerit uirtus augenda est. Porro cum in statum proprium, seu uigorem phlegmones tumor peruenerit, pares inuicem esse potestates conuenit repellendi & digerendi: nisi quis uehemens dolor pharmacum leniens requirat. Cæterū inclinante phlegmone digerendi uim augebitis, ut prorsus nihil uini eo tempore misceatis. Præterea dum id liquefcit, si quando astringentioris qualitatem euidenter excellere uolumus, Hispanum oleum, uel Histricum, uel quod omphacinum seu omotribes, Latine immaturum, seu crudum appellant, iniiciendum est. Vbi æquales utraq; facultates habere cupias, oleo dulci, nec recenti, nec uetusto liquandum est. Si ut digerat expetis, uetus oleum, uel cicinum commodè sumitur. Itaque hoc emplastrum medicamentum dum liquefit, in hunc modum temperatur: Oleum paulò copiosius quàm medicamentum esto, ut pondo uidelicet unum absoluat: medicamenti uerò decem uncias iniecisse abundè suffecerit. Clarum est cuilibet, hoc efficacius reddi emplastrum, quò plus medicamenti

habuerit : tanto lenius ac mitius , quanto liquidius fuerit ex Rhodino liquefactum . At cerati quod inungi possit , temperamentum recipit , dum medicaminis pondo in olei selibra liquatum fuerit . Tale uerò phlegmonon inclinacionibus ex usu est . Item sedis , rectiq; intestini tumores phlegmonodas sponte abortos omnibus melius iuuat : atqui tunc liquefactum oportuit cum oleo copiosiore , ut per cornu recti foraminis , cui uesica suis alligata sit , immittatur , uelut in eiusmodi usurpare consueuimus . Ad hæc frequenter ipsum in his ex Rhodino liquefecimus , cacabo uasi in quo liquefcit prius subiecto , qui calidam contineat : prunis uerò ardentibus inciebat , aut flammæ fumo carenti . Iam uerò pro superioris temperaturæ modo liquatum , ut liquidi cerati spissitudinem habeat , & naturalium & podicis ulcera persanat , imò & alia omnia , uel etiam ulceratos perniones , & ambusta : etenim uniuersa statim inflammatione liberat , puraq; reddit , & solida implet carne , præsertim ubi plus calceitis adiectum fuerit . Insuper nemo ignorat , uinum quoq; medicamento id effecturo adnuscendum esse . Quod si acetum acceperit , ambustis optimè facit , & statim , & postea quolibet tempore impositum : siue illa iam pustulas , siue non habeant . Constat idem facere medicamentum hoc , si quis in aqua feruenti uisus fuerit : qui etiam affectus Græcè ὑγρὴν αὐτὸν , Latine ambustum igne dicitur . Porro si pharmacum antè imposueris quàm phlegmone sit orta , nihil adeò ipsius generationem impedit probetq; . Quapropter , ut dictum est , nonnulli qui hernias secant , statim eo utuntur , nec prius uulnere madefacto .

Ad

Ad hæc contusionibus, fracturis, & qualibuscunque plagis, si liquidum imponitur, præsens est remedium. Ligamentis autem circumdatum fasciarum instar quibus rupturæ deligantur, κατὰ ματην uocant, œdemata omnia & inflationes mirificè iuuat. Cùm malo succo corpus abundat, uel admodum sensibile est, quàmprimùm contusis & percussis partibus illud impones, hyoscyamos recens adijcietur: qui si non est propter anni tempus aut locum, nihilo magis desiderabis, si adiungas eum qui uere depositus est, qualis etiam singulis annis ex Creta Romanam apportatur. Hoc magis adhuc lene ac blandum medicamen succus mandragoræ mistus efficiet. Non autem uos latet, & hunc à Creta optimum fictilibus poculis huc afferri, cuius unciam unam libræ olei emplastri liquefcentis miscere sufficit. Atque interim amplius, intermin minus impones, prout dispositio postulat. Conducit etiam in eiusmodi corporibus pharmacum ex Rhodino liquefactum esse. Cæterum ex casu conquassatis partibus, uel ligno, uel lapide percussis, etsi ecchymosis quædam contigerit, protinus ab initio medicamen commodè imponetur ex uino, ut docui, liquefactum. Quod uinum, inquam, die tertio, aut certè quarto, si particula inflammatione careat, auferri oportet: oleo autem ueteri emplastrum liquare. Nam si plenius astringantur ecchymomata, uix queant per halitum digeri. Hoc medicamentum etiam utor aduersus erysipelata, præsertim phlegmonode: adhuc longè magis ad phlegmonas erysipelato-dēs. Principio igitur impono ipsum liquatum ex Rhodino, quod oleo omotribi, id est crudo & salis experte

constet: cuiusmodi erysipelatis est accommodatissimum. Ita iam liquefacto solani succus per totum accuratè permixtus uniuersus & irriguus mortario superfundatur: qui si non adest, psyllij: si æstas fuerit, etiam uuae acerbae cum portulacæ, uel semperuiui succo. Etenim uuae liquor per se plus quàm oportet, astringit. Tanta autem astrictio erysipelata promouet, ut quæ calorem ipsorum cutem densando includat. Rursus portulacæ succus, neque is solus præ lentore nimio potest exprimi. Optimum igitur est, qui ex uua acerba prius trusa exprimitur, portulacæ in pila committere, & sic iterum contundere. Deinde ubi mixtorum unitas diligenter facta fuerit, liquorem elicere. Simili modo etiam semperuiui succum exprimes: nam seorsum neque ex hoc, quemadmodum neque ex cotyledone succum copiosum exprimere quisquam potest. At mandragoræ pomorum uirentium succus recens adiectus magis aptum medicamen efficiet: quem si tempus non admittat, illius quæ à Creta, uel aliò quopiam loco aduehatur, miscere nō dubitabis: quin & hyoscyami succum temperare ei consueuimus, interim meconiū, qui papaueris esse Latinis dicitur. Satius autē est, unā cum hoc & glauci quippiā superindere. At his multò imbecillior, sed acquisitu facilis lactucæ succus est, tum agrestis, tum hortensis: quam uniuersi Græci huius tempestatis non *ῥαϊνὸν*, sed *ῥαϊνὸν* nominant: agrestem solam *ῥαϊνὸν* appellantes. His rursus cicorij, polygoni, trifolij, & auriculæ muris succi minus ad refrigerandum efficaces sunt: quanquam & ipsi refrigerent. Sed euidentius lenticula palustribus locis proueniens.

Horum

Horum omnium penuria miscebis acetum & aqua, quæ  
 ascititias qualitates frigidas habeant : uasis uidelicet ad-  
 modum frigide, aut niui insistentibus, atque ipsum Phœ-  
 nicinum medicamentum æquè refrigeratum erysipelatis  
 admoueatur, donec uehemens ipsorum ardor subsidat.  
 Liquet autem, subinde ea quæ aduentitia qualitate frigi-  
 da erysipelatosi affectibus succurrunt, immutanda esse,  
 maxime, ubi exactum erysipelas citra phlegmonem fue-  
 rit. Posteaquam uerò acris illa inflammatio quieuerit,  
 aut nec perfectum planè erysipelas affluerit, sed uel ery-  
 sipelatoses phlegmone, uel phlegmonodes erysipe-  
 las, non adhuc externum frigus admolierimur, uerùm à  
 succis etiam impense frigidis abstinēbimus : eos medica-  
 mini liquefacto miscētes, qui mediocriter refrigerant.  
 Ab his iam & linospermī & chamæmeli succum tem-  
 peramus, ex eoq; solo postea medicamine liquato ute-  
 mur, nihil aliud præterea immittentes. At si quando li-  
 uidum ex frigefacientium uī erysipelas euaserit, non id  
 amplius erysipelas appellandum est : sed abstinere non  
 à uini mixtura modò, sed Rhodini quoq; & astringen-  
 tium oleorum oportet. Nam solum Phœnicinum ueteri  
 oleo liquefactum, quod liuorem contraxit per halitum  
 discutere potest : & tunc affectæ partes aqua calida  
 fouentur, & scarificantur. Vobis si fuerit uisum hoc  
 interdum facere, protinus Phœnicini liquefacti humi-  
 dum medicamen, cui uinum adiectum sit, imponere  
 conuenit : altero die uinum auferendum. Quòd si plus  
 impendiò erysipelas medicamentorum uiolentia refri-  
 xerit, ut iam quoque nigricet, perfusione & scarifica-

tione utemur. Atque citra hæc calcis uiuæ quippiam li-  
 quescenti pharmaco immutemus. Dum uerò laborantes  
 teneri sunt, lotam ipsam usurpabimus: tunc prodest etiã  
 succus coriandri pharmaco inditus, qui sanè cum cerato  
 rhodino iuuat non mediocriter. Ad hæc quæ iam similes  
 affectus alia pleraque medicamenta curant, sequenti ser-  
 mone dicentur: quædam pari uirtute Phœnicini, non-  
 nulla efficacioræ prædita. Porro aduersus fluxionũ uis-  
 tia, omnium facile optimum hoc remedium est, ut quod  
 spe maiora frequenter præstiterit. Cum itaque semur  
 aliquando prope inguen cruda phlegmone totum id affi-  
 gente suppurasset, crus ita nobis figurabatur, ut sanies  
 ad inguen conflueret. Facto autem ulcere, dum hoc lon-  
 gioræ interuallo contingeret, fluxio quæ in semur decu-  
 buerat, euacuata est. Sed fistulosa quædam dispositio sub  
 femoris totius cute orta est, ut ipsam iuxta patellam, quæ  
 genu pars ἡ ἡνωτὶς Græcis dicitur, diuidere cogitare-  
 mus, quò saniei utrinque liber esset exitus: medicamen-  
 tis autem liquidis inditis altius penetrandi uia præptior.  
 Vbi iã semur soluissem, postero die quo incidere ipsum  
 decreueram, inuenta sunt omnia concocta, arida, mado-  
 risq; expertia. Nemo igitur non nouit quòd rationi con-  
 sentaneum erat, & postero die, & sequentibus similiter  
 uti pharmaco: quando quidem particula quotidie colo-  
 rator ac sanior quàm antea reddebatur. Curato itaque  
 hoc modo adulescente, postea multas rheumaticas affe-  
 ctiones hoc medicamine sanauit, quæ quidem oras simpli-  
 ces haberent, sed ut committi non possent, & fistulose  
 intus essent. Non tamen ab ipsius pharmaci usu desisten-  
 dum



dum esse suadeo, etiam si multis diebus euident nullum  
presidium afferre uideatur, ut quod postea uno interim  
die simul uniuersam utilitatem maximam ostēdat. Qua-  
re bono animo hoc semper in rheumatis utamini: in cor-  
pore tenero quidem, uel puero, uel muliere ad prædictā  
mixturam quatuor uncias chalcitidis impūttentes, in uas-  
lido ac duro pro aliorum portione, uel unciam unam,  
uel duas apponentes, ut quinque uel sex chalcitidis un-  
ciæ sint, tres libræ utriusque, nempe olei ueteris, & ar-  
genti spumæ. Duæ uetusti adipis, quem institores axun-  
giam appellare diximus, diluatur in rheumatum uitij  
oleo dulci nec nouo nec ueteri: assumaturq; uinum au-  
sterum ætatis mediæ. Hoc pharmacum coarguit Thessa-  
li nugacitatem, efficacissimum auxilium à contrarijs po-  
tentijs compositum ostendens: unde si alteram adimas,  
nihil prædictorum fiet. Neque enim ex astringentibus  
solum, siue laxantibus ad rheumaticos affectus magnam  
commoditatem afferet, uel certè ad phlegmonas inci-  
pientes, & augescentes. Neque lenimentum, neque discu-  
tiendi uim ex solis relaxantibus sine astrictione conse-  
ctura nanciscetur: quæ indurata habent emollire. Por-  
rò laxabit perfecte, & mediocriter emolliet, si non ad-  
modum uetus oleum & adipem receperit. Quod itaque  
Mnaseus pharmacum condidit, æqualia inuicem conti-  
net, tum oleum, tum argenti spumam, tum adipem, sed  
maximè phlegmonis incipientibus incrementibusq; est  
contrariam. Habet & nostrum hoc eadem quæ Mnasei,  
argenti spumam uidelicet, adipem & oleum: si nihil ex  
ijs quæ astringunt acceperit, particulas enervat, & ro-  
-

bur earum dissoluit : ob quod etiam fluxioni fiunt obnoxie. Didicistis enim, non semper ob calorem immodicum, ut quidam arbitrantur, corporis particulas fluxionibus laborare, sed hoc raro accidere: imbecillitatem uero illarum id genus uitij progignere, quæ ut plurimum ex intemperie frigida proficiscitur. Itaque si humectet eas quispiam, calesciatq; medicamentis laxantibus, dissolutæ prorsus & infirmæ fiunt. Rursus si tumores in rheumaticis morbis fortiter astringat, initio quidem proficere uidebitur: cæterum qui restat, cõtumacem & scirrosam faciet. Nam tales affectus subinde ne quidem ferunt nimis astringentium impositionem, ut à quibus dolore & tensione molestantur. Atqui omnis dolor inflàmata excuit irritatq;, & fluxionibus occasionem præbet: quamuis rheumatica intemperie æger non afficiatur. Sed miri nihil est Theßalum medicæ artis operum inexpertum, & qui morbos ratione inuenire nequeat, omnem phlegmonarum curationem ignorare. Vobis autem qui crebrotum Phœnicini huius, tum aliorum medicamentorũ, quæ contrarijs constant uirtutibus, efficacissima in multis morbis auxilia uideritis: conandum est interim, ubi iam composita desiderantur, eadem methodo ex illis quæcumque regio præbet, cõficere: cum phlegmonẽ suspicamini futuram, uel incepisse modò, quæ magis astringũt: in augmento, quæ minus: in statu & inclinatione, quæ magis relaxant, & digerũt. Semper tamẽ utraq; misceatur, & repellẽdi, & discutiẽdi facultas: nisi quãdo fluxio prorsus cõstiterit, et corpus uacuum fuerit, tũc ad digerẽtẽ, sicut in primis incursionibus ad repulsoriã uirtutẽ, tuta est accessio.

De em

De emplastris quæ ex argenti spuma præparantur.

**Q**uoniam in emplastri mei Phœnicini confectura adipem uetustam & oleum, digerendi potestatem habere dixi, chalcitidem uerò & palmam colligendi repellendiq; : hæc autem medicamen emplastrū sine argenti spuma procreare non possunt: ob id uisum mihi est de ipsius spumæ usu deinceps uerba facere. Siquidem Phœnicini uiribus nec eam obesse, nec conducere, sed materiæ ad emplastri pharmaci compositionem idoneæ rationem obtinere putandum est. Non absurdum itaque mihi apparet, si de eiusmodi medicamentis, exempli gratia, de spuma argenti disputationem instituero. Sunt non pauca quæ potestatem aut nullam, aut exiguam admodum pharmaco quod præparatur simul afferunt: commoditatem uerò materiæ præbent, ut uel emplastri, uel ceræti speciem referat. Neque enim argenti spuma manifestò calida est, sicut nec frigida, nec humida, sed modicam siccandi habet uirtutē in primo abscessu, ab his quæ admodum media sunt inter humida & sicca. Non tamen uis eius est ferruminare, sicut nec aperire: item nec abstergere, quemadmodum nec expurgare euidenter, sed paulum à medijs ad crassius recessit. Verum hoc quoque ex diuturna coctione deponit fusa ob ignis potentiā, & alterata. Porro sola per se cruda femorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam modicè exiccare cognoscitur. Ad hæc neque acrem, uel suauem, neque acidam, uel amarā, uel austeram, uel acerbam, uel omnino astringentem facultatem ipsam habere gustus abundè testis est.

Quem

Argenti spumæ  
us & vi  
res.

Quemadmodum etiam ulcera nec ab ea derodi; nec calee fieri, nec refrigerari, nec purgari, nec carne impleri, nec cum caro supercreuerit, tolli percipimus. Licet itaq; nobis in uarium usum administrare argenti spumam, interrim ex oleo & aqua coctionem eius adusque emplastri spissitudinem molientibus, interdum ex oleo & aceto, aliquando ex oleo & uino. Porro in quibuscunque istorum coquatur, melius id medicamenti redditur, quod magis coctum fuerit, quod liquidorum quæ miscentur copia continget. Est enim ex ijs pharmacis, quæ liquefieri possunt, etiam spuma argenti, dum tota funditur, sicut resina & cera: sed non statim ubi ignem contigerit. Vnde multis imponit, qui nullo modo ipsam fundi existimant. Igitur cum oxaleo cocta, liquefcit citius perinde ut cum erugine, quæ & ipsa fundi solet, uti chalcitis & misy.

De metallis Omnitum itaque celerrimè chalcitis funditur: tardissimè quæ liquefcit argenti spuma. At in horum medio sunt ærugo & misy: funditur & fori, sed longior e tēporis interuallo, ut quod terrestris magis & saxeam sit quàm chalcitis & misy: sed de his iterum dicetur. Argēti spumam per oxaleum coquens ocys liquefacies, per hydrelæū tardius: tamen funditur sic quoq; , si duplum eius sit utrunq; liquidum. Ego certè plus etiam quàm duplum misceui frequenter, ut paulò post exponam. Atqui melius est statim ab initio hæc tria in mortario temperare, argēti spumam, aquam, & oleum. Quòd si candidum medicamen esse cures, oxaleum purius lucidiusq; inijcito, atque aquam similiter puram ac candidam, coquaturq; in loco sub dio soli exposito: quia nubilus aër pharmacū denigrat: sincerus ma-  
gnum

gnum ad albedinem adiumentum adfert, sicut aqua in huiusmodi aëre aspersa. Cæterum observato, ut coctionem lignis, aut carbonibus peruri incipientibus moliaris. Nā Vt cādidum sumus ei facile nigredinem conciliat. Perustus igitur an sit emplastrū tea carbonibus cum exactè ardent, tunc coctionem auspicare. Quòd si illam protinus non absoluant, in alio foco simili modo carbonibus preparatus cacabum superponito. Quæ ergo medicaminis candidi faciendi gratia observanda sunt, abundè satis indicatum est. Iam uerò hoc fit glutinans, quo plus, ut demonstratum est, liquoris affuerit. Quenadmodum si singulorum trium pondo libram unam inijcias, firmitus adhærebit. At si argenti spuma non illiqueſcat, causa est potissimum, cur id facile decidat: sicut diutius adhæret, cum argenti spuma cocta sunt dicitur, alteraturq; . Candidius sanè erit, citiusq; coquetur, libris duabus aquæ in tres utriusque, puta spumæ argenti & olei iniectis . Atque hoc in parvis ulceribus uti consuevimus. Medicamenti, quod aqua coquitur, potestas nota est, si meminerimus eorum, quæ in commentario de simplicibus medicamentis dicta sunt.

De emplastro quod ex argenti spuma  
& hydrelæo conficitur.

**A**qua peculiari substantia semper humectat & res frigerat. Ascititio autem calore assumpto, donec ipsum perservat, excalescit: frigida facta refrigerat. Oleum sanè si recens sit, pharmaco non renititur: permanet enim humidum & modicè frigidum, quali maxime tenera corpora & vitiosis humoribus obnoxia indigēt.

Mulieres

Mulieres itaque & pueri, atq; ex grandioribus mollem corporis habitum sortiti, nempe candidi cute, eius generis medicamenta requirūt. Porro coctum ostendimus ex oleo copiosiore, & aqua reddi tam glutinans, ut ne quidem à lotis decadat. Etenim ulceribus quæ ad cicatricem ueniunt, multis diebus subsequenteribus pharmacū innanare expedit, quò melius & citius ita cicatrix ducatur. Notum est huiusmodi pharmacum pruritus, desquamata, & ut uno uerbo expediam, praua ulcera persanare, in quibus & subliquidum, ut uocant, ceratum, aliaq; id genus utiliora sunt ijs, quæ ualidam potestatem occupāt, qualia magnis uulneribus imponuntur. De quorū omnium simul uirtute in tertio libro de morbis curandis dictū nobis est: in quo generales communesq; sermones (uniuersales nuncupant) de quaque ulceris differentia tradidimus, ostendentes, quales medicamentorum, quibus illa curabuntur, uires esse conueniat. Hic uero particulares materias recensemus, temperaturas eorum definientes & modos, quibusq; in præparatione reddantur optima demonstrantes. Ex hydrelæo itaque argenti spuma, sicuti comprehensum est, præparata, emplastrum tactu blandissimum, & adherendo pertinax efficit: præterea aspectu album, refrigeratorium uim habens mediocrem, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat, impedit, & iam influxū denuò ad partes extimas retrudit, ut res fiat huiusmodi, qualis cum spongiam aqua frigida humentē particulæ cuidam corporis imponimus. Nam illa rugosum contractumq; totum locum facit, non tantum expellens quod influit, sed etiam quod in eo continetur ad uicina

cina extindens. Atque emplastrum modò commemoratum, non ex prima facultate, sed per accidens exiccare dicetur. Propriè nimirum & primariò ea quæ digerūt, & temperamenta ad sicciorum statum perducunt, nominantur siccantia: ex accidenti uerò etiam ea, quæ frigoris causa id quod influit, remittunt: quod continetur, expellunt. In summa, nullum humectans, uel primariò, uel ex accidenti ulceribus commodum est, ut in tertio Methodi medendi libro demonstrauimus.

De emplastro quod ex argenti spuma  
& oxelæo componitur.

**D**E argenti spuma quæ ex hydrelæo præparatur etiam hæc sufficiunt. Digrediendum modò est ad eam, quæ oxelæo cõponitur. Itaq; mediocriter exiccans medicamentum fit, si utriusq; nempe olei & aceti, duplo maior portio quàm argenti spumæ misceatur. At si uetus oleum sit, multo magis exiccat: copiosior uerò duplo utriusq; mensura ualentius facit pharvacum. Quæ propter fistulas, quæ nondum callum durum habet, curat. Cæterum spumæ argenti una pars inijcitur: illorum singulorum duæ s. Quinetiam tripla cuiusq; parte temperata nonnunquam toto die coxi medicamentum. Vnde quidem reddebatur nigrum, sed perinde ac bitumē probum splendebat. Porro maxima siccandi potētia pollet, curatq; ulcera perdifficilia, & fistulas, quales dixi, iūgit, tū uulnera cruēta glutinat: uno uerbo, exiccat sine morsu. Huius rei gratia etiam alia uniuersa ulcera sanat, maiora minoraq; donec ad cicatricē perueniāt. Aequum est & alia quædā eius opera cõmemorare, quæ forsā ne quidem

quidem speraueris, quantũ ad materiæ humilitatẽ attinet. Nam cum febris solutio ex parotide suppurata cuiusdam accidisset, fistulam fieri suspicati sumus, quam sex mensibus post principium in agro mihi ostenderunt. Erat enim puer agricolæ annos natus circiter quãdecim: huic cum ex emplastro illo, quanta tunc mihi copia aderat, imponendum dedissem, ipse in urbem reuersus sum, pluribus negotijs medicis occupatus: interea oblitus sum eius qui pharmacum acceperat: sed à biestri præter animi mei expectationem uenit incolumis: immittentibus enim nobis suillum pilũ per fistulam, ad articuli commissuram usque procedere uidebatur. Non multo post, cum alius puer forte fortuna eiusdem cum priore ætatis, eodemq; morbo laborãs mihi esset ostensus, emplastrum hoc imposui, quo ille pariter integræ sanitati restitutus est. Ab eo tempore plurimos simili uitio huius medicamenti uirtute liberaui, tum pueros, tum adollescẽtes, tum mulieres. Vos igitur, si uti eo ad huiusmodi affectus uolueritis, uetustissimum oleum, & acetum quãmacerrimum, ex uino uidelicet solo confectum inijcitate: non ut quidam aqua mixta ipsum præparant: sed purum sit, & quãmaxime licet pellucidum. Tale siquidẽ tenuius commodiusq; ijs erit, ad quæ ipsum requirimus. Hoc pharmaco etiam musculos induratos subinde curavi.

De emplastro quod ex argenti spuma & cœnelæo præparatur.

**R**eliquum est, ut de argenti spuma dicam, quæ ex cœnelæo componitur, & parem prædictis temperaturam



turam ac uirtutis excessus pro humorum copia respondentes habet. Etenum æquali portione tria iuxta præparauimus, & duplo maiore utriusque liquidi mensura quàm argenti spumæ: interdum triplo imposita. Confeci autem nonnunquam hoc modo: Per æstatem sole calido argenti spumam ex uino falerno conterebam singulis diebus quindecim continuus, uinum rursus, si forte primum euaporarat, infundens. Ab eo tempore coctum medicamen exiccans abundè factum est: quo in rheumaticis constitutionibus perinde ac Palneo, quod conuincum appellamus, usus sum: ex oleo liquefaciens, ut in illo prædictum est. Ac femur iamdiu induratum, cruentaq; uulnera eo sanauimus. In summa, ad omnia fuit optimum. Atqui si falernum ad manum non habeas, aliud sumito colore fuluum, sed tenuæ substantia, ut pelluceat: cuiusmodi est Ariusium, quod in Chio nascitur, & odorum uehementer Lesbium: in Mitylena paucum, in Eressso & Methymna copiosius meliusq; proueniens. Item quod falerno simile est, Tmolites. Est & hoc tenuissimum, fuluum colore, dulce mediocriter, nimisquàm odoratum. hoc inueteratum omnibus usui esse potest, quibus & falernū. Insuper aliud Tmolites uinū est simile ei colore & substantia: uerū nec dulce, nec odorum. Habet autem uim quandam astringendi, sed suauitate multò inferius est. Hæc itaque ex cocta spuma argenti sunt medicamenta.

De crudæ spumæ argenti usu.

**I**N cocta quidem per se, ut annotauimus, attritus emendat. Ex oleo autem seu uino trita siccataq; ulceribus medetur, quæ ob humiditatem uix cicatricem recipiunt.

*Quòd si rofionis expertem effe cupis, dota utitor.*

*Quomodo lauare oporteat argenti fpumam, & reliqua metallica.*

**F**Acilè eluitor, ut quæ statim propter innatam grauitatem liquoribus, in quibus leuigatur subsidat: unde totam rofionem in aqua lota exiit: acuti uerò sensus homines, parum adeò mordacem percipiunt, si ex aceto uel uino eluatur. Porrò conuenit, diligenter toto die contritam cum liquore per noctem relinquere: postero die mane illum auferre: alium mox superfundere: postea rursus terere similiter: iterumque sequenti aurora liquorem emittere. Quod faciendum est, donec simul cum liquido argenti spumæ uelut tenuissima quædam portio appareat: cùmque nihil sorditiei amplius inest, nihil etiam magis effundendum est. Attamen conterere diebus pluribus, etsi nihil ei insistat, sole feruenti satius est: ita enim accidit, ut medicamentum exiccet ualentius. Porrò nouerunt omnes id æstate non solum in argenti spuma, uerum in alijs etiam quæ hoc modo præparantur fieri commodius. Siquidem cadmia, æris squama, æs ustum, item quod uocatur diphryges, cerussa, misy, fori, stymini, & omnes lapides, præterea calx perinde ut argenti spuma ex liquore aliquo prædicto eluuntur, leuiganturque: interdum ex marina præparationem ipsorum molior, de quibus in sermone processu rursus agitabitur. Nunc enim propositum mihi est emplastra percensere, quæ iuniores medici cum s in ultima syllaba & scribunt & enunciant: quemadmodum

modum in Centrio, & Milotride facere omnes consueverunt. Siquidem in his prima nominum positio uidetur suæ s̄ facta fuisse à uerbo quidem κεντρ Centrio nominato, ultima syllaba s̄ non habēte: Milotride uerò cōposita ex mila & ote. At cū hoc tēpore propè omnes ea cū s̄ efferant, non peccaueris, si eodē modo cum illis pronūcies, præsertim in Centrio. Quippe ostendimus in opere quod cōtra illos, qui barbarè loquentes corripit, prodidimus, & ipsos Atticos uiros ualescentē usum & consuetudinē secutos fuisse. Nā alij quoq; ante me indicarunt Atticorum linguam peruultū à proprietate sua decidisse: ac omnes, quorū eloquentiæ laus ac gloria maxima apud Græcos extat, suæ queng; tēpestatis morem imitatos fuisse. Et nos itaq; cum nullum non inueniamus nunc medicamentarios libros emplastri nomen cum s̄ scriptum habere, usum præualem sequemur.

De medicamētis quæ ex molybdæna cōficiūtur.

**R**elatum est superius quoq;, molybdænā & argenti spumam in eūdē ferè usum adhiberi. Omnia enim quæ ex argenti spuma componuntur, etiam ex molybdæna fieri possunt: sed facultate inuicem differunt, tantum ut molybdæna substantiæ crassioris frigidiorisq; sit: argenti spuma tenuioris, & inter calidam ac frigidam mediæ. Cæterum colores medicamentorum, quæ inde præparantur, molybdæna nonnihil euariat, quāto magis giluos ipsos efficit. Quare & alborum emplastrorum, quæ non modo cerussam, sed argenti spumam quoque habent, nullum ex molybdæna constat. Cuius mīstura color

albus, cinerius redditur: potestas autem ut in albo em-  
plastro, quod ex hydreleo componitur, melior etiam  
euadit, præcipuè in teneris corporibus, tantum abest ut  
pereat. Cū discutere quid uolumus, argenti spuma quàm  
molybdæna potior est. Pari modo in reliquis medicamē-  
tibus, quæ ex argenti spuma compositionis titulum sor-  
tita sunt, cum molybdænam adiicimus, color & uirtus  
immutatur, quantum paulò ante uobis indicauimus.

De emplastris albis quæ ex argenti spuma,  
& cerussa fiunt.

**V**EL coloris causa medici cerussam argenti spumæ ad  
emplastra alba conficienda miscent, uel ut quãdam  
astringendi, ac refrigerandi unum medicamento concilient.  
Quippe uidentes huiusmodi nigrescere, cum largius co-  
ctum fuerit, præsertim lignis, & ijs forsân fumidis, nec  
in aëre puro, mox ab igne tollere coguntur: ob quod  
ipsum nec aquam copiosam, nec oleum temperare. Me-  
rito igitur resinam ei adiungere considerarunt, quo se-  
quax, ac sibi continuum fiat, uiscosum quia assumens,  
maximè cum liquida resina immittitur. at ex tali mixtu-  
ra deterius efficitur pharmacum: etenim mordax ali-  
quid resina repræsentat: quod siccet nihil adeò genero-  
sum: cuius usum priuatim ulceribus esse necessarium di-  
dicistis. Quædam itaque resinæ uel insigniter derodunt,  
de quibus uniuersis iterum sermo futurus est. Mitissimæ  
uero duæ inter eas sunt: prima terebinthina, laryx al-  
tera nuncupatur. Has igitur misceere satius est, ubi id ge-  
nus emplastri conficere cogitas. At multò leniora tactu  
omnia

omnia sunt, tum quæ resina constant, si ceræ quid adiectum sit: tum quæ ex cera, si resinæ nonnihil admixtum habeant: quamobrem cera resinæ temperanda est, ut autem color emplastri albus seruetur, albam esse congruit. Est sanè alba, quæ suapte natura prouenit, pontica: sic nominari consuevit, licet aliunde ueniat, quod plurima in Ponto alba nascatur, alijs in regionibus paucissima. At candida, quæ tyrrhenica nominata est, non sponte cre-  
scit, quare nullam euidentem habet acrimoniam. Quæ uerò suo instinctu crescunt, nonnullæ acres sunt, quas prius eluere oportet in hunc modum: Liguantur primū ad ignem, deinde in aqua fontis pura demerguntur: ubi permouentur expurganturq;. Simili ratione & pix, & resina, & quod physema dicitur, lauandum est. de quibus iterum exactius commentabimur. In præsentia, quoniam albi emplastri compositionem tradimus, reliquum eorum quæ præcepta sunt deinceps percensebimus. Po-  
steaquam ergo cerussæ, spumæq; argenti coctis prius usque dum medicamen digitos non inquinans appareat, cera simul cum resina fuerit adiecta, candidum emplastrū, si placet, habebitis: interim aquam iniicientes, interim oleum duntaxat: idq; nunc recens, nunc uetus. Prius enim iam audiistis, quam uirtutem aqua & oleum uetus habeat: Nouistis item, quod omphacinum oleum, & id quod colitur in Hiberia, quæ nunc Hispania dicitur, astringens quippiam pharmaco adiicit. Histricum non modò exiguam astrictionem, sed amaritudinem quoque refert. Proinde different tantum ex astringentibus confecturæ, ab ijs quæ dulci oleo constant, quanto initio ul-

ceris & fini potiora sunt omnia quæ nonnihil astringēs continent : in medijs, dulcia . Nam in principio medicamenta repellentia prosunt ulceribus, ne phlegmone corripiantur . Inde quæ magis relaxent , si non phlegmone adsit, transpiratus gratia: quòd si affuerit, etiam ob illam ut citius dissoluatur . Atqui clarum est, de parua phlegmone uerba fieri : siquidem exigua ulcera, in quibus albis hisce emplastris utimur, magna comitari phlegmone non potest, si error nullus accesserit . Cæterum ulceribus quæ ad cicatricem ueniunt , astringendi qualitatem utilem esse cui obscurum est ? Tempus igitur iam postulat, medicaminum quæ emplastrum album utilissimum constituunt, temperaturam exponere .

#### Pondus emplastri.

Aequa sit portio utriusque metallici , cerussæ & argenti spumæ : & hæc, si uideatur, esto singulorum pondolibra: olei uerò mensura amborum simul pondus abfoluat, uel ut Romani dicūt, sint pondo libræ duæ, ceræ pondo sexlibra, terebinthinæ illius dimidium, hoc est, pondo uncia tres . Quòd si thus admisceas , primum lenius euadet, seu ut Græci dicunt, ἀνωστύωται, tum parua ulcera, quæ phlegmone infestat, ocys concoquet : sed ad cicatricem ducenda erit imbecillius . Nam carnem super crescentem promouet, quoniam thus σαρωτικόν est, ut in tertio libro de morbis curandis legistis . Satius itaque est, miscere & aluminis paululum, tum ad cicatricem ducenda, tum alterius causæ: quandoquidem laxantia medicamenta plethoricis, & uitioso succo obnoxijis corporibus adhibita, affectis partibus fluxū concitant . Ex his  
itaq;

itaq; omnibus cōpositū medicamē, tumores præter natura in molli corpore, qui nec magni adeò, nec dolorifici sunt, discutere poterit: præsertim cū thus abundè assumperit. Erit itaq; in prædictis copiosum thus, si æquale terebinthinae pōdus accipiat: sin eius dimidiū, minorē digerēdi vim medicamētū habebit. Magis autē cicatrici ducēdæ erit idoneū, q̄ quod duplo copiosius id receperit. Iam si plenius adhuc digerere cupiatis, etiā piperis albi pauxillū adijcitote, quod ulcerū cicatrici obducēdæ nihil obesse potest. Sit igitur aluminis pōdo uncia, in piperis semūcia: Ratio siquē est, huius tres denarios, illius sex iniicere. Quoniā uerò præstat alumē, et aliās quod scissile nominatur, & colore cādidū est, id immittere expedit.

Quomodo candida emplastra componenda

sint aduersus vlcera, cacoëthe, & quæ cicatricē difficulter admittunt.

**Q**Uæ dysepulota, id est, uix ad cicatricē uenientia, quæ item κακοῦθη, id est, maligna uocē, distinguendum modò est: quia non solū in præsentē disputationem, sed etiā in futurā commodū est. Quæ itaq; ex humorum cōfluxu, uel multorum, uel acriū oriuntur, sine eo quòd locus affectus huiusmodi iam dispositionem habuerit, ut licet bonum sit quod insluat, tamen ipsum corrūpat, dysepulota nomino. Porrò quæ iam dictū obtinent affectū, singulari uocabulo cacoëthe appello. Nunc igitur cum priores me emplastra quædā alba, ut quæ dysepulotis cicatricē probè obducāt, cōscripserint, propterea ego quæ alba scribo emplastra, quæ aduersus dysepulota omnia, & cacoëthe nōnulla, quæ nō prauū admodum ha-

bent statum, composui : Nam in illis denuò medicamenta accommoda dicentur . Primum hic methodum dicturus sum, qua id genus emplastra quàmplurima conficere discetis . Duplex enim scopus est : alter omnium quæ ratione componuntur medicamentorum communis : alter peculiaris colore ab his differens . Quæ igitur in commentario de simplicibus medicamentis cognouistis, sine rosione quidem ac morsu, ualidè tamen adeò exiccantia, hæc in ueniam reducite. Omnino autem referebat ea, præterquam quòd non erodunt uel astringunt, manifestò etiam detergere posse. Siquidem causa plurima eius generis ulcera tanquam ab exesione humorum malignorum facta apparent : eiusq; rei gratia carne impleri desiderant . Ostendimus in tertio Therapeutices libro, omnia quæ carnem generant medicamenta detergendi facultatem habere : Multa etiam alia siccam obtinent uirtutem, huiusmodi ulceribus curandis accommodam . Sed age nunc repetamus ea, quæ candorem tueri possunt, aut non adeò ledere . Hoc ex genere est cadmea, pompholyx, calx, ostrea cōcremata, purpura, buccina, & sepie pars ossea : parum officiet colori & æris squama, & uste chalcitidis non fuluum, sed cinereum, uel subalbidum. Quomodo autem huiusmodi præparandum sit, rursus in theriacæ antidoti sermone dicemus . Porro dictorum quodq; si lauetur, totam rosionem amittet : quemadmodum cera quæ medicamini conficiendo admiscbitur, tum resina. Cæterum quòd cera tyrrhenica, uel pontica dicta, ad cādidi emplastri præparationem sit idonea, prius explicatum est : resina uero & laryx, & terebinthina,



uti uocantur, aduersus ulcera maligniora magis ualent. Thuris partem aliquam indere non abs re fuerit, ut ulcerum maleficorum dispositio coquatur, & ad suppurationem ueniat. At non solum ex prædictis medicamentis unumquodque lauandum uenit, sed etiam metallica, tum quammaximè in loco soli exposito, uel aqua, uel aceto, uel marina, uel uino leuigare oportet: pura autem & candida, & perspicua singula erunt, candoris cuiusdam medicamento conciliandi gratia. De cerussa, oleo, coctionis modo, aëre circumfluo, & igne, quomodo quodque eorum albedinè adferat exposuimus. At quam admodum in alijs, ita in his quoq; facultatis aquæ, aceti, marinæ, uiniq; albißimi peritum id in compositura temperare conuenit, quod insigniter curando morbo profuturum est. Etenim in ulceribus prætumidis, ἐχθρῶν appellat, quæ oras crassas, callosas, multamq; attenuatorem requirerentes habent, ex aceto & marina curiosè leuigata, magis quàm quæ per aquam idonea sunt. In quibus autem acris & mordax est humidum, quod in ulcera fertur, ex aqua terere potius singula metallica necesse est. Quemadmodum rursus ex uino magis, ubi copiosus humor ulceribus influens apparet. Hæc igitur singula quæ dixi, in unoquoq; iam nominato humore leuigata diebus pluribus, inieci frequenter pharmacis, & omnium cicatricem ducentiū, quæ cerussa & argenti spuma constant, expertus sum optima. Verum scriptiones quasdam amicis quoq; dedimus, qui huiusmodi pharmaca desiderarent: à quibus ipsis in usum ac experientiam producta, quod titulo promittunt tueri videntur. Itaq; argenti

*Spuma cum cerussa prius cocta, & medicamento serè ad puram consistentiã perueniente, iniicienda est larix, uel terebinthina resina cum cera candida. His pulchre unitis adde metallica, quæ huiusmodi temperaturam habent. Argenti spumæ & cerussæ pro cõsuetudine singulorum pondo: coquatur cum olei libris duabus, frequenter etiam aquæ selibra addita. Liquefcit enim argenti spuma citius, tum coctio aquam consumit, ut nihil ad humiditatẽ phar maco apertè prosit: resinæ pondo tres uncia, ceræ duplũ sufficit. Quanquã si duas resinæ indideritis interim, quatuor ceræ, sic quoq; compositiones non adeò differre inuenientur: thuris pondo uncia semis satisfacit post cerã & resinã: deinde tres aliorũ iniectæ, quæ drachmæ quatuor sunt ad uiginti: impones autem duorum, trium, plurium, ac omniũ quæ numeravi: quorum singulorum tibi copia contingat, ut si omnia habeas, æquam portionẽ cuiusq; iniicies, cadmiæ dico & pompholygis, buccinorũ cineris, uel ostreorum, & æris squamæ, singulorum denarij septẽ erunt, qui tres uncias absoluunt. Quod si calcem lotam misceas, singulorum drachmæ quinque ponentur. Si usta chalcitidis, singulorũ drachmæ quatuor, ut ex omnibus sex cõunitis tres uncia fiant. Verum chalcitis usta sit, elota, & colore cinereo, non qualem multi ex ijs, qui urũt eam, faciũt: ueluti si dicas ex pallido flauã: si duo quædã ex his habeas solum, tres uncias ex ambobus ponito: hoc est utriusq; unã semissẽ. Hæc in præsentia ad alborũ emplastrorũ constitutionẽ ulceribus dyssepulotis curãdis cognoscere uobis sufficit. Atqui cerata alba et li*

*πῆγμα.* quida, *πῆγμα* uocãt, etiã ex ijs ipsis præparatur: diffē-  
runt

runt tamen ab emplastris, quòd neq; argenti spuma, nec cerussa coquatur. Adeps uerò uel anserinus, uel gallinaceus, uel suillus, uel uitulinus indatur. Quòd si unum interm habeas, uel acetum, quæ albißima, lucidißimaq; sint, aqua loco ipsa admiscebis.

# E secundo libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

KATA GENH.

#### De colorum in Emplastris uarietate.



EDICAMENTA colore similia tradere non est artificum.

Quoniam uerò potentes quidam uiri interdum nos iubēt emplastrum sibi melinum cōficere; quod ulcera glutinet, uel cicatricem ducat, uel indurata emolliat, uel aliud huiusmodi facere possit, coacti sunt nonnulli recentiorum medicorum, ubi similia colore seriatim conscriberent, proprias cuiq; appellationes appouere.

De medicis imperitis, & vlcus eorum curandi ratione.

Quòd si affectus cuiuslibet eorum, quos curandos suscipiunt, naturam scirent, methodumq; cognoscerent,

scerent, qua & simplicium singulorum medicaminū uires, & scopum curationis inuenirent, non utique compositionis modum desiderarent. Exempli gratia: statum cauum ulcus, apertum (nihil enim mali est, ut quidam uocant breuioris disciplinæ gratia, sic nos quoque non uolare) quomodo quis sanare queat consideremus: tanquam si nondum aliquod ei curando aptum medicamen inuentum sit. Nam quum docuerimus, à ratione cauorum ulcerum curationem subministrari, nascente alia carne loco perditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta est, cogitauimus fieri non posse hoc, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas insit. Verum sordes medicamina detergentia auferunt, humorem exiccantia discutunt. Quoniam ulcera carne implenda pharmaco exiccante, & detergente medicriter sine morsu, indigere demonstrauimus, conuenit eiusmodi pharmacorum materiam quænam sit in memoriam reducere. Indicata est in libro de simplicium medicamentorum facultatibus, insuper conueniens singulorum ordo: Hoc etenim, sicut dixi, admodum utile est, ut si quando fortiore quis pharmaco opus habeat, ad quod digrediaturn cognoscat. Verum cum simplex nullum habemus, composito utimur. Atque primum fingamus nos habere ceram & æruginem, aliud nihil quod cauo ulceri manifestè conducat: thus dico, irim, aristolochiam, sariam eruorum, radicem panacis, & quæcunque ex hoc sunt genere. Quum igitur sciamus, quòd cera sola imposita sordidum ulcus efficiat, quia neque detergere, neque exicare possit, ærugo rosionem infret: præterea exedet, atque phlegmonem excitabit: quæ sanè utraque deuota

deuiabimus: medium ex ambobus aliquot conficiemus, imbecillius quidem ærugine, ualentius autem cera. Sed quoniā hæc paululo inferior est eo quod commodè queat adijci, ærugo autem multum præcellit, multæ cære modicam æruginem adnuscibimus. Quantam autem quantæ? Hoc enim deinceps uenit dicendum, exactè quantitatem cuiusq; ante experientiam inuenire posse neminem: conijcere tamen & iudicare, & componere pharmacum, primum adeò nullum insigniter improsperrum successum habiturum: quemadmodum ego aliquando feci in quodā uico, ubi neque ipse quod me sequeretur habebam, neque alius ex ijs qui ibidem agebant, copiam mihi facere poterat. Reperi solum ad compositionē idoneam ærugine & ceram: quibus acceptis, & ad ignem cera liquefacta cum oleo rhodino, ut liquidum ceratum fieret, nuscui cerati libræ unciam unam æruginis, hoc est duodecimam partem: statui enim decimam uel duodecimam temperare: suspicatus quidem maiorem, ut acriorem cera futuram, minorem tanquam imbecilliozem. Experiuntibus autem nobis compositionem, uisæ sunt partes decima & duodecima rectè pro corporum differentia commutæ. Ostendimus enim, quod etiam usus attestatur, ualida corpora ualidiora sustinere medicamina, imbecilliora huiusmodi non ferre. Validiora dico corpora, quæ temperamento sicciora sunt, ueluti agricolarum, nautarum, & uenatorum: imbecilliora, mollicia, uel natura, uel uictus consuetudine, cuiusmodi sunt mulierum, cupuorum, puerorum, & qui naturali temperamento sunt humidi, candido molliq; corpore præditi. Dura igitur ex co-

piofio

piofiore ærugine cerato admixta carnem recipiunt, mollia ex pauciore. Vnde, ut frequenter dictū est, unū pharmacum omnibus nequaquam conuenire potest, sed oportet medium esse, ceu ad median temperaturam aptatum: ducere uerò ad utranq; eius medijs partem, dum quotidiana usu, & experientia probatur: si ut res postulat confectum sit, in eo manere cōsiliū est: si paulum deficiat, augere ipsius uires: quemadmodum etiam adimere, cum præter modum efficax sit, uelut in ipso hoc proposito pharmaco, quod cerato & ærugine constat, considerare prius oportet, ulcusne carne obductum sit, an nondum, sed sordibus humoreq; madeat, uel præter quòd carne impletum non est, erosione sensus aliquis laboranti ortus sit, & calidior, uel rubicunda magis pars ulcerata appauerit. Quòd si igitur imbecillius uideatur, melle uel ærugine admixtis potentiam eius augebis: si ualidius, oleum uel rhodinon miscebis, resoluens pharmacū, quod linamentis excipiendum est. Commode quidem ceratum & ærugo sic temperantur, quemadmodum à me nonnumquam esse mixta retuli. Confectura autem medicantibus hæc esto emplastri compositi (uiride à colore uocant) sanantis quidem recentia uulnera, quæcunq; non adeò magna sunt, sed quod ex rhodino simul ad mediocris pharmaci consistentiam potest liquefieri. Quin & resine uel colophonie, & pbryllæ nominatæ, uel terebinthinæ nonnihil ipsum habere oportebit. Ostendimus autem lacricem uocatam terebinthinæ quodammodo esse similem. Porro quantitas earum mixtura & hic coniecturari potest: si enim plus resinæ quàm ex usu sit admisceamus, donec

donec manibus subigitur molle apparet: in linteolum uero illitum paulò post instar pellis indurascit, facile à corpore decidens: Sin minus æquali portione resinæ cum cera mixtum sit, non habebit hoc quod glutinet, ἡρόκωδον Græcis appellatur, ut pars ulcerata magis extendatur. Liquet autem, si alicui particulæ imposueris, difficulter fore conglutinans, & protinus ab ipsa relabi. Quæ igitur mediocris temperatura, ceu emplastri consistentiæ conueniens? Siquidem mihi fidem adhibes, par utriusque portio: nec cera, nec resina siccitatē uetustatemq; repræsentet. Optimum siquidem huiusmodi mixtionis temperamentum est, si ambo pinguis & mollia assumantur: si alterum excedat, resinam præpollere satius est: quare nōnulli duplam huius mensuram stactæ ceræ admiscunt.

Confectura simplicis emplastri viridis,  
& virtutis ipsius explicatio.

**V**iride nonnulli, sic enim ipsi nominant, ex dupla resinæ portione confecerunt: duas quidem eiusdem libras, unam uero ceræ, & binos olei cyathos immiscētes. Aeruginis autem alij duas, alij tres uncias huiusmodi ceræ & resinæ mixtionī immittunt. Sed etiam in præparatione liquefactis, quæ liquari possunt æruginem inspergunt. Quidam ubi refrigerauerint, mox raserint, in mortario temperaturam molliuntur. Porro qui medicamentū cruentorum ulcerum glutinantius facere statuūt, æruginem in pila prius cum aceto leuigatā inijciunt, ceratū radentes. Proinde si quis uestrūm roget, quale horū uiridium emplastrorū sit præstantissimū, succurrat id quod  
iden

identidem à me prædicatur, omnia esse optima ei, qui a se factus quibus singula offeruntur cognoscat : sicut eos ignorantia omnia pessima. Mei etenim officij est dicere, id exiccare euidentius, quod acetum pariter assumit. Constat autem, quod plus æruginis continet, id tum validum esse, tum magis exiccans, tum sordida ulcera rectius purgare. Finis ipsius est, ut hæc citra erosionem ac morsum efficiat. Nam adeo ualens, ut iam puris ulceribus impositum erosionem pariat, nec ea tandem carne repleat, sed utroq; modo humida sordidaq; reddat, simile est ijs quæ parum integrè siccant detergentq;. Iam uero ex acrioribus cauum magis ulcus euadit, & rubicundius calidiusq; est, quum æger etiam ipse morsum eius percipit.

#### Resinarum differentia.

**R**esina strobilina resinarum longe calidissima est: sicut terebinthina ambabus qualitatibus omnium moderatissima. Omnes siquidem calefaciunt & exiccant: sed hæ magis, illæ minus. Validissima igitur est strobilina, moderatissima, ut dixi, terebinthina. Quinetiam siccatur celerrime strobilina, & quæ priuatim pitynon phesema dicitur : resina quidem & genere ipsa siccans, & calefaciens : siccando autem à strobilina non superatur: calefaciendo plurimum. Hæ ergo exiccata pinguis expertes sunt, ideoq; emplastra bene adherentia conficere non habent, ut viscosæ & liquidæ. Inter pitynon phesema, id est, piceam & strobilinam inedia calore abietina est : liquida tamen diutius perdurat : sicut etiã colophonia thuris redolens, quæ nonnullis sola uocatur colophonia,



nia, odoratu suauitatem quandam referens, calore sicut abietina mediocri prædita, nascitur admodum modica, atque ob id preciosa est. Humidissima tamen omnium est altera laricis appellata differentia: nam hæc quoque duplex est: una quidem similis terebinthinæ: altera hæc acrior, calidior, magis liquida, & odoratu grauior, tum gustu amarior. Conditur hæc liquida resina uasis fictilibus, piceam resinam continentibus, consistentia & colore terebinthinæ adamussim similis: odore & gustu diuersa: ingrator quidē olfactu, sicut etiam acrior & gustu mordacior. Quare satis est, terebinthinam omnibus medicamentis, quæ ulcera rectè curabunt, admiscere: quoniā primus præcipuusq; in eis scopus est, ut id quod offertur non mordeat.

De frictione metallorum cum  
aceto ad solem.

**M**Eminisse uos puto & huius quod toties repeto: fortium medicamentorum, cuiusmodi est ærugo, nisy, chalcitis, fori, æris squama, uel chalcanthum, ex aceto diu contritorum, morsus, seu erosionem obtundi, uires augeri. Quoniam uerò metallica ceu crassiorum natura partium potestatem suam in altum usque corporis, quod curatur, non extendunt, ideo ut tenuiora fiant conterere, & ex aceto ipsa dissoluere conuenit, quæ curiosè ita attenuata ad penitiora usque penetrant. Accedit autē & aliud quoddam cōmodum in huiusmodi medicamentorum confecturis, quod diligenter elaborata corporis meatus nusquam inter eundū retenta pertranscunt, eiusq; gratia si calidioris naturæ sint, sine morsu munere suo

funguntur. Quin & inter humores ipsos in corpore generatos, tenues facile citra erosionem perspirant: crassiores retenti obstructiq; molestant, ubi mordaces fuerint. Eadem ratio est in metallicis medicamentis combustis, sed illa ex ignis commercio nonnihil mordax, seu erodens perservant, quod elota deponunt, ac lenia prorsus redduntur. Quibus autem sinule quippiam ustioni ex frictione cum aceto ad solem facta ignis loco accidit, ea ne quidem ex igne calorem consequuntur: laevigata tamen ex aceto & combusta multo præstantiora fiunt. Hæc sanè multorum medicamentorum communia necessario cognoscenda sunt: tum usus ipsorum simuliter: alius quidem in alijs affectibus: in cauis uerò ulceribus quum linamentis excepta imponuntur.

#### Olei differentia.

Olei sanè nomen unum est, qualitas & facultas diversa: Nam omphacium frigidius, ex maturis oleis pressum calidius est: temporis autem processu calefaciendi uim auget: sic etiam quod salem habet, quantum ex illo sumpserit, tanto calidius est, magisq; siccatur, quàm quod ipsius expers est. Quod surculos olea, βάκκινος Græci nominant, continet, ualentius astringit. Indicabit autem uilius & ulceris forma, & corporis aegri natura: ulceris quidem sanandi contrarijs, corporis autem ulcerati similibus. Quapropter medicamentum, quod emmoton futurum est, myrteo liquefacies: quum generata caro flaccidior quàm par est appareat, præsertim ulcere ad cicatricem perueniente propemodum. Nam cum pauxillum quiddam phlegmones in ambientibus particulis relinq

relinquitur, optimum est pharmacum ex rosaceo liquore. Rosaceum uerò præstantissimum esse nouisti, quod solis rosas pluribus oleo citra salem præparato plenius imbutis confectum est.

De usu viridium emplastrorum.

**Q**uatenus medicamentum exiccet detergatq; cum ex simplicium facultate, quæ id constituunt, inuenimus, inde simul dispositionis naturam cui conueniet indipiscemur. Vbi enim humiditas multa & copiosa sordes est, desiccans euidenter purgansq; medicamentum applicare oportet. Vbi apertum (Græci ἀπῆριστον uocant) ulcus est, carnis indigum, moderatissimum inter exiccantia detergentiaq; competit. Verum minoris maiorisq; in eo rationem ab ægri natura sumere conducit: Siquidem durioribus uel ex temperamento naturali, uel ætate, uel loco, uel studiis corporibus magis exiccantia exhibenda sunt, humidioribus minus. Quapropter primus cuiusque medicaminis linteolis excepti (ἑλκυστὴν appellatur) usus ex prædictis nuper scopis coniecturali artificio sumitur: secundus, ut etiam antea monuimus, ex signis in corpore citando apparentibus. Si namque cauum ulcus citra phlegmonem & purum inueniatur, nihil nouum tentare oportet, si humidius, uel sordidius intendere desiccans detergensq; pharmacum ratio postulat, si cauum magis quam prius existit soluere. Intenditur itaque melis temperatura: mitigatur ex oleo & cerato, uel oleoso quodam, cuiusmodi est rosaceum, myrteum & cyprinum, simpliciter præparata sine spissamentis, σίμματα Græci uocant, quæ addunt odoris gratia, uel ut confecta diu-

tius ab iniurijs immunia permaneant. Iam uerò si contentiosus quisspiam nos increpet, tanquam præter institutum initio ad medicamentorum usus orationem deducamus, polliciti nos de eorum compositione uerba facturos, ille considerato, quòd in usu etiam confectura quedam sit, silentium sibi imponat. Prima enim pharmacorum, quæ cerato miscentur, in eo confectio est: altera rosaceo, uel myrteo, uel cyprino, uel lentiscimo oleo, uel melle appposito constat. Atque de his satis.

De viridium emplastrorum commixtione,  
eorumque quibus constant  
proportione.

**V**ERUM ad emplastra, quæ iam per experientiam abundè probata sunt transeamus. Hæc igitur Andromachus memoratu digna medicamenta usurpare ipsa scientibus præscripsit. Vnde cum talia sint, ea deligenda ueniunt, quæ paucioribus, paratuq; facillimis simplicibus componuntur, tum quæ ad plura ualent, & proposito maxime scopo seruiunt. Res fiet exemplo ita dilucidior. Finge cauum ulcus apertum in sano corpore: tale uerò ab emplastro uiridi, quod Lite uocatur, liquefacto ex rosaceo curabitur. Appellant autem Liten, quod ex æruginè, cera, & resina cõficitur. Ego sanè, ut ostendi, æquam utriusque portionem musceo, æruginis decimam uel duodecimam, uel octauam. Est uidelicet duodecima, si ceræ pondo, & resinæ tantundè, æruginis uncias duas temperemus: decima, si duabus æruginis uncijis, uiginti ambarũ resinæ & ceræ, hoc est, utriusq; decem adijcian-  
tur.

tur. Quinetiam si octavam æruginis partem cerato ex cera & resina confecto apponamus, etiam sic bene habebit. Acrius enim magisq; detergens huiusmodi medicamentum erit, non tamen inutile: nam duris corporibus percommode adhibebitur. Melior euadet compositio, ubi octavam portionem æruginis confecturæ ex cera resinaq; immiscuerimus, æruginem pariter aceto quamacerissimo diebus plusculis antè in leuorem redacta. Præstantior erit, si etiam thuris partem dimidio maiorem, quam fuit in æruginem, indiderimus. Olei pares cyathos æruginis uncias adiunges, cū sine aceto & thure medicamentū cōficias. Quando autem thus acetumq; adijcis, si quidē frigida resina pinguior molliorq; sit, ac æstate pharmacum præparas, miscebis nihil: si uerò dura, idq; per hyemē, cyathum unum infundes. Quod si liquidam quandam resinam ceræ temperes, oleo prorsus carere licet: liquidissimæ quidem tertiæ ceræ portionem, minus liquidæ dimidiam. Porro fiet huiusmodi quædam compositio: Ceram resinaq; liquidā ubi refrigeraueris, æruginis partem nunc octauæ, nunc decimæ, aliàs duodecimæ commisce to: cognoscens duris corporibus primam temperaturam conuenire, mollibus tertiam, medijs mediam. Aeruginem ex aceto leuigabis: si lenius medicamentū uoles efficere, thuris pondus dimidium eius quod continet adiunges: sin hoc mutius, thus & æruginem æquali modo committes. Atqui resinam cum cera liquefactam sine rasura refrigerantes, ærugini thuriq; in pila ex aceto tritis superfundimus. Hæ igitur primæ compositiones sunt uiridis emplastri, quod cruenta quædam uulnera non adeò magna

glutinat, & reliqua ad usque cicatricem sanare potest, & carnem in eis producere, ex humido quodam oleoso liquatum. Voco autem oleosa, rosaceum, quo maxime ad illum quem retuli modum confectio utendum est: statim myrteo, cyprino, & lentiscino. Sed ipsum oleum, ubi medicamento liquefcenti caloris quippiam adijcere cordi est, commune hoc miscebis, in quibus refrigerare studes, id quod omotribes appellatur: ubi astringere, myrteum: ubi mixtæ facultatis aliquod, concoquens puta & repellens, rosaceum: in quibus modicam astringendi vim cum maiore caliditate desideras, cyprinum & lentiscinum. Porro pleraque alie compositiones erunt, dum medicamentis simplicibus iam commemoratis uel incarnatiua, uel emollientia, uel astringentia, uel quæ difficilia ulcera curant, temperantur. Nonnulli uerò digerentia miscuerunt, sicut etiam cicatricem ducentia: alijs quidem omnia commiscuentibus, uel confecturam inutilem, uel medicamentum uarijs accommodum præparare contigit: quorum materias cognoscentes, tum inuentis iam uti, tum similia componere ipsi potueritis.

#### Quomodo viridia fiant.

**A**Erugo non modica immittitur, ut & aliorum colorem uincat, & omnia in suum permutet. Porro conijcere oportet eum qui tale emplastrum confecerit, præter æruginis quantitatem, & colorem illorum quæ ipsi commiscuntur, ad hæc coctionis rationem, in simplicibus quidem colores pertinaces obseruare: cuiusmodi flaua & nigra, & rufa medicamenta occupant. Dico autem flaua & rufa, qualia sunt melittites, chalcis combusta,

sta, auripigmentum, sandaraca. Nigra uerò, quod genus sunt pix, bitumen, terra ampelitis, lapis gagates. At inter coquendum non oportet æruginem super ignem coeuntibus committere: uerum ubi in mortario unitas facta est admiscere, si colore uiride medicamentum permanere desideras: sin autem melinum uoles emplastrum conficere, intelligito in coctione æruginem primum in hunc colorem perducendam, postea in rufum, ut emplastrum, quod bicolor, Græcè διχρῶμος appellât, euadat. Etenim à coctionis tempore paucis diebus post, in summo quidē fuscū magis redditur, in imo rufum simul apparet. Quoniam uerò de ipsorum colore abunde satis diximus, rursus ad facultatis sermonem reuertemur, memores unde primum hoc in libro exordiū sumpserimus. Eginus autem in eo, nisi me fallat memoria, de medicamentis carnem generantibus: quorum potestatis scopus est, ut mediocriter & sine morsu detergāt exiccentq;. At speciales confecturæ pro diuersa simplicium pharmacorū materie differunt. Cæterum nemo ignorat, ea quæ propriè & primariò sequuntur nominantur, aperta ulcera carne implere, hoc est, quæ caua quidē sunt, non tamen sordes, aut inflammationem coniunctam habent: insuper nec prauorum humorum influxionem, neq; carnem in cauo ulcere intemperatam. Nam prædictorum aliquo cavitati imposito prius illud curandum est. Consilia curationis ipsorum sunt, sordidis detergentia pharmaca adhibere, profluentibus exiccantia, atque id quod influit repellentia. At si copiosum & contumax existat, fluoris causa prius amputanda est. Constat autē inflāmatus phlegmonē

sanandam esse, carnem intemperatam ad temperiem redu-  
cendam. Porro intemperatæ iam factæ, quatuor sanè mo-  
dis simplicibus, quatuor item compositis, per contrarias  
qualitates succurreretur. Sed de his postea: nunc autem de  
medicamentis uehementer detergentibus agemus.

### De pharmacis valde abstergentibus.

**Q**UOD hæc ex prædictorū genere sunt, quæ ob mo-  
deratam deterfionem cauis ulceribus puris, aper-  
tis sine omni morfu adinoueantur, antea comprehendi-  
mus. Iutensam uerò detergendi uirtutem obtinent, quæ  
copiosas sordes auferunt. Quare nonnulla ex prædictis  
uiridibus medicamentis una re solū, nempe æruginis co-  
pia, ab ijs quæ simpliciter carnem producunt, euariant.  
Quædam et aliorum insigniter detergentium mixtura,  
sicuti uocatum Isis, et Machæronis emplastrum, quod  
nos pro more usurpamus: oleosum ex usu nuncupant.  
Vbi enim sinū implere proponimus, copiosiore oleo iam  
liquefaciētes, per cornu rectum modo clysteris porcine  
uesicæ cōiuncti ipsum infundimus. Quin et piuleis, hoc  
est, pus trabentibus, in eo utimur. Etenim inter clyste-  
res etiam, quibus latius foramen est, ad huiusmodi admi-  
nistationem commodi sunt. Cui uerò non est perspi-  
cuum, sinus oppletos sordibus, ex ineraciore hoc medica-  
mento purgari, id est, oleo pauciore adhibito? rursus pu-  
riores effici ex humēte magis olei uberioris tēperaturæ  
Itaq; si parua adhuc phlegmones sinū infestatis suspicio  
quedā existat, medicamētū ex rosaceo prorsus lique fiat:  
Sin à phlegmone fuerit liber, ex oleo: et si citra erosionē  
ueteris



ueteris misturam sustinuerit, illo pharmacum liquatur. Ceterum in huiusmodi usum non solum hoc, sed Machæ-  
 rionis quoque emplastrum et Isis, tum alia faciunt, quæ  
 maiores nostri perscribere, cerato mixta, cauis ulceri-  
 bus carnem inducere. Omnia namque huius notæ sine ce-  
 rati mistura ex oleo et rosaceo liquefacta sinibus immi-  
 tuntur, eò quod consistentia, quæ linamento excipitur,  
 enimotum uocant, sinibus illini non potest. Pari modo et  
 medicamentum siccum, quod combusta charta constat,  
 rosaceo copiosiore diluentes, ipsis infundimus. Quenad-  
 modum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent,  
 dum crassiora imponi nequeunt, ita quæ in summo caua  
 ulcera affligunt crassius medicamentum desiderant, hac  
 uidelicet occasione, quod liquida statim ab eis decidunt,  
 et linamenta sicca relinquuntur. Merito igitur in id ge-  
 nus utriusque ceratum ualide abstergentibus admiscemus: in  
 sinibus oleum, uel rosacei plurimum. Atqui hæc in eum-  
 dem modum abstergentia pharmaca omnino etiam digerunt,  
 ideoque uehementer exiccant, ac commune quoddam ipso-  
 rum genus efficitur, quod Græci *μαλὸν ξηρόν* appellant.  
 Accedunt huic generi emplastra euidenter acria, qualia  
 sunt *Αι ἀλὼν*, quæ non offerenda sunt, ubi carnem quan-  
 tiam progignere cogitamus. Nam præter alia hoc quo-  
 que sal eximium habet, ut astringat magis quam purget:  
 siccare uerò nihilominus quam nitrum, ac eius spuma po-  
 test. Sed illa astringendi facultatem non agnoscunt, sicut  
 nec Asiæ petrae flos. Atque huius rei gratia discutere,  
 et ceratis admixta ulcerum sordes tollere nata sunt: Sal  
 propter astringendi potestatem hoc efficere non potest.

Proinde cum hæc in memoria habeatis, & methodum compositionis, ususq; omnium eiusmodi medicamentorum audiueritis, deinceps illa, quæ à clarissimis medicis propter optimorum medicaminum cognitionem usu atque experientis cōperta sunt, enumerabo. Primum sanè Mantiae, atque eius discipuli Taranthini Heraclidis sectatorum permulta pharmaca, quæ subsequētib; annis per experientiam probantes distinxerunt, & præstantissima ipsorum denuò literis mandarunt: quæ uerò manus efficiaciae habere uidebantur omiserunt. Iure igitur & ego maiorem facio mentionem eorum qui illis successerunt. Sunt autem inter hos, qui in medicaminum experientia reatissimè se gessisse uidentur, Petronius Musa, Heras, Andromachus, Asclepiades, & Criton. Iam uerò Archigenis & Philippi studiosi non pauca medicamenta prodidere. Quinetià liber unus est Menecratis, cui nomē inditum est, *Insignium pharmacorum αὐταρχάτωρ ὁλογράφημα*, id est quasi dicas, Imperator (nam ei dicatus est) integris literis descriptis. Quæ ergo pulcherrima ipsis tradita sunt medicamina, & cōmendantur, quorumq; nos inter omnia relata experientiā habemus, & quibus præceptores nostri usi sunt: ad hæc, si quod nobis inuentum sit, deinceps adducā, quo singula genere cōtineantur exponens. Nunc autē uiridibus relatis melina protinus subiungam.

#### Melina emplastra.

**Q**Uenadmodum uiridium emplastrorum plurima propter aruginem præpollentem talia fiunt, præsertim quæ sunt ex ipsis coloratiora, ita quoque melina. Sed uiridia aruginem incoctam habent, melina uerò coctam,

Etiam, sed mediocriter : Nam si largius coquas, ambigui coloris emplastra quibusdam appellata, quibusdā rufa, efficies. Solent medici uiridia simpliciter melina, & rufa nominare, quæ non adeò magna uulnera glutinant, & ulceribus cicatricem obducunt : quæ mos est medicis appellare ἀνδισατα, quasi dicas aperta. Item ex rosaceo liquefacta canis carnem gignunt. Multiplicis usus sunt inter ea, quæ plura pollicentur. Quædam multa non promittunt, sed unum mentione dignum, uidelicet uel ulcera cancoëthe bene curare, uel pus digerere, uel meliceridas, uel duritias emollire, uel huiusmodi quid non continentium, aut curatu facile. Andromachus itaque quatuordecim melina conscripsit: ex quorum numero quinque æruginem habent, reliqua sine hac confecta sunt. Porro ex his quæ æruginem constant, unum quidem primum inter quatuordecim positum est : alterum uero quartum, post hoc aliud sextum, inde septimum & decimum. Quibus ergo nihil eximij apposuit, omnia simul & conglutinant ulcera, & cicatricem inducunt. Quod si ex rosaceo liquefeceris, carnem procreat. Quin & mediocribus phlegmonis medetur, sicut etiā duritias emolliunt : atque hoc euidentius, quæ gutta ammoniaci continet. His adhuc magis, quæ copiosior rem quæ pro reliquorum portione æstimetur, eā assuperunt: in quibusdā uero apposuit ipse tenerum, hoc est, teneræ cuti cōueniens: cui præfixit ἰσχυρὰς, & ἰσχυρὰς, inuenit membrorum doloribus synanchæ & lateri benefacere, uel interiores abscessus discutere magis quoddam testimonium his adferens, quàm simplici sermone scriptis. Igitur omnia ipsa deinceps subyciam:

Melina diuerfa promittunt.

Argenti

Argenti spumam, ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram, postquam deposueris cacabum, galbanum, æruginem, & reliqua addito, atque molliter incoquito. Huiusmodi coquendi modos melinorum emplastrorum me priores tradidere, iuxta quorum similitudinem etiam alia melina coquere potueritis.

In Melino Serapionis, Argenti spumam sanè primum iniicere conuenit, mox resinas & ammoniacum, deinde galbanum & æruginem, postea si uel thus, uel myrrhâ, uel aloë capiât: hæc immittenda sunt, cum medicamentum ab igne tollitur: quippe coctionem non ferentia. Prædiximus autem, lentè coquenda esse, præsertim cum ærugo indita fuerit: quin & ipsam nuscendam, dum cacabum in terram deponis, ac modicè refrigerabis, idque magis, si uas paruum sit in quo coquitur: Nam effervescenti immissa ærugo, frequenter ex ipso uase diffundi medicamentum cogit. Porro in Menoeti primo melino, ~~mixturæ~~ uocat, ideo quòd pugiles eo utantur, ammoniacum ex aceto leue in mortario fieri posse, alijs omnibus in cacabo mixtis, deinde ipso affuso, prius instituti sumus.

In Melinis emplastris dixi neque æruginem crudam esse oportere, ut in uiridibus, neque nimis coctam, sicut in his quæ incerti coloris & rufa nominantur. Verùm ubi iam cacabus ab igne austrendus propemodum est, iniici ærugo debet. Deinde cum mutet colorem, & melinum redditur, medicamentum tollere iam ab igne tempus est, quatenus purum iam euaserit. Sin minus, paululum super ignem lentum remorati sic tollemus. Nam in  
nebe=

æbementi admodum flamma facile in rufum de generat.

De rufis emplastris quæ *σικεσμα*, id est, incerti coloris dicuntur.

**Q**Uædam ex eadem materia prodeunt quæ melina, sicut prius quoque diximus, hoc solo discrimine, quod diutius coquantur: Omnia siquidem propter crudam æruginem uiridia fiunt melina, ubi mediocriter ipsa cocta fuerit: rufa, ubi liberalius. Manifestum igitur, melina rufa; oleum copiosius quàm uiridia necessario habere: etsi reliqua omnia eadem recipiant. Atque huius gratia primum spuma argenti cacabo iniicienda est, in quo tantisper coquetur, dum sordium crassitudinem consequatur: mox ærugo. deinde si metallicum aliquod, ceu æs combustum, eiusq; squama immittatur: ac quando spissitudinem acceperint, tunc ceram & resinam (si hæc etiam medicamentum recipiat) indere conueniet: postremo thus, myrrham, aloën, aliaq; id genus. sicut celeberrimum rufum, quod *ῥιζή* *ἰντάμων* uocatur, sacrum & ipsum appellatum: uelut Isis, quoniam aiunt ea ex sacris Aegypti locis adferri: polychreston igitur hoc est, quod interpreteris licet, usus multiplicis, eoq; in sequenti sermone inter ea quæ sic nominantur adnumerabitur. Impræsentiarum de alijs rufis omnino simplicibus, quæ inter hæc & polychresta consistunt, uerba facturi sumus. Vt igitur uiridia emplastra ex cera, resina, oleo, & æruginе conficiebantur, iuxta dictam illic temperaturâ, sic rufa ex argenti spuma, & oleo copiosiore quàm in uiridibus sumpto componuntur. Itaq; si emplastrum

*ῥιζή ἰντάμων*  
Ili.

largius uoles coquere, augeasq; oleū, medicamen habitu-  
rus es quod magis siccet, ideoq; uulnerū cruentorū gluti-  
nātius: sin autē mediocriter, tantū olei mēsuram, quantū  
argēti spumæ pōdus esse sufficit: libram enim olei mensu-  
ralē Romanorū in argēti spumæ librā ponderalē inijcie-  
mus. Iā si pharmacū plenius incoquere placet, nō unā li-  
bram s, sed etiam duas et plures temperabimus. Porro  
inter hæc rufa emplastra sic præparata, plus siccant quæ  
nec resinam, nec ceram omnino habent, sed ex solis, ut  
uocāt, metallicis conficiuntur: quemadmodum alij quo-  
que nonnulli ex prioribus huiusmodi scripserunt.

#### Rufum Galeni.

Cæterū quo ego semper mea industria cōposito utor  
in hunc modū coquitur: Argēti spumæ cū oleo prius co-  
ctæ metallica ex aceto leuigata immitto, et sic coquo, do-  
nec purū fiat. Adde huius olei libras quatuor. hoc aut quan-  
to uetustius, tātō erit melius: magisq; si id fuerit Sabinū.  
argenteæ spumæ libras tres, acetī quāmacerrimi libras  
duas. Horū triū metallicorū, squamæ æris nigri, ærugi-  
nis, chalcitidis uncias duas, hoc est, denariū pōdo sede-  
cim. At quum uetus oleū existit, crassumq; ex uetustate,  
quatuor libras s immittito. nos quinq; interim, idq; per  
hyemē indidimus, non ignari, hyeme plus olei quā per  
æstatē immiscendū. At argenti spumā prius uidelicet co-  
ques, donec sordiū crassitudinē recipiat. Quod si oleū ci-  
cinū habeas, id pro uetere usurpato, certe medicamentū  
hoc cructa uulnera facit glutinat, magisq; in duris cor-  
poribus q mollibus, cuiusmodi sunt mulierum et euna-  
chorū, dilutū potius ex oleo cicino quā ueteri. Itē quū

Linteo

Inteo exceptum imponitur, mirū est quā ulcerā curatu difficillima cōcoquat, quæ pus nequaquā reddūt. Ad hæc sinus cōglutinat, & fistulas implet, exiccat, & prorsus claudit. Vbi iam ipsum hæc pulchrè uelis efficere, metallica pluribus diebus aceto lōgè acerrimo conterito, ac potius in sole: pari modo argenti spumā tritam exiccas tanq̃; & oleo postea mixtā, eo quo dixi modo incoquito. Attamen ad ulcera, quibus cicatrix difficulter induci potest, metallica sic elaborari, & argēti spumā cōterere nō est necessum. Etenim sine his *ἰπποκράτους τερεν*, quasi dicas, cicatrici ducēdæ prōptius illud euadit. Adijciatur autē tunc ei diphrygis & chrysocolle singulorū uncia. at hæc nō simul cū squama & erugine cōmuntantur, uti nec ubi iā cōstū medicamentū fuerit omnino, sed eo quod intercedit tēpore. Tantā enim huiusmodi pharmaca cōstio nē requirūt, ut exactè cum prioribus in unū coeāt: quod mediocri intervallo accidit, neq; multo antè, nec paulō minus q̃ cacabus ab igne tollatur. Solum itaq; hoc emplastrū fistulas, sinus, & magna uulnera glutinare potest. Iuuat ipsum spōgia recēs, nō dura, ueteri uino respersa. Deligatura in sinib. ab imo fiat, ligamēto ad orificiū perueniente, sicut in sermone de fistulis clari⁹ ostendetur.

De iis quæ cicatricem obducunt.

**E**Mplāstra cicatricē inducentia, siue synulotica, siue epulotica nominare uelis, sicut etiā alia medicamēta epipasta, & quæ linamentorum usu apponuntur, nihil ad curationes eorū dīsserētīæ adfēret, si qualis quodq; facultatis medicamētū esse debet meminēris: quam simul cū reliquis omnibus in Therap. lib. explicauimus. Quanto  
enim

enim glutinantia sarcoticis siccare magis dicta sunt, tanto glutinantibus epulotica. Nam ipsorum beneficio carnem cauis ulceribus generatam, cutem reddere statui-  
mus: ob quod tale pharmacorum genus, siue ὀξυγόρυ, siue ὀξυαίη sit, astringere oportet. Hic autem illorum duntaxat emplastrorum mentionem facere cogitamus: siquidem ea quæ linamentis excepta imponuntur phar-  
maca, ex his rosaceo uel myrteo liquatis fiunt. Atque myrteum rosaceo hoc magis conducit, quo uehementius astringit: at si neutrum habeas, ex cyprino, lentiscino, & melino liquanda sunt: si his quoque careas, ex om-  
phacino, uel eo quod ab Hispania portatur, αραύη Græci nominant: ubi nec huius copia adsit, teneros oliuarum surculos contusos, alij cuiuspiam uulgari oleo admiscebis: quod si hos etiam desideres, præstat oleo uetere lique-  
scere: hinc enim medicamentum siccandi uirtute auge-  
bis. Proinde plerique medicorum à pharmacis, quæ opti-  
mi quique auctores longi temporis experientia satis pro-  
barunt, eo quod; nobilia reddiderunt, hac ratione solum ab-  
stinere, ut ipsi melius quippiam præter maiores habere uiderentur. Attamen ex medicamentis celebribus cogno-  
scenda sunt quæ commendantur omnibus, nempe quod ὀξυ γαστρίκον, & ὀξυ γαστρίκον inscribitur, ad cicatricem du-  
cendam utrinque præstantissimum. Quanquam apud omnes mixturæ simplicium temperaturam eandem non sit inuenire.

De catagmaticis & cephalicis emplastris.

**Q**ui plurima ac optima pharmaca prodiderunt (antea omnes nominatim citauimus) genus aliquod em-  
plastro



plastrorum cephalicum & catagmaticum uocant, à caluariae fracturae potissimum nomen eis imponentes. Sunt autem talia astringendi, digerendi, & siccandi potestate prædita. Plerique paululum ex astringentibus pharmanis eis adnascuerunt, idq; duplicis usus gratia, sicut diximus: nempe ut id quod affectis partibus influit repelleretur, & abstergentium facultas in altum usque penetret: docuimus nos antea, nisi astringentia frictione in puluerem redigantur, noxam magis quam præsidium allatura ijs, qui trahendi uim occupant. At optimè elaborari ostendimus, si ex aceto acri læuia fiant.

De emplastris quæ propriè Cephalica nominantur.

**C**apitis fracturarum, quæ ad laminam usque peruenere, emplastra cephalica dici consuerunt. Eorum uirtus est, ut ossium squamas regenerent, nutrimenta in caluaria, & alijs corporis ossibus reducant. Nonnulli communi genere hæc etiam uocant catagmatica, quibus propriè nuncupatis fortiora sunt. Siquidem catagmatica ab eis dicta, purgandi siccandiq; facultatē habent: hæc autem acrimoniam quandam sortita sunt, ut ex alto in superficiem extinuant non ossa modò, sed his inulto magis humorem crassum aliquem & uiscosum, uel omnino deprauatum extrahāt. Meminit huiusmodi emplastrorum Asclepiades in tertio libro de exteriorum medicamentis, quæ sanè in quarto huius operis libro tractauimus. Quoniam uerò ad cacoëthe ulcera, & chironia quedam ipsorum conuenire dixit, tum quod ad Deleontem auctorem

refert cephalicum, tum ex nigro uiride cephalicum, tum Philoti cephalicum, tum Isin, quod & ipsum simul cephalicum appellat, aliaq; nonnulla huiusmodi, quæ huc pertinere putandum, ideo nunc quoque ipsa non apposui, sed ad catagmatica & cephalica ab alijs medicis memorie mandata transgrediar, ubi generalem utriusque potentiam exposuerim. Quæ uero & antea in hoc libro protulimus, tum in opere de simplicium medicamentorum facultate in memoriam reducentes cognoscere uos expedit, cephalica nempe catagmaticis esse nobiliora, eoq; cum cerato carnem producere. Quapropter & sarcoticis alio quodam modo similia sunt. Nam ubi ex cerato uim remiserint, sarcotica fiunt, quæ linamentis excipiuntur: adiecto uidelicet interim oleo, aliàs rosaceo, nonnunquam alio quodam huiusmodi.

#### De emplastris glutinantibus.

**Q**uidam hæc *ἑλυστὰ* & *ῥεσπυματῖκὰ* nuncupāt. Opus eorum est, coniungere, & diuisas partes conglutinare, ut in pristinam unitatem particula reducatur. Verum non modò cruenta protinus glutinantur, ubi sanguinem ex diuisione profluentem adhuc spongia deterferimus, deinde suturis, aut fibulis coarctauerimus, sed etiam suus ueteres, cum ab omni inflammatione immunes, & puros medicamenti appositis effecerimus, cōmattuntur, coëuntq; dictum est in Therapeutices libris, medicamentum primariò, atque ex sese, serdis deterforium appellari: altero significato sarcoticon, id est carnem produciens & glutinans. Non enim tanquam ipsum sarcoticon, aut uiuens, neque tanquam hæc naturæ solius opera non sint, sed

sed quòd talibus impositis medicamentis ulcera carne re=  
plentur ac coeunt, appellationem hanc sortita sunt. Opus  
ipsorum proprium est, affectam partem recrementis uae=  
cuare, ne uidelicet sanies carnis generationem, glutinatio=  
nemq; impediat. Indicatum est, glutinatoria sarcoticis  
esse sicciora: item sarcotica detergendi uim omnis rosio=  
nis seu morsus expertem referre. Glutinantibus autem  
non absterforijs prorsus, uerum desiccantibus solum es=  
se licet. At cum cicatricem ducentia pharmaca multò his  
(præter quàm quòd abundè astringunt) sicciora sint, sta=  
tuamus demum & quæ glutinant, & quæ coniungunt,  
moderatiùs istis exiccare. Finis autem glutinantium est,  
nullam inter coitura subnascentem humiditatem permuta=  
tere: epuloticorum uerò non hanc tantum impedire, sed  
etiam nunc consistentem in ijs quæ mox cicatricem du=  
cent, consumere: ad hæc callo obducere, & astringen=  
do indurare. Sarcotica sanguinem ad refectionem ido=  
neum, tum pro quantitate, tum pro qualitate tuentur: ac  
tantum talemq; quanto natura & quali ad carnis gene=  
rationem indiget. Cæterum lenissimum medicamen pu=  
rum ulcus seruat, siquidem tale acceperit: sordidum uerò  
necesse est illud tantum pro sua ipsius potestate deterge=  
re, quantum crassitudinis sordes habuerit: quin etiam car=  
nem recens iunctam mordere & exedere debet. Vnde  
palàm colligitur id, cum tale existat ulceri carnem non  
esse inducturum, nec cauitatem repleturum, sed quòd po=  
tius ipsa colliquabit, imminuetq;. Atque huius rei causa  
medicamentum quod sordibus copiosis repurgandis est,  
quo de antea dixi, non semper carnẽ potest gignere, nisi

uel ex uberiore oleo, uel rosaceo liquatum, sicut quod  
 ἰλαωὶς ὅς ἐστι χαῖται inscribitur, deterfionis uebe-  
 mentiam remittat, uel ex cerati mīstura rofionem depo-  
 nat. Huiusmodi multa multiplicis usus uires ostendunt,  
 quemadmodum Machæionis emplastrum, tum Isis. Sco-  
 pus igitur singulorum id genus in Therapeuticæ libris  
 declaratus est: simplex facultatum materia in alio opere  
 priori composita, in præsentī tractatur. At primum in  
 eo memunisse oportet naturæ corporum, quæ curanda su-  
 sceperis. Nam humida, coq; mollia, quemadmodum mu-  
 lierum, puerorum, eunuchorum, & qui muliebriter de-  
 gunt, imbecillioribus medicamentis indigent: uirorum  
 corpora, potissimum qui ex uirilibus munijs & sole du-  
 rum corporis habitum conciliarunt, ab imbecillibus ni-  
 hil præsidij sentiunt. Quapropter nec glutinantia utri-  
 usque sexus corporum communia sunt, sed quæ ex ar-  
 genti spuma, oleo, & aceto præparantur (in priore li-  
 bro de ipsis egimus) imbecillam mollemq; carnem gluti-  
 nant. Quæ bitumine, ærugine, squama, aloë, & myrrha  
 constant, robustam & duram. Itaque bitumen ipsum per  
 se in harum uirtutum scopo continetur: at nulla ratione  
 solum ex oleo liquatum usurpare poteris, ut quod fria-  
 bilius sit, quàm medicamento emplastrodi faciendo con-  
 ueniat. Vt igitur emplastrum fiat, ceram & resinam ei  
 admiscemus, à quibus denuò uirtutē eius solutam iri sciē-  
 tes, interdum æs, uel eius squamam, sæpe aloën, uel myr-  
 rham, uel in summa siccans aliquod medicamentum non  
 inepte adiicimus.

Nigrum

Nigrum EMPLASTRUM quod inter glutinantia Emplastrum  
 recensetur, hæc recipit: Cerae, picis, bituminis, pityinae, nigrum.  
 singulorum pondo libram, manne pondo uncias sex, ce-  
 russæ pondo uncias quatuor, chalcanthi pondo uncias  
 quatuor, opopanax pondo uncias duas, olei semunciam,  
 alij selibram, aceti heminas duas. Ceram, bitumen, oleum,  
 acetum paululum relinquens in olla recenti liquato: de-  
 inde picem & resinam adijcito: in minima frusta diligen-  
 ter concidito. Vbi semucoctum fuerit, tollito ollam, & a- Coctionis  
 liquandiu refrigerato: inde atramentum sutorium per= modus.  
 colatum, læuigatumq; ex duabus aceti heminis paulatim  
 inspergito, ne effruescat: effusum leuiter subarito mo-  
 uens: cum tactum non inquinat, cacabum deponito: opo-  
 panacem antea in reliqui aceti parte madefactum insun-  
 dito, ut dissoluatur: mox cerussam, mannam unà pariter  
 trita inspergito: & paululum tepesfaciens, ut in unum  
 coëant, observa, ne opopanax & manna adurantur: rea-  
 fusa in mortarium, ibi refrigerari finito: ac rursus sub-  
 acta reponito, atque utitor. Porro manifestum est, etiam  
 alia barbara, quæ tum Andromachus, tum reliqui tra-  
 diderunt, eodem modo confici oportere. Quidam opo-  
 panacem cacabo non iniiciunt, sed læui ex aceto facto li-  
 quata in mortario superfundunt. Cum eo nonnulli mie-  
 scent mannam, & cerussam, quemadmodum ego quoque  
 sæpius feci, in mortario terens ex aceto, & quæ liquari  
 possunt, liquefaciens. Subinde uerò atramentum suto-  
 rium duntaxat cum opopanace læue factum cacabo indi-  
 di, mannam cerussamq; inspergens.

## E tertio libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

## MEDICAMENTORVM

KATA GENH.

*Quis cōmunis uulneratorum neruorum  
curationis modus, & quæ medica-  
menta specialia.*

Præceptorū  
Galenī error  
in neruorum  
curatione.



PECTAVIMVS omnes  
præceptores nostros præsidio,  
quod iam recentiores medici <sup>et voca-</sup>  
<sup>mus</sup> & glutinatorium appellare  
solent, uti. Nam initio medicæ  
mentum aliquod ex enæmis im-  
ponentes, uulneris oras conmut-  
tere seu glutinare moliebantur. Si uerò phlegmone eas  
obsederat, calida aqua liberaliter fovebant, ac tritici  
farinam ex hydrelæo decoctam, cum oleo applicabant.  
Quare etiam gladiatores in patella uulneratos, supraq;  
hanc in lato tenuiq; tendine, pari modo ab ipsis curatos  
uidi: forsā melius dicas non curatos, sed perditos: pau-  
cissimi enim illorum, & ij claudi superuixerunt. Quidē  
quod permultos in manu summa tendones, per quos di-  
giti flectuntur extendunturq;, uel contusos, uel minimo  
puncto lesos, putrescentes adeò conspexi, ut coctis diu-  
tius in aqua similes apparerēt. Non enim secus exoluun-  
tur

tur & substantia emollescunt superiorem sanandi modum experti, ut quo uulneratam partem ueluti putrescere perceperim. Quoniam uerò omnia ex humiditate & calore putrescere cognoscebam, curationem per siccantia refrigerantiâq; moliendam esse deprehendi. Rursum apud me contemplatus, frigidum ferè ab Hippocrate neruis inimicum dici, optimum fore neruorum uulneribus medicamentum intellexi, quod & siccaret, & caloris frigorisq; particeps esset, uel parum ab horum medio ad calorem recederet: calidum tamen esse satis posse, modò sic candi potestate polleat. Etenim calor citra humiditatem putrefacere nihil habet. Insuper illud quoque præmeditatus, multum referre, nudæ parti affectæ medicamentum offeras, an per alia corpora ei præposita, conuenire aduerti alijs in nudato neruo uti pharmacis, alijs cum punctus fuerit, partibus, quæ ipsi præiacent, illæsis. Vbi etenim nudo neruo medicamentum adferas, ibi prædictæ auxiliiorum integram indicationem assumi ratio est. Præpositis autem partibus salus, tenuius pharmacum inueniendum est, cuius uirtus interiacentes particulas permeando non dissoluatur, sed in altum penetret. Quod efficere tale pharmacum potest, si ualidè siccet: & si nõ calore & frigiditate medium sit ac symmetron: non offendere, dum efficacia ipsius calefaciendi uel refrigerandi in particulis, quæ neruoso corpori præpositæ sunt penetrandis imbecillior est reddita. Atqui inuenio iam præsidiorum scopo, quàm uidelicet tenuia esse conueniat, deinceps materiæ mentionem facere oportet. Plurima igitur quæ calefaciunt tenuiorum esse partium,

Enumerat tenuiū partiū medicamenta.

permulta rurſus quæ refrigerant craſſiorum, in ſimpli-  
cium medicamentorum ſpeculatione didicimus: quippe  
una ſolum qualitas acris cum tenui ſubſtantia nonnun-  
quam ipsis accidit, eoq; inter omnia, quæ refrigerandi-  
um obtinent, tenuiorum partium acetum eſt quamacer-  
riſimum, quod etiam caloris modici particeps eſſe demon-  
ſtrauimus: calefacientium uerò liquores probi tenuiſſi-  
mam habent ſubſtantiam: & apud omnes iam homines  
Cyrenæus primas tenere cognoscitur, quo non præſente  
etiam medico utimur: & ijs quæ cum ipsis ab orientali-  
bus plagis afferuntur: cuiusmodi eſt, quod Sagapenum  
appellamus. Hoc genere comprehenditur & liquor eu-  
phorby iuxta occiduas orbis regiones natus, ſiue liquo-  
rem ipſum, ſiue aliud quid nonnare uelis, nobis in præ-  
ſenti commentario euphorbium hoc medicamentum uo-  
care ſufficit, quemadmodū iam omnes conſuerūt. Quin-  
imò in noſtra regione proueniētes, & panacis, & tithy  
malorum liquores ſubtili facultate præditi ſunt, & qui-  
dem omnes nominati liquores generoſi calefaciunt, opo-  
balsami uerò ſubtilis, & ipſe non admodum calefacit.  
Atque ex terreſtribus nitri ſpuma tenuem ſubſtantiam  
habet, item quod ex aqua facile ſoluitur aphronitrum, ſi  
ad corpora terreſtria uidelicet relationem fieri inaudia-  
mus. Subſequitur nitrum nomine beroniceum, & aſia pe-  
tra, cuius flos etiam omniū terreſtrium eſt ſubtiliſſimus.  
Porro ex metallis auripigmentum, & ſulphur, tum ſub-  
tilia, tum calida ſunt: quibus ſuccedit niſy, æris ſquama,  
& chalcitis, paululum ſimul aſtringentia. Quare uſta  
quoque chalcitide frequēter in ſubtiliorum medicamen-  
torum



torum compositionibus utimur. Citra calorem uerò manifestum tenuis essentiae metallica sunt, spodium, & pōpholyx: adde quod uocatur psoricum: subtilis abūde est & chrysocola. Cæterum inter succos laurinum simul cum eo quod calefaciendi uirtute ualida pollet, quæ sensibus percipi queat, tenuem esse didicimus. Nihil enim minus eo cedrinus excalfacit, calore tamē qui sensibus subijcitur, propter substantiæ tenuitatem, illi cedit. Huius generis est lixiuia, quæ stacte dicitur: atque hanc ipsam, quæ ex materia subtili uita fit, cedrinum oleum uirtute superat. Ex malo igitur & ficu, eaq; magis agresti, quā <sup>ἰπριόρ</sup> Græci uocant, item ex tithymalis combustis, huiusmodi lixiuiam conficimus. Præstantissimus est ex tithymalis, qui χαράκας nuncupatur. Cæterum ex seminibus frumētarijs, <sup>σίτηρα</sup> nomināt, subtilissimus est er uis sine insigni calefaciendi potestate: lolium uerò cum insigni: hordeum nequaquam calfacit. Mediam interea materiam obtinent, qualitatibus amara, quæ multum tenuibus substantia cedūt, crassi licet nihil habētia. Nonnulla ipsorum à medijs tantillum declinarunt: alia ad calorem, alia ad frigiditatem: quarum omnium materias in opere de simplicibus medicamentis executus sum: quemadmodum etiam omnium fructuum (Græcis <sup>ἀγροδύρα</sup> dicuntur) in quorum numero sunt amygdalæ amaræ, & pistacia: at stirpium materiæ in præsentia non memini: redire enim ad principium cogito, atque exponere, quando, quoq; modo singula per rationem nobis inuenta usurpauerimus. Hinc enim puto bonæ indolis iuuenes incitatum iri, ut medicamentorum materiam cognoscant,

ipsinet inspiciētes, non semel aut bis, sed frequēter: quoniam sensibilibum rerum cognitio sedula inspectione confirmatur: cuius rei indicium est euidentissimum, quod didymi per omnia similes esse nobis uisi sint, differentes autem ijs, qui ipsos inspicere consueuerant. Itaq; herbarum, fruticum, & arborum materiam priusquam ē terra eximantur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uidelicet futuri sunt, dum aduutur, dum augescunt, & dum uigent. Hæc siquidem cōtinua speculatio docebit te, quando potissimum ipsos commodè decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias, ne à solis radijs exurantur, neq; ab humiditate ex tecto uel muris madesiant: id optime fiet, si domus neque subterraneæ sint, neque alijs uicinæ, neque sub tegulis, sed ostia ad meridiem spectantia habeant, prope quæ tamen medicamenta reponi non debent. Amici hic quoque uos admoneo, ut me sequamini, si artis opera pulchrè obire uolueritis: nouistis enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis medicamenta mihi adferantur, eò quod perditī illi omnigenarum rerum cōemptores uarijs modis ea contaminant. Præstiterat forsā non hos solum, sed multò magis etiam mercatores, qui illa aduehūnt, incusare, atque his multò magis ipsos herbarios: item nihil minus eos, qui radicū liquores, succos, fructus, flores, & germīna extra anni tempus in urbes conferunt: hi siquidē omnium primi in eis dolum exercēt. Quisquis igitur auxiliorum undique copiam habere uolet, omnis stirpiū materiæ, animalium, metallorum, tum aliorum terrestrium corporum quæ ad medicinæ usum ducimus, expertus esto, ut

ex eis

ex eis & exacta, & notha cognoscat: deinde in cōmentario meo, quem de simplicium medicamentorum uirtute prodidimus, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis præsidia ueniat, uerbotenus quidem medendi modum sciet, opus uerò nullū ipsa dignum perficiet. Finge nanque ipsa, quæ de neruorum uulneribus prædixi, quædā te cognoscere: adulterata uerò medicamēta per ignorantiam compositioni iniicere, uel neque omnino exacte facultates ipsorum intelligere, an nō erit necessarium, frequentius hic te errare, quā recte agere? Mihi quidem admodum uidetur. Iam uerò ad plenum uirtutes cognoscere ab eo multum differt, quod est cognoscere. Etenim solum cognoscere scire est, an medicamentum siccare, uel humectare, uel refrigerare, uel calefacere nos possit: accuratè uerò cognoscere, præter hoc etiam uirtutis quantitatem sciuisse est. Quædam enim pharmaca calorem tepidum generant, corporibus nostris admota: quædā moderatum, quemadmodum alia hoc paulò ualidiorem, nonnulla iam sic feruentem, ut urere possint. Conuenit igitur, medicum non modò affectus qualitatem, sed etiam ipsius quantitatem, ut ita dicam, coniecturare: nam haud ita propriè quantitas in qualitate dicitur, quanquam dicatur tamen, ut febris magna & parua: ac tantus usus est eorum quæ sic dicuntur, ut iam proprii uim obtineant ipsa, perinde ac pyxis, æs, pictor, quercus incisor: in totum, quæ ex grammaticorum, ut aiunt, abusu inceperunt: deinde uerò propria dici credita sunt. Hæc quidē attulimus propter eos, qui parum opportuno tēpore de  
ser

sermonis proprietate arguantur. Quod autem dicere desij tale est, nempe quod exiccari desiderat, non simpliciter siccante indiget medicamento, sed conuenienti mensura. Copiosa quidem humiditate auctum, insigniter exiccante: parua, modicè hoc faciente, quemadmodum multa, admodū resiccante: non tamen extremè, neq; in summo: siccitatis enim quantitātē humiditatis copiae respondere conuenit. Ego itaque dum communem neruorum uulnerum curationis modū immutare primū ausus sum, conieci in quantam humiditatem caloremq; affecta pars recidisset. Et cum adulescens quidam mihi ostendisset in primo articulo: medij dextræ manus digiti, totum in ea circa neruum locum humentem adeo ex contusione habentis, ut iam computresceret, partem sanè putridam lixivia stacta & cataplasmate ex hordei farina (ῥαυὴν λευκὴν Græci nomenclant) foui: non putrescentem, sed tensam dolentemq; oleo calente liberaliter perfudi: inde quam lana sicca madorem exhausissem, ceratum tam humidum illeni, quàm in fracturis utimur, cui euphorbium sit admistum. Confectum autem mihi est hoc quoq; mea industria, huiusmodi occasione: Profectus ad me quispian hyeme uehementi, ostendensq; genu facile dicebat rigore se affici: statim uerò calefacientibus iuuari. Volebam igitur huiusmodi aliquod medicamentum acciperet, ut qui profectus in frigore inalgeret doleretq; uehementius quàm aliàs. Nunc igitur, inquit, loturus discedo: mitte à balneo medicamentum: hæc cum dixisset, abiit. At ego cum tale nullum medicamen ad manus haberem, euphorbium cum oleo triui, & ceram liquatam immiscui:

paulò

paulo post cum amicus pharmaco ferendo puerum misisset, exhibui. Doloꝛe protinus cessante, inde in alijs particulis similiter affectus uti præcepimus, de quibus mox dicitur: nunc ad nerui uulnerati sermonem redeo, propter eos, qui nihil à me nunc dictum intelligunt: increpant autem interpretes, quos deprehendūt (ut uaticinor) perperam nominare <sup>νευροτρότους</sup> in tendonibus uulneratos. Tendones enim ipsos puto uocari, qui extra manum toti uolæ, & digitis circumtensi sunt. Quanquam sanè non ignorem, manifestius magisque proprie <sup>\*τις</sup> <sup>\*νευροτρότους</sup> ipsos nominari: tamen cum omnes neurotrotos nuncupare soleant, & ego, ne quis innouare me appellationem dicat, consuetam pro uera suscepi, etsi nec illa sine ratione fieri potuerit, plerisque medicis tendones etiam neruos uocitantibus. Verum siue neurotrotos, siue tenontotrotos appellasse mauis, neque ob has uoces incolumes erunt, neque conuulsione laborabunt, quemadmodum neque mancipient, nec morientur. Appellatio siquidem nec seruauit hominem unquam, nec perdidit, sed medicamentorum facultas utrumque efficit. Atq; ego hæc immutans, putrescentes, conuulsos, mancos, nonnullos etiam pereuntes, sanos uiuosq; reddo: neruos enim contusos habentes sicut illum neurotrotos, non neurothlastos nuncuparunt. Cæterum curatio communis est, & periculum sinule amborum, nempe contusorum & uulneratorum, uel neruis, uel tendinibus. Itaque homo ille putredine iam circa primum medijs digiti articulum orta, tensus doloꝛemq; ex superiacentibus concipiens, multo melius habere cœpit die postero, quo uice hordei fac  
rine

rinæ erucorum farinam lactæ lixiuæ commiscuimus. Unde triduo similiter curatus est : iam quidem in alijs quæque particulis dolorem omnino non percepit, ex contusione uerò neruosum quoddam corpus crassæ membranæ persimile inclinauit : quod mediocriter me commouente facile totum semiputridum excidit. Videbatur omnibus contemplantibus hoc corpus neruus totus esse putris, ut qui ignorarent, quo pacto tendones hi neruosis membranis conuelati, per uolam procedunt, & in totam seriem digitorum extenduntur. Mihi uerò putridum ex contusione attollenti tendo saluus apparuit. Cum igitur uel pastillo uno, uel trochisco, uel utcumq; uocasse libet, quorū in numero est & polyidæ, ex epsemate soluto, uel syræo, id est sapa (nam & hoc pro arbitrio nominare liceat) apparentē nerui particulam prius inunxissem, rursum eodē modo & cataplasmate, & unctiōe ex euphorbio in iisdem locis sicut prius utroque usus sum. Quarto iam die omnia commissā circa contusum quidem antea, ulceratum uerò tunc primum digiti articulum intuitus, considerabam quorsum à cataplasmate transgrederer. Visum igitur est, si neruus inflammatione prorsus uidearet, ad cicatricem ducētia transire : si uerò phlegmone ipsius scirrhusus tumor remanserit, abundē siccantia exhibere. Quoniam uerò nōnihil ex ea reliquum esse uidebatur, medicamentum ex dracunculi radice confectum usurpauī, quod præter alia, eadem cum Aegyptio phar-maco Iside continet : assumpsit autem dracunculi radicem. Ab hoc Athena dicta usus : inde ad ea, quæ cicatricem ducunt, perrexi. Ex altero pastillo sapa diluto na-

*data uulneris partes illinens, euphorbium extrinsecus imponebam, tantum ceræ ac resinæ temperans, unde emplastri crassitudo simul fieret, & euphorbij uires conseruarentur. Cæterum quomodo his scopis consideratis medicamentum componas, postea declarabimus. Etenim aliud ex aceto pharmacum confecimus, hoc spectantes, uti ipsius spissitudo, & subtilis aceti uirtus, cum refrigerandi uis interim exoluatur, incolumis permaneat. De his sanè quomodo præparata sint, post paulum tractabitur. Nunc quia neruis uulneratis medendi modum ex rationali indicatione, nugatoria illa Empiricorum peripetosi repudiata, inueni, totam cogito ipsam dicere, sed ita, ut nullam distinctionem præteream, sermonem ab initio rursus repetens. Quando igitur uulneratam aliquem protinus offendero, interim per liquida pharmaca curationem molior, interim emplastris, lanan extrinsecus quàm molliissimam oleo calente imbutam applicans. Quòd si medicamentum ex aceto usurpem, aceti modicum oleo admiscēs, bis tæue quotidie soluo, & oleo calente foueo. Si noctes longæ fuerint, etiã in his \* soluere \* λαύειν. consueui, idq; magis dum ulcus à medicamentis eroditur. Nam ubi initio tali medicamento utenti æger nec se morderi, nec dolere, nec tēsiōē percipere mihi dicat, die soluo, & foueo, mane semel, & uesperis iterum: oleū uerò, quo fouemus, satis calēs esto, uerū ita ne uulneratā partem offēdat. Sicut enim frigida huiusmodi affectib. maxime est contraria, sic tepens non omnino utilis. Quoniã in primo de Simplicib. Medic. uolumine didicimus, ut aqua calens aut frigida maxime cōtraria facere nata est,*

ita

ita quoque oleum. Nam frigidū corpori admotum, per-  
 spiratum ipsius obstruit, imò prohibet: calidum uerò di-  
 gerit, ac extenuat: quod tibi etiam ex carnibus in eo co-  
 ctis licet condiscere: similiter enim pridie decoctis, fria-  
 biles efficit: etsi protinus cum animans mactatum est, co-  
 quas, aut in sartagine frigas: propter quod & ego so-  
 mentum ex oleo calente satis usurpare malui, tepidū sem-  
 per uitans: hoc autem magis frigidum. Porro aquæ us-  
 sum in tota curatione ita tempero, ut ne attingat quidem  
 ulcus: proinde cum sanguis initio statim à uulnerata par-  
 te detergendus est, ex oleo id facere expedit. Vbi iam  
 ægri mediocriter habentes, lauacro utuntur, neque tunc  
 affectum locum in aquam demergere ipsis cōcedendum:  
 magna siquidē ex parte nerui in manibus uulnerati sunt.  
 Memini cuiusdam ex huiusmodi uulneratis, qui cum diē  
 quartum citra omnem dolorem ageret, partemq; affectā  
 absque phlegmone uideret, multo in frigore domo egres-  
 sus ad opus quoddam necessarium, eiq; diu immoratus  
 domum redyt, membro uniuerso ad ceruicem usque ten-  
 so, idq; cum ingenti ipsius dolore. Postquam uerò quo-  
 dam me accersente, profectus ad eum, uidi quibus in ma-  
 lis esset: oleum ex itinere refrigeratum à particula au-  
 ferri iussi: calente uerò totum membrum foui, deinde cer-  
 uicis partem rectam lanis oleo respersis, & medicamen-  
 to liquido ex euphorbio, simul cum castoreo hominem  
 statim mitigavi: & somno accedente usque ad uesperam  
 omnia cessarunt symptomata. Plurimum igitur confert,  
 lanam permanere calidam, siue oleo tātum, siue oxaleo,  
 hoc est aceto & oleo quoque imbuta fuerit: fiet hoc, si  
 aliæ



aliæ lanæ siccae extrinsecus circumponantur, & æger in  
tra tectum, modò hyems fuerit, ad quintum usque uel se=  
ptimum morbi diem sese contineat: nam si eousque nec  
phlegmone quadam tentetur, uacetq; prorsus dolore, &  
nullam sentiat tensionem, in posterum tutus erit. Curabis  
autem ne in aceto uinosum aliquid appareat: quemadmo=  
dum oleum quoque, ut omni astrictione uacet. Neque igi=  
tur crudum, quod ὀμωτρίσις, uel ὀμωαίσις duplici nomi=  
ne Græcè dicitur, adhibebis: neque id quod ab Hispa=  
nia uehitur, imò nec aliud quodlibet ex his quæ oleæ sur=  
culos habent. Optimum oleum est tenuissimum, quale in De oleo.  
Italia Sabinum: alibi uerò in nationibus Romano impe=  
rio subiectis, quæ nullam obstringendi uim occupant.  
Iam uerò qualis res sit rationalis indicatio, & quanto po=  
tior nuda experientia citra methodum hinc condisces.  
Cum permultis neruorum uulneribus sæpe in itinere, in  
nauigio, in agro, uel in ciuitate, sed procul à meis ædi=  
bus incidissem, nec medicamēti ex euphorbio copia ad=  
esset, nec illius quod ex aceto cōficitur, nec alterius, phar=  
maca, quorum eo loco facultas erat, uulneri imponentes,  
id quò tendimus semper sumus affecuti. Noui etenim me  
in agro propolim recentem, liquidā & pinguem, quam  
agricola habebat, uulneri imposuisse: interim fermentum  
solum, interim ambo commixta. At fermentum quā uue=  
tustissimum esse, propolim uerò secus habere conuenit,  
quantum ad tempus attinet. Sint autem uetustior sit, ex o=  
leo iuxta ignem, uel in sole emolliatur. Rursus in alio  
quodam rustico succum tithymali fermento mixtum im=  
posui, quem prope ipsius aulam succreuisse conspexi.

ram: quippe fermentum ut recens deprehendi: nonnunquam propolum ex oleo liquefactum fermento immersi, sed prius aceto quamacerrimo dissoluto. Præstat oleum esse uetus in huiusmodi temperaturis, puta ex oxymelite & fabarum farina, uel eruorum, uel lolij, uel ciceris, uel lupinorum amarorum, uel tenuiori polæ puluere, uel hordeacea farina: quibus in urbibus usus sum cataplasmatis, non solum in his, quos iam phlegmone prebenderat, sed etiam protinus ab initio. In agro cum picem liquida apud fabrum inuenissem, fermento temperatam inposui: item apud alium eruorum farinam illo imbuta, cuius penuria etiam prædictorū quoduis misceri potest. Quinetiam oxaleum solum quod caleret lana exceptū, statim dum aliud nihil haberem obtuli, confusus aceto abundè acri & uetusto. In alio refrigerato, quod ante horam unam, uel longius etiam tempus neruus contusus esset, quousque aliud quoddam idoneum medicamen dilutum adferretur, partem oleo foueri præcepimus, interum aceto prius admixto: cum aer per æstatem calidissimus erat, temperatura ex utroque diutissime foui, donec aliud medicamentum asportaretur. Singulis autem prædictis farinis permiscuitur statim sæpe illeni, & mox à principio, & postea cum homo medicamine quodam enameo non probè usus esset. Hæc itaque omnia quomocunque applices, calida qualitatibus offeras. Ego sanè cum nullum domi meæ aliquando medicamentum compositum in promptu haberem, festinabundus dedi cuidam familiari uetus euphorbium, iniunxiq; læue factum ex oleo ueteri, donec humidi cerati spissitudinem haberet,

tendi

tendinis puncturæ in manu admouere. Reuersus igitur, interrogauit uulneratum, multumne caloris in parte affecta sentiret: ille mediocrem aliquem respondit se percipere. Rursus igitur quærebam, an rosionem à medicamento iuxta uulnus sentiret: ille cum se non rodi, sed ueluti pruritum quendam sentire dixisset, pharmacum ad noctem usque adherere permissi. Quoniam uero dum imposita auferrem, calor in affecto loco mediocris mihi apparuit, neque punctus hians, satius uisum est eodem uti medicamento: & cum uulneratus altero die prosperè haberet, item tertio & quarto, ad finem usque idem pharmacum usurpauit: quod contemplatus aliquis in alio uulnerato similiter recenti euphorbio in eundem modum usus est. Quare necessariò calor ægrum multus, & commorsus, & dolor in ulcere subsecutus est, adeò ut homo ad me deductus sit, tanquam hoc præter omnium opinionem accidisset. Ego statim re intellecta, quod impositum erat abieci: fotum autem per oleum ipsi adhibito, medicamentum ex aceto imposui: quod si non in procinctu fuisset, pharmacum ex euphorbio copiosioris ceræ particeps admouissem. Quapropter non oportet, uti paulò antè diximus, probatorum medicaminum facultates ac species ignorare, nec quæ celeriter uirtutem mutant: tum quæ rursus diutino tempore conseruant. Nam ex his, quæ caducum ac statim euanescentem calorem occupant, euphorbium est. Id autem cognoscet, etiam si non manduces colorem contemplatus: quippe non ut ab initio cinerium, uerum suppalidum & subflauum redditur inueterascens. Statim etiam siccum abundè uidetur tunc, & uix inter

*Leuigandum ex oleo recenti protinus imbibito dissolui-*  
*tur. At subito ipsum oleo miscendum non est, sed prius*  
*in mortario sensim terendum, ne dilatescat. Quid uerbis*  
*opus est? quod etiam gustanti tibi recens percipitur ser-*  
*uentissimum, ut linguam adurat, uetus autem modicam*  
*efficere caliditatem? Iam alijs multis pharmacis exilem*  
*adeo potentiam pauculis annis retinere contingit, attamen*  
*euphorbium tapsiam excellit: hæc enim ab anno adino-*  
*dum imbecillis redditur, ut binula prorsus expiret: eu-*  
*phorbium sanè cum principio bonum fuerit, & probe*  
*urat, etiam anno tertio adhuc uim aliquam retinet: inte-*  
*rim anno quarto: quinto autem & sexto iam exoluitur:*  
*deinde procedente tempore in totum elanguescit. Sic ego*  
*dixi, oleo me nonnumquam usum esse uetusto sine cera,*  
*quod annos serè quinq; uel sex natum esset. Vnde usum*  
*ipsius euphorbij mensura comprehendere nemo potest.*  
*Nam recens oleo decuplo cum cera tripla commiscetur,*  
*ueterascens copiosius ei immittendum est: trimum uerò*  
*& quadrimum, uel duplicatum prioris pondus, uel æ-*  
*quale ceræ. Cum igitur pharmacum consistentia simile*  
*acopis dictis unctionibus habere uolueris (quæ spissitu-*  
*do liquidi etiam cerati est) oleum ceræ quadruplum esse*  
*curabis. Vbi uerò emplastri speciem refret, cerà omni-*  
*no æqualem oleo temperare oportet, maxime si sicca fue-*  
*rit, & uetusta: sicut recens & pinguis pauciore oleo in-*  
*diget, ut ceratum emplastrodes efficiat, idq; magis adhuc*  
*per æstatem. Itaque si ceratum emplastrodes facere sta-*  
*tuis, ceræ ex oleo liquefactæ, qua dixi temperatura se-*  
*xtam recentis euphorbij partem admiscebis, ut illius una*  
*sit*

fit drachma, ceræ sex, olei item sex, uel quinq;. Sed quoniam cera glutinans ac uiscosa non est, quemadmodū resina & pix, ideo hanc, uel illam, uel utriusque partem cerato admisceo. Clarum igitur est, dum hæc miscentur, non amplius oleum pari illis portione affundendum. Et enim cera ad liquiditatem multo pingui indiget: resinae quæ quidem aridæ prorsus sunt, modico: liquidæ & siccam quandam substantiam ad emplastri crassitudinem assumere postulant. In cera igitur non magna humiditatis ac siccitatis differentia est: inter resinas, sicut etiam in picis genere contrario modo habet: aridæ præsertim ab humidis permultum differunt. Refinarū differentia. Omnium uero siccissima est, quam nonnulli frictam, alij colophoniam appellant. Huic succedit, quæ ex figulinis impura, nec despumata sumitur: quam si purges, in frictam mutabitur. His ambabus siccior est, quæ dicitur pitynon physema, ac si dicas, picca germinatio. Hanc sanè ceusquallidā, in præsentis emplastri compositionem non esse idoneam ratus, abieci. Vsus autem sum fricta & liquidis. Iam uerò ex his nonnullæ diutius liquidæ permanent, quemadmodum terebinthina: aliæ citò inarescunt, sicut strobilina: media utriusque est abietina. Quinetiam facilius calidior est quidem strobilina, mox uerò abietina, deinde terebinthina: cupressi resinam miscere non ausus sum, ut quæ nonnihil astringeret. Putabit forsā aliquis nobiscū dissentire Dioscoridem Anazarbeum in sermone de resinis hunc in modum scribentē, primo de medica materia commentario: Ex omnibus resinis principatus terebinthinæ datur, post eam lentiscinæ, tum ei quæ de picea raditur,

Et abiete: ultimū locū pinea, strobilinaq; obtinet. In his enim Dioscorides tanquā de infima strobilina, optima uero terebinthina sentire uidetur. Verū ego ex his tribus resinis, strobilina, abietina, terebinthina, principem certē strobilinā calore, secundā abietinā, postreman terebinthinā esse diximus. Quēadmodū igitur, qui inter Italiæ uina austera optimum ponit uinum Italicum: alius ad qualitatem unam sermonem refrens, alius absolutē de tota ipsius substantia pronuncians, uerus deprehenditur: eadem ratione etiam inter resinas optimam tanquam medicamentum in multiplices usus accomodatam, meritō terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Itaque, ut aiebam, licet tibi quamlibet resinam ceræ miscenti simplex ceratum glutinantius efficerere, quod ex oleo et cera duntaxat componimus. Hic uerō experientiæ quoque utilitas est, quæ de coniectura nostra decernat: potes enim, ubi triplicatam ceram terebinthinæ commiseris, intelligere, emplastrine spissitudinem medicamentum acceperit, an ea adhuc siccius, copiosorem insuper resinam desideret. Quapropter ubi hunc in modum experiēti tibi mediocriter habere uideatur, miscebis tunc medicamento, quod conficis, duodecimam partem euphorbij. At si ignores euphorbium exactē sit calidum, an nonnihil ab eo discedat, post confectiōem linteo paululum medicamenti illitum tuæ ipsius tibie uel cubito horis aliquot imposito: postea si modicē calefacere deprehenderis, temperatum esse medicamentum arbitraberis. Quod si uel nullam sensilem calorem edat, uel iusto feruentiōreni, integrum est aut pharmacum

renit

remittere, aut intendere : remittere quidem mustura ce-  
rati, intendere appposito euphorbio. Atqui si propolim  
pinguem habeas, eam omnibus resinis aptiorem fore tibi  
intelligito, ut quæ uaporosam spiritus crassitiem, humo-  
resq; superfluos elicere, ac ex alto foras ductitare soleat.  
Siquidem resinæ cum cera emplastri spissitudinis gratia  
non tanquam curationis consilio assumuntur, propolis  
autem curationis ipsius scopo continetur, atque hac sola,  
ut dixi, recenti, quantum ad humiditatem attinet, usus  
sum in agricola quodam duro corpore : ac mirum est,  
quomodo sola ad usque finem adhibita adiuuerit, adeo ut  
nullius pharmaci præterea uenerit necessitas. Alteri qui  
puncturam nerui profundiorē haberet, tithymali cu-  
iusdam modicum adnascui : mollioribus uerò corpori-  
bus medicamentum tactu durius apparet, nisi olei mustu-  
ra uehementer ipsum mollias. Quin & alia medicamen-  
ta omnia, quæ neruorum uulneribus adhibentur, liquida  
& mollia esse conuenit. Molliciem igitur quoduis o-  
leum conciliare, robur uerò medicamenti uetus oleum  
tueri potest : sicut propolim in agro nonnunquam ac-  
commodauī, tanquam melius pharmacum ijs, quæ tum  
affuerant, eligens : ita fermentum rursus admoui alte-  
rius medicamenti inopia, quoniam hoc quoque in alto fi-  
xa extrahere & discutere sciebam : quanto autem uetu-  
stius, tanto est præstantius. Porro huiusmodi non solum  
facile in agris reperiuntur, sed etiam sulphur uiuum,  
quo nonnunquam & ipso sum usus, temperans cum te-  
trapharmaco. Huic igitur & aphronitrum, & beroni-  
cium litrum, & aphrolitrum non lapidosum, sed uerè

aphrolitrum, quod spumæ consistentiam habeat, adijciens frequenter usurpauī, non modò in agris aliorum penuria, sed etiam præsentibus enumeratis medicamentis hoc nomine, ut animi sensum experientia explorarem, probaremq; : ac uulneratus talis rei solo usu conualuit, fotus uidelicet oleo. Hoc enim commune tibi esto in omnibus medicamentis, quæ hic dicuntur, neruorum uulneribus cōducere. Iam uerò quod à medicis uocatur arsenicum, ab his qui Atticè omnia uolunt proferre arsenicum, adiunxi tetrapharmaco, rationem experientia uolens confirmare: rursus cum id non adesset, sandaracani, uti uocant, sicut calcem restinctam & uiuam, lotam & illotam, minus autē uiuæ, plus restinctæ, & hac plus adhuc lotæ adieci. Cæterum de exacta cuiusque compositionis quantitate paulò post dicemus, ubi hæc simplicia omnia, ususq; ipsorum distinctiones retulerimus. In hoc enim sermone propter Empiricos, qui ex periptosi, id est incidentia, seu casu plurima compositorum medicamentum inuenta esse putant, uisum mihi est commemorare, neruorum uulnera curandi rationem à me citra illam periptosin repertam, inde quòd sanationis ipsorum scopū, & simplicium pharmacorū facultates cognoscere. Etenim ex casu unum aliquod simplex medicamentum inuenitur: rationalis autem methodus plurima simul inuenit, & uarias ipsorum compositiones. Quæ iam ex alto humores educere digerereq; possunt, neruorum uulneribus ex usu sunt. Quandoquidem uerò nonnulla caliditatem immoderatam, uel mordacem uehementer acrimoniam, uel acutiem coniunctas habent, alia ipsis pharmaca adnuesce



admisceri ratio est, quæ prædictos excessus sine uirtutis  
offensa temperare queant. At hoc fieri non potest, nisi  
cuiusque medicamenti non modò qualitatis genus, sed et-  
iam quantitatem in ea cognoscas. Quædam nanque, ut  
ostendimus in commentario de simplicibus medica-  
mentis, in primo calefacientium ordine collocantur, à tempe-  
ratis paululum abscedentia, alia in secundo magis inde  
declinantia, alia tertio, nonnulla quarto, quæ uere iam  
queant. Igitur ex uehementiæ uirtutis cuiusque pharma-  
ci portione mistorum facultas inuenitur, modò simpli-  
cium omnium temperamenta intelligas. Empiricorum  
hæresis sola homogenia propter uniuscuiusque medica-  
menti naturæ ignorantiam temperat: & qui hanc noue-  
runt, sola homogenia miscent, quia excessus quantitatem  
certò non cognoscunt. Quod itaque ipse primum præ-  
parauit medicamentum, ex multis eiusdem generis com-  
positum est, quoniam nondum cuiusque uirtutis quanti-  
tatem exactè pernoscebam. Inieci etenim nonnihil arseni-  
ci, sulphuris, misyos, calcis lotæ & illotæ, & pompho-  
lygis, similiter spodij, item squamæ æris, chalcitidis u-  
stæ, lotæ & illotæ: ad hæc non ustæ. Hæc igitur prius  
in aceto quàm acerrimo diebus multis sole æstiuo læuia  
reddidi. Quæ fundi ex his debebant, cera erat necessa-  
riò, & mellis nonnihil prius expurgati: resinæ prope-  
modum omnes, propolis, pix, & ladanum. Liquida,  
oleum cyprinum, susinum, opobalsanum, amaracinum,  
gleucinum, cedrinum, ricininū & uetustum. Ex singulis  
autem liquoribus, quos non multo antè recensui, paulum  
aliquid: postremo aliàs aliud aufrens experientiæ gra

tia, nihil simpliciora singula, quibus in hunc diem utor, à uirtute pristina abscedere animaduerti: atqui temperaturæ ipsorum mox ponentur. Itaque ex aceto, & liquoribus talia confici, ceræ, resinarum, propolis, & picis nonnihil adiungēs, pari modo ex columbarum stercore & herbis tenuium partium. Minus ergo molesta sunt liquida pharmaca cum alijs, tum neruorum maxime uulneribus, quibus utimur etiam emplastri modo compositis, propter eos qui se lauare uolunt. Lanis enim ablatis, ac tali pharmaco solo adhærente, lauant minus duriter, sed liberius. Prædictum est, neque tunc læsam partem aquis respergendam, si in manu uulnus contigerit, pedem uerò si is læsus sit, non madefieri qui potest: sed tunc à balneo primis quatuor diebus abstinendum est. Quoniam uerò omnium huius tempestatis hominum, & eorum etiam qui ruri degunt fortitudo perijt, qui lauare se quotidie consueuerunt. Equidem qui non adeò delitijs affluunt (sunt hi maxime pauperes) ut plurimum obtemperantes nobis habemus: diuites uerò, & præsertim potentes illos, uel ægrè obtemperantes, uel prorsus immorigeros experimur. Optimum igitur fuerit, nec ipsis mæderi: uerum cum, nescio quo modo, alius ob aliam causam, quidam nostrum inuiti, quidam ultro ipsorum molliciem tolerare coguntur, tale quippiam scilicet consueui: uulneratæ parti pharmacum aliquod emplastrum imponens, extrinsecus iterum multiplices pannos oleo tinctos plures superinijcio: quibus rursus extrinsecus fasciam ex linteis accommodo, quam deinde in ipso balneo, cum æger in solium ingreditur, oleo prius perfundo: &

do : & loto iam omnia imposita aufero , utorq; prædi-  
cto totius curationis genere . At uerò patet omnibus , eum  
qui pulchrè neruorum uulneribus prospecturus est , etiã  
particularum naturæ peritum esse oportere . Nam antea  
comprehensum est , tendines pariter in quos musculi com-  
plures desinunt , non mediocriter condolescere , primum  
quidem conuulsione tentatos , dein putrescentes & ipsos ,  
uicinas simul partes uniuersas inspicere . Nonnulli eorum  
ceu membranæ tenues latiô; sunt , quales in femorum ter-  
minus ad genua spectantibus , tum intra manus , infraq; pe-  
des subteni sunt . Omnes enim qui in manibus pedibusq;  
cernuntur , satis quidem coeuntes cutem contingunt : qui  
uerò in patellam perueniunt , à circumposita cute iuxta  
latus abscedunt .

Confectiones medicamentorum ex metallicis,  
ad neruorum vulnera.

**E**X metallicis medicamentis asringentia uitare consul-  
tū est , præsertim ubi cõpositi pharmaci usus in pun-  
ctura eueniat : quæ uerò de detergendi uim occupant , sicut  
æris squama , ex usu sunt . Cæterum omnia metallica , cum  
crassiorum partium existant ( multū enim terrestris sub-  
stantie in se continent ) artificij nonnihil in præparando  
requirunt , quo tenuiora fiant . Hoc igitur ex aceto fieri  
quamacerrimo cõsideraui , præsertim quòd ex uino non  
austero confectū est : at si ex tali non sit , sed uetus , eo uti-  
tor . Attende tamen diligenter in gustu , ne tibi uel mini-  
mam uini qualitatem referre uideatur : tale quippe ace-  
tum ualidan exedēdi , secandiq; uicina potestatem habet .

Iam

Iam uerò metallica ex acerrimo, & quàm fieri potest uetustissimo, substantiaq; tenuissimè leuigare oportet, quò felicius spissitudo auferatur. Præstiterat id in sole æstiuo perficere. Quædã enim ex metallis ne uel scindi possunt, nec communui, in aceto ad dissolutionem facilia, sicut chalcitis, & misy. Nonnulla & contundi, & concuti, & postea leuigari desiderant, quemadmodum æris squama. Cum igitur primum præparare medicamentum, immiscui ei & arsenicum appellatũ, postea superfluum esse putauì: etenim ex æris squama & misy, & chalcitide medicamen compositum iri abundè satis uidebatur: temperauì autem prima confectiõne etian æruginẽ combustam: nam quæ ignem experia non erat, tanquam iusto mordaciorem suspicatus sum: deinde tamen non uste paucillam simul adieci, quantum aliorum portio ferebat. Pari modo chalcitidem, crudam sanè paucissimam, ustan uerò æqualem misy & æris squamæ indidi. Præstantius autem omnibus compositis fore sperauì, imò etiã usu deprehendi, in quo copiosa æris squama inesset, dein chalcitis combusta, postea misy. Quocumque igitur miscbis pharmana, ad solem, ut domi uerno tempore, multis diebus in puluerem ex aceto quàm acerrimo rediguntur: quanto enim longiore tempore trita fuerint, hoc tenuiorem substantiam consequuntur: ideoq; angustis uulneribus aptiora: sic ut in neruis carne denudatis, admodum tenuia exedentiaq; cauenda sunt: ob quod prædicti pastilli omnibus id genus conueniunt: siquidem nonnullastringentia quoque assumpserunt. Porro celebres ex illis sunt, qui ad Andronem, Polyidam, & Passionem auctores

flores referuntur. Sunt & alij quidam, quartus, & quintus, illis ualentiores, quibus ego subinde utor. Temperaturæ uerò ipsorum perfectæ sermonis processu dicitur, nunc de eorundem usu tantum explicasse sufficiat, quod tritos ipsos aridos, postea rursus siccæ ( id est sapa) adiecto ita terere conuenit, donec sordium spissitudinem recipiat medicamentum, & æqualiter læue fiat. Vocant autem nunc omnes siccæon, ex musto decocto natum: id autem nihil uini habeat, quale nō ex austerarum uuarum, sed quàmmaxime dulcium musto præparatur, neque ex primo fluente, sed postremo. Si igitur tale mustū extiterit, coquendum est, dum ad dimidiam partem mensuræ consumatur: sin minus, ad tertias concoquendum est. Huiusmodi quidem decocto pastillos soluere expedit, ut mellis crassitudine linamentis excepti, neruis denuatis imponantur, maximè temperatiores, qualis Polyidæ est. Atque hoc multò magis, si corpus sit tenerum ac molliusculum, in quo prorsus à pastillorum usu te abstinere tutius est, alijs utētem pharmacis, de quibus iam sermo factus est, iterumq; fiet. Neruo autem cooperto, quia nudus erat, linamentis extrinsecus unum aliquod ex ijs, quæ ad angusta uulnera conueniunt, superdandum est. Sunt huiusmodi quatuor genera, unum quod ex metallicis conficitur, alterum ex liquoribus: inter quæ refertur & illud, quod ex euphorbio constat, tertium ex columbarum stercore, & quartū nute à nobis appellatū, quo etiam ad neruos tenerorum corporum omnino denudatos utimur. Ex his quatuor unum quoddam toti affectæ particulæ circundandum est, ita ut sanas quoque par

partes unâ comprehendat, præsertim superpositas: quas bis die, uel ter, si necessitas incidit, fouere oportet. Quin etiam nocte interim linamentis quidē denudato neruo impositis: cæterum eo quod extrinsecus admotum erat ablato. Porro cum permagna humanorū corporum sit differentia, tum in temperamentis, tum ætatum mutationibus, insuper uitæ studijs, nulla ratione quodque medicamentum omnibus conuenire potest: quamobrem duo in promptu habeto, alterum ualentius ex simulibus genere confectum, alterum mitius, quæ inuicem multa dum usus postulat, per multa inter hæc iuxta mîstura quantitatē constitues. Si namq; parem utriusq; portionem temperaueris, mîstum exacte medium amborum erit: quod si altero plus adijcias, tantum à medio ad illud summum recedet, quanto mîstura superauerit. Esto igitur ualentissimum metallicum ex his constructum: unam partem crudæ chalcitidis habeat, duas misyos similiter crudi, tres æris squamæ: inualidissimum unam itidem misyos & chalcitidis, sed utriusq; combusti, squamæ quatuor. At uerò amborum medium, quo subinde usus sum, tale esto: Misyos, chalcitidis, æruginis, cuiusq; usti partem unam, æris squamæ partes tres: his, sicut prædixi, contritis, ceræ inualentissimo duplum, in altero duæ partes & s miscentur: in medio, quod intra hæc consistit, partes duas & quartam, sicut in primo trium, quod ualentissimum esse dixi, omnes partes numero senæ ex misy, chalcitide, & squama collectæ nascuntur, quibus ergo duodecim ceræ partes adijciuntur. At in medicamēto inualidissimo

Aliàs \* oꝝ si metallicorum sex partes existant, ceræ \* duodecim  
 duodecim . appo

apponas, in mediocri amborum medium. Sunt autem in-  
 ter octodecim & duodecim media quinque & decem.  
 Quod si denarium unum statuas, unâ omnium esse par-  
 tem, tot denarios adijcito quot partes, siue unciam, siue  
 libram: Sic enim apud Romanos consuetudo est nomi-  
 nari, tot uncias uel libras. Porro mēsurā apud ipsos est,  
 qua oleum metiuntur, insecta discretaq; lineis, totam in  
 duodecim partes diuidentibus: atque integra mensura ab  
 eis libra nominatur: duodecima eius portio, uncia. Me-  
 tallica igitur & cera in lance alijs uncys consistunt: o-  
 leum cornu metiuntur. Itaque prædictis pharmacis o-  
 mnibus iuxta ceræ portionem oleum immittatur, supe-  
 retq; in singulis dimidio: ut si cera uncias octo cōpleat,  
 oleum duodecim, hoc est integrā librā pēdeat. Esto au-  
 tem id sabino simile, essentiae tenuioris, munineq; astrin-  
 gens: si uetus sit, præstat. Crudū uerò, & quod ex oleæ  
 furculis confectum est, nequaquā conuenit. Cæterum o-  
 mnibus medicamentis cōmemoratis, ubi metallica ex ace-  
 to pluribus diebus in mortario trita fuerint, thus candi-  
 dissimum & pingue admusceatur: deinde rursus unâ cū  
 metallicis diebus aliquot læugetur, priusquam ceratam  
 eis temperes. Quanta uerò ex omnibus metallicis copia  
 colligitur, huius partē dimidiam thus cōtineat: si mollius  
 medicamentum facere potestulus, amplius quā dimidiā:  
 sicut ubi acrius expetis, minus dimidio adiūgas. At uerò  
 ceræ cum oleo liquatæ resinam quandam musceas licet,  
 sciens acrius ipsum adiecta strobilina fieri: mollius tere-  
 binthina, mediū utriusq; abietina. Ex harū genere larix  
 quoq; est, prædictis planē humidior: substātia uerò simi-  
 lis li

lis liquidæ piceæ, quam loco terebinthinæ institores uendunt ignorantibus eas discernere : est autem talis odore, gustu, & facultate quàm terebinthina acrior : cum hac igitur & terebinthina larix persimilem potentiam obtinet, sed tenuiori substantia, maioreq; discutiendi uirtute prædita est. Miscebis igitur ceræ sextam superiorũ resinarum partem uolens medicamentum emplastri figuram induere. Nam uni ceræ pondo resinæ uncias duas adijcies : sin autem liquida insigniter fuerit, uel unam tantum miscere satis est. Attamen si ut emplaston phar-macum fiat nihil curas, resinam addere non admodum opus est : galbani uerò æquale thuri pondus indes, ubi mitissimum reddere statuis : dum ualentius, dimidium : quando ipsorum medium, id quod inter æquale & dimidium est. Verbi gratia, si quatuor thuris denarij fuerint, duas galbani impones, ualidum permanere medicamen postulans : mite quatuor, medium tres. Vt enim molle & anodyn non quippiam habet, ita quoque *σντὶνικὸν*, hoc est exedens : quod sanè plurimis mollientibus accidit. Quare cum neruo denudato pharmacum adhibes, non adeò galbanum esse commixtum oportet. Quòd si nudus ille non est, haud mediocriter ipsius temperatura dolore auferendo conuenit : ideoq; tale etiam medicamentum acuto sensu præditis, teneris & cachochymis paratum habere expedit, in quo plus galbani adiectum sit. Omnia siquidem metallica aspera sunt, doloremq; concitant, ex liquidis acetum : unde meritò ex illis confecta phar-maca aspera uidentur, & dolorifica : ob quam rem fœtus ex oleo & galbani mîstura similiter ipsis idonea est : nihil  
autem



autem minus tenuium partium adeps galbano lenis est. Quare uelim aliud quoque medicamen ex his præparatum habere, quod ex metallicis composito temperare poteris, tum in dictis corporibus, tum in his quæ asperum & dolorificum quandoque medicamentum percipiunt: deligendus autem adeps, qui tenuioris essentia existat, cuiusmodi sunt agrestium animantium, maximè leonis, pardī, apri, & ursi: ad hæc uolatilium, maxime anserū: horum inopia agrestium gallorum gallinarumq̃, ita uero anserum quoque syluestrium. Nam animalium, quæ in urbibus aluntur, & tanquam in ocio conclusa sunt, humidior est adeps & crassior. Quando pharmaci substantia cerati spissitudinē habebit, ceræ tertia uel quarta pars admisceatur: uel si adeps humidus nimium esse tibi uideatur, licet & ceræ dimidiam adijcere: quemadmodum ubi sicca fuerit, quartam: cum mediocriter habet, tertiam. Quod iam ceratum multis utile futurum est, *ἀνὶ σκάρων*, id est, ex seuis nominetur.

De medicamento *ἀνὶ ῥόγων*.

**D**Ictum mihi est & antea, uetus euphorbium recentiori multo inferius: si igitur anniculum sit, etiam cyrenæo magis liquore excoctum: præsertim eo, quem nunc habemus: ex quo per aquæ irrigationem stirpes augent, & ad liquoris copiam generandam conficiunt. Nam post annum unum abundè calidum est: deficit autem non mediocriter à recenti: bimum adhuc magis à nouo degenerat, quemadmodum trium aut quatuor annorum etiam hoc magis. Vetustioris uirtus omnino resoluitur. Cognosces autem, ut dixi, quam ætatem, quamq̃

uim obtineat, & colorem, & substantiam eius respiciēs. Colore quidem uetus nouo flauidius, pallidiusq; apparet: substantia durius & siccus. Iam si gustu uoles discernere, non coniecturalem eius dinotionem, sed firmā habiturus es. Quod uerò dixi calfactoriam unctionem ex eo me confecisse, exactissimè pharmaci facultatem tibi indicabit. Constat hac temperatura: Vna pars est euphorbij, tres ceræ, olei duodecim: ceram quidem euphorbij triplicatam, oleum uerò ipsius ceræ quadruplum esse conuenit. Vbi igitur in hunc modum medicamentū composueris, fricata quadam eius parte manifestò licet dinoscere, quantam uirtutem obtineat, maxime autem in balneo innotescit. Siquidem ab aëre moderatur, sed magis adhuc ualidè ab aqua, cum euphorbium sit calidum, recens, & forte. Tale igitur consecutus, & hanc ipsam commemoratam unctionem audacter puncturis imponito, ubi oras hiare metus est. Si imbecillius fuerit, auge mensurā euphorbij pro imbecillitatis ratione, interim partem dimidiam iniiciens, interim duas nonnumquam partes ceræ, & plures, si uetus nimium extiterit. Primus sanè usus in puncto neruo, uel tendone, ad secundum te deducet. Si namq; uulneratus ipse erosionem sensisse dicat, tibiq; partes puncturam ambientes calidæ appareāt, tum ipsa punctura magis ac par est elata, & oræ inflammatione nonnulla afficiantur, uel olei copiosioris mistura uim medicamenti remittes, uel compones aliud ad priorem temperaturam, aut euphorbio uetustiore moderatum ita efficies. Quòd si è contrario quàm dixi, eueniat, uirtutem pharmaci adaugebis. Si mediocriter omnia habere uidebuntur,

buntur, seruabis. Itaq; confectura ceram euphorbij triplicatam continens, aliarum est ualentissima: cum illud (quenadmodum diximus) recens additur: quincuplam habens, inualidissima: quadruplam capiens, medio inter utrasque ordine consistit: at si unguenta proponis efficere, qualia à medicis *ἀνοπτα* nuncupantur, oleum ceræ quadruplum immiscebis. Si uerò, ut in fracturis, liquidum ceratum parare, duplum: quando cera & sicca & pinguitudinis expers fuerit, duplo etiam amplius: plerumque uerò sufficit unius partis dimidium duplo appondere, ut tota ceræ mensura duarum pondo partium & s. fiat. Atqui emplastron medicamen cupiens componere, oleum pari mensura ceræ miscebis, si quidem ambiens fuerit calore temperatus: si cera uetus & arida, & illud frigidum est, paulò amplius: sicut cum cera est pinguis, ambiens calidum, paulò minus. Id autem minus duodecima in utriusque medij portio est: etenim & undecim, & tredecim nonnunquam olei uncias ceræ libræ temperaui, pro eius consistentiæ quantitate, tum aeris circumflui caloris frigorisq;: raro autem paulò plus, uel minus: uerum ut deligari posset, pinguitudinem uiscositatemq; haberet, nec friabile esset, aut facillè solueretur, aut à cute decideret, adiunxi resinam ei, potissimum, si aderat, terbinthinam ueram: sin minus, paratissimam ubiq; quam frictam & colophoniam appellant, eamq; pari cum cera pondere: conseruat enim medicamenti, quibus iniecta est, priorem consistentiam, ubi & ipsa mediocriter habeat: quippe notum est, ut in omnibus alijs, sic in resina quoque, maioris minorisq; rationem consistere. Itaque

si pinguior, liquidiorq; nonnunquam appareat, sciendum  
 est, ceratum quod ex cera cum oleo liquata proveniet, li-  
 quidius multo quàm erat euasurum. Summatim, in ner-  
 uorum uulneribus, cum interim ab exacta mediâq; medi-  
 camentorum emplasti modo confectorum substantia er-  
 rauerit, ad molliorem potius tendere, etiam si inquinâ-  
 turum sit: simili ratione & quod substantia mediocri est.  
 Pix autem cerati consistentiam seruat: optima uerò, si-  
 cut dictum est, in talem misturam pinguis conuenit, quæ  
 admodum & resina. Si liquidam resinam injicias, quali  
 substantia est terebinthina, tertiam ipsius partem ceræ  
 esse oportet. Atque ipsa terebinthina recens ueteri lon-  
 ge est liquidior. Cogitate igitur, quod de cera & resina  
 audiuistis, id in omnibus obseruandum esse: nec enim ex  
 siccis, & aridis, uel tempore, uel ex primaria natura, ue-  
 rùm ex mediocribus consistentia, tantum cuiusq; misce-  
 dum est in medicamentorum compositione, quantum à  
 me scriptum inueniatur. Pingamus iam, quod uim &  
 substantiam prædicti medicamenti mediocrem habeat,  
 ceræ, resinæ frictæ, & olei pæres portiones continere,  
 ipsius euphorbij sextam: ut singulorum sit libra, euphor-  
 bij uncia duæ. Quod si mollius reddere uoluerimus, o-  
 ctauam euphorbij partem injicere sufficit, hoc est uncia  
 s. in recente & calidissimo, uelut præcensui, euphorbio  
 temperatura hac definita: nam si uetustius sit, eoq; in-  
 becillius, copiosius hoc aliorum portione esse debere,  
 prius indicauimus. At si non resinam duntaxat, imò etiã  
 picem injicere est animus, selibram utriusq; miscebimus,  
 ut modus ceræ sit æqualis: quanquam multo præstat me-  
 dica

dicamentum, si resinae picisq; loco propolim ceræ parē adiungas. Quod si ipsa pinguitudinem non habeat, similiter resinis, si adhærēs pharmacum, ut fascijs ligari non opus sit, esse curemus, terebinthinam, uel laricem nominatam, uel etiam syncomisten pineam indemus: uoco syncomisten, quam ex fōdinis & figulinis accipiunt, ligna multa, ac lapidosa corpora in se habentem: quæ liquata, dum percolatur, pura tunc sicut colophonia & frictæ dicta redditur: quin & resinas αὐβόγγιτος quasi sponte fluæ De resinis. entes admiscere licet, nominant ipsas in Lacedæmone, ac plerisq; alijs regionibus πρῶβόγγιτος: in Cilicia uerò nuncupant talem capnæleon, omnibus resinis tum liquidiorē, tum calidiorē, tum substantia tenuiore præditan: quare potentiaë medicamenti, quod componis conferet, tum maxime iniicienda, cum euphorbium roboris expers fuerit. Porro inter alias resinas odoratior est, sicut terebinthina, & abietina: ostendimus antea terebinthina abietinam esse calidiorē, hac strobilinam. Differt autem strobilinum physēma, & pitynium, siccum, pinguedinis expers, arescēs utrunq; celeriter, ut in pila contundatur, & cribro secernatur, quale ad propositi medicamenti compositionem neutiquam conuenit: usus tamen sum frequentissime, cum euphorbium anniculum existeret. Porro dum componitur, olei, ceræ, resinæ frictæ, singulorum pondo libram misceo, picis pinguis sex libram: & his liquefactis, euphorbij pōdo uncias duas: si imbecillius sit, tres: si terebinthinam ceræ adijcere uoles, unam: mediocrem pharmaci consistentiam facies, si cera terebinthinam liquidam & recentem triplo suæ

peret: huius exiccatae temporis spacio dimidium pondus oleo tribues. Totum autem ex tribus mixtum, oleo, inquam, cera & terebinthina, cum sit libræ unius semissis, euphorbij anniculi unciam unam accipiet: si tale nō extiterit, unam semissem: unde, sicut iam subinde distictauimus, euphorbium pro temporis ratione augere nobis est integrum. Quinetiam si uulneri impositum pharmacum primo usu uidetur imbecillius, euphorbium oleo leuigatum, medicamuni emplastro, manibus antè subactio licet admiscere: sic enim nobis facientibus, promptè unitatem accipit. Ceterum iuxta primam pharmaci compositionem satius est ceratum rasum seorsim ubi præparaueris ita leui factio euphorbio cū oleo admiscere. Quippe ijs, quæ liquata sunt, ipsis superfusis in mortario, plerunque fiunt encerides, præsertim ambiente frigido. Aquā uerò ceræ liquefactæ cum resina cōmittere non est necessarium: sicut ego ab initio facitabam, tantum ei temperans, quantum in ipsa coctione consumendum erat.

#### Medicamentum ex liquabilibus confectum.

**L**iquabilia uoco medicamenta, quæ ignis commercio colliquantur, tum quæ ex humidis quibusdam, uelut aqua, aceto, & uino constant: ex aceto itaque citra ignē liquefcit gutta ammoniaci, sagapeni liquor, & panacis, quem appellatione composita opopanaxem uocant. Igni uerò liquefcunt propolis, cera, resina, ladanum, seuum, galbanum, quæ in duplici uase colliquare melius est. Nominauimus autem sic, cum in cacabo, qui aquam calidam habeat (prunis enim incumbit) uas alterum consistit, præter

ter liquabilia etiam galbanum continens. Habeto autem tale quoddam medicamentum saltem unum, etsi duo habere præstaret: inter quæ validius erit huiusmodi: Opopanacem ex aceto dissolutum diutius conterito, postea liquefacto super ignē propolum, galbanum, resinam terebinthinam misceto: singulorum itaque pars una esto, propoleos recentis pinguisq; sex: si uerò sicca uetusq; contigerit, præstat omnino ea non uti. At si aliam non habes, duas portiones, non unam miscebis: sin absit propolis, eius loco picem pinguem, qualis est brusia, & quæ ex regionibus circa Pontum asportatur: pinguis simul & odorata, quam in nigrum amaracinum injiciūt, quale prius totum conficiebatur: nunc etenim subalbidum amaracinum componunt: quo si careas, alia utitor, terebinthina, sicut prædiximus, duplicata. Ego nonnunquā uel solum medicamentum ex pingui pice confectum imposui, quo etiam ad canum morsus utimur: hoc namque solam picem pinguem ex aceto acricoctam huiusmodi symmetria continet: sextarium unum Romanum aceti, libram unam picis, opopanacis trientem, quod est uncias tres. Hoc pharmacum ulcus ex rabiosi morsu cicatricem ducere non sinit, sed punctis in nervosa quadam particula idoneum est: quippe quod puncturæ oras conuiuere nequaquam permittat. Quoniam uerò durum est, in duris solum corporibus eo utemur, qualia sunt aurigarum, & messorum. Sin autem puero, uel muliere, uel molliore corpore puncto, hoc tantum quispiam uestrum præsens habeat, idem cum unguento aliquando discussorio, amaracino maxime & opobalsano, colliquare licet, de-

inde cum irino & comageno : hæc si non adsint , leuciano, susino, & cyprino : his quoque desideratis, oleo ueteri liquefaciat : & si in Alexandria degat , ricinino & raphanino : hæc siquidem copiosissima in illa ciuitate habentur , sicut etiam in uniuersa Aegypto . Atqui in illis regionibus sinapiñ oleum haud facile reperiri potest : cuius & ipsius parte mixta pharmacum longè acerrimū fore , nemo ambigit : ut ad puncturas conuiuentes aperiendas conducat. Patere autē cuilibet arbitror ex prædictis, si loco opopanax sagapeno prius in pila ex aceto trito liquefactam resinam, propolim & adipē quampiam acriorem adicias, eiusdem generis medicamen futurum : alterum uerò mollus est genus pharmacorum liquabilium, sed acetum non habet, quod propoli & seuis tantum præparatur, cera quoque propter spissitudinem adiecta, ex cuius mistura pharmacum tactui blandius redditur. Adeps tenuium partium acrisq; esto, sicut leoninus & pardalinus, hyenæ & ursi. Sed de anserino quid attinet dicere , præsertim cum anseres rusticæ fuerint? Quin & tauri uetustus adeps & hircinus huc conuenit: nam mixtæ naturæ tum facultatis adipēs temporis interuallo (quia terrestres acresq; sunt) in maiorem acrimoniam declinant, similiter uidelicet plurimis quæ uetustescunt : sic namque & ipse porcine adeps omnium cum sit mollissimus, temporis processu acrimoniam acquirit. Idem uino, aceto, & melli accidit: in horum genere sunt etiam medullæ: longe uerò præstat ceruina, & uitulina: coagulum his acrius, & iam uehementioris pharmacorū generis propemodum existit. Itaque & huiusmodi ali-

quod



quod pharmacum habere uos consulo, ut cū à forti quodam medicamento supra modum morsam partem offendas, oleo prius eam fotam huiusmodi quodam contegamus: sic nanque placata rursus ad acrem curadi modum redire poteris. Ego itaque dum partem in neruo uulneratam quandoque soluissem, uulnus irritatum contempletus, pharmaco liquido fortè fortuna presenti, quod ex adipe constat, ad aures inscriptum, eoq; in uase duplici calfacto illeni, ac subito inde auxilium ægrotanti accedere percepi: quippe statim omnis dolor quieuit, ac deinde uulnus soluente secundum naturam habere uisus est.

De pharmaco ex columbarum stercore  
confecto.

Columbarum in turribus rusticorum agentium ster-  
cus acre est, quo interim ruri usus sum in adole-  
scen- te nerui uulnere affecto: atque hoc agricola cum uidisset, loci consideratione (erat enim non imprudens) imi-  
tatus semper usurpat, & neruis uulneratis medetur. Por-  
rò compositio, tum usus idem omni medicamini ex eu-  
phorbio, & alijs qui similem confecturam habent: sed  
euphorbij loco stercore indito. Verum stercus hoc sub-  
tilitate euphorbio cedit, eoq; duris corporibus ex usu  
est. Temperavi aliquando ipsum metallicis simul, expe-  
riundi gratia, statim à principio cum eis terens ex aceto  
ad solem, sicut nuper docui, multoq; acrius medi-  
camentum euasit, quemadmodum & cum  
æru- ginem uiuam ac-  
ceperit.

Aliud est  
Actuario

De pharmaco *ἁπλῶς* *Βιταρῶν*, id est, ex herbis  
composito.

*ἁπλῶς* *Βιταρῶν*. **I**nsuper ex subtilibus herbis ad nervos uulneratos me-  
dicamentum composui : initio quidem ex dictamno,  
amaraco *ἔρ* malo terre, id est, aristolochia tantum, po-  
stea uerò ex alijs, mei ipsius periculum faciens, an rectè  
compositionem ipsorum coniectura assequeretur : atque  
omnia, quò uolebam, perduxi. Idoneæ uerò ad id herbe  
amaritudinem sine astringitione gustu refrant, uel acro-  
rem, non tamen immodicum : tales sunt præter prædi-  
ctas, maron, amaracum, polium, argemone, chanapitys,  
centaurium, quæq; eius notæ in simplicium medicamen-  
torum doctrina commemoratæ sunt : quemadmodum es-  
tiant radices omnium aristolochiarum, dracunculi, ficus  
agrestis, bryonie, altheæ, iridis, acori, mei, asari, phou,  
gentianæ, *ἔρ* panacki. Omnium siquidem id genus mate-  
riam in simplicium pharmacorum commentarijs expo-  
sui : at radices, herbasq; totas non modò intelligere opor-  
tet, sed etiam accuratè contusas tenuibus cribris secerne-  
re, imò etiam denuò exactè leuigare, ut arida collyria is-  
que in puluerem redigantur : nam crassa essentia nervos  
uulneratos nihil iuuat, qui subtilia, ut diximus, pharma-  
ca requirunt. Cæterum percolatum medicamen, leuigæ-  
tumq; cerati modo excipiat ea temperatura, quæ in eu-  
phorbio prius indicata est. Quantum enim in illo binuli  
euphorby, tantum ijs dictamni, mei, *ἔρ* acori iniiciendum  
est, tum quæ his similiter calida gustu percipiuntur : quan-  
tum uerò illis trinuli, tantum ijs aristolochiæ, iridis, dra-  
cunculi, gentianæ, aliorumq; id genus, quæ perinde ac il-  
la ama

*La amara sunt, immittemus.*

De pharmacorum confecturis, quas Græci  
 πικρυλλᾶς, hoc est, sumptuosas vocāt, ad  
 neruos vulneratos.

**N**on abs re fuerit, etiam eiusmodi pharmaca cogno-  
 scere: usus enim ipsorum quandoq; sed rarius in-  
 cidit, quemadmodum simplicium frequenter. Vbi enim  
 quispiam pharmacorum medicorumq; studiosus, nō plu-  
 ra quingentis myriadibus haberet, nullo simplici puta-  
 bat uti: multò magis uel diues aliquis, uel monarcha,  
 odoratum simul & quod multa constet pecunia, uolet  
 habere pharmacum. Porro diuitis, quem citavi in primo  
 de pulsū prænotione, suppresso nomine memini, quem-  
 admodum & nunc: qualis autem erat, ex duabus ipsius  
 actionibus eiusmodi condisces. Vlcus famuli malignum  
 ipse sanare conabatur: ubi autem nihil promoueret, mi-  
 hi hominem tradidit: ac cum uideret curatum, medica-  
 menti scripturam postulabat, nesciens multas quidem ma-  
 lignorum ulcerum esse differentias, multas item medica-  
 mentorum, sed arbitratus unum pharmacum omnibus  
 posse mederi. Cum igitur qui offerebat, neque artificio-  
 se ipso uteretur, postquam audiuit, quibus constaret, es-  
 sentq; omnia uilis precij, hoc, inquit, mendicis serua, me  
 autem sumptuosius aliquod doceto: quinetiam puello diu  
 ex auribus laborante, ubi ipse multis, quibus usus erat  
 medicamentis citra methodū, nihil attulisset præsidij,  
 nobis illum quoq; curandum adduci præcepit: posteaq;  
 audiens ex quodam sibi ob uio puerum sanatum, non po-  
 stula

stulauit pharmaci scripturâ accipere. Hic igitur ipse con-  
 templatus, multis, quibus nerui uulnerati erant, digitos  
 & abscissos, & putrefactos: quosdam uerò perijisse,  
 uel mancos redditos: deinde intelligens nullum ex eis,  
 qui à me curati essent, periclitatum, omnes uerò celeriter  
 sanos euasisse, pharmacum cupiebat aliquod à me acci-  
 pere odoratum simul & sumptuosum, quo neruorum  
 uulnera posset sanare. Ego sanè multas iam sæpe tum fa-  
 miliaribus, tum amicis medicis scripturas iuxta prædi-  
 ctam methodum ex tempore compositas tradideram, ut  
 experimentis compositionis ipsorum ratio confirmare-  
 tur: sumptuosum uerò, cuiusmodi ille uolebat, pauper-  
 culis hominibus nullum utiq; dedi, ratus melius esse re-  
 media ex paratu facillimis componi. Cum igitur diues il-  
 le odori sumptuosiq; medicaminis compositionem ali-  
 quâ accipere petijisset, plures ei scripturas donauì prædi-  
 ctâ methodo factas: quas cum experiri festinaret, tum li-  
 beris, tum seruis neruis uulneratos sibi conquirere in-  
 iunxit: medicamentis autem supra omnem spem opera-  
 tis, primum sanè me laudauit, ut qui citra inuidiam scri-  
 pturas ei communicauerim, postea etiam donis profecus-  
 tus est: etenim ad huiusmodi officia promptus erat. Por-  
 rò medicaminum, quæ ei dederam, confectura est talis:  
 Cinamomi, dictamni, mæri, singulorum denarium pōdo  
 quadraginta: hæc nanque odorata sunt, & subtilia: at  
 amaracum quasi non boni odoris nequaquam miscere co-  
 gitauì: deinde quoniam Romæ egrè poterat inueniri,  
 sicut & marum, uidebam autem illum egrè parabilibus  
 gaudere, quemadmodum & sumptuosis, apposui scri-  
 pturæ

pturæ etiam illius pauxillum quiddam partis unius, ut puto, quartam uel quintam portiunculam: hæc contusa, cribroq; subtili secreta temperare iussi, cerato ex opobalsamo optimo, & cera tyrrhenica facto: temperatum uero esse conieciuravi, si ceræ partes octo, opobalsami decem receperit: at ne friabile medicamentum foret, sed si bi cohærens unitumq; , etiam resinæ terebinthinæ, quæ & ipsa odorata, modò sit optima, partem unam adieci. Verum si generosius, ut dixi, medicamentum facere proponas, non unam cuiusque herbæ commemoratæ partem immittas, sed amplius, ut una & semissis fiat. Hoc igitur ab experientia probatum est medicamen: alterũ ex eodem cerato, & liquore ciryneo compositũ, mĩstura proportionẽ euphorbij facta, tertiumq; aliud ex utrisque temperatis confectum: quartũ deinde, quod statẽten myrrham accepit: in quibus autem neruus nudus est, ibi ceratum ex cera, quæ uocatur *μυρ + μα*, & unguentis apud Romanos dictis spicato & phuliato cõpositũ: duodecimam partem pompholygis ei adnũscens, siue eloti masculino genere, siue elotæ foeminino malis dicere: nihil enim, quomodocunque dicas, uel præsidij, uel nocu-  
menti pharmaco adferes: licet autem & ex tyrrhenica cera ipsum præparare: nec prohibet quicquã, sine prædictis unguentis tyrrhenicam ceram ex nardo usto lique facere, in duplici nẽpe uasculo, quod in omnibus unguentis commune est: at raso cerato spicæ nardi, amomĩ, folij malabathri, & põpholygis eloti pares singulorum portiones miscebis. Etenim in puncturis, sicut præceptum est, acriora pharmaca prosunt, quæ uulnus apertũ per-  
seruent:

*seruent: denudatis autem mediocri astrictione, cum dige-  
rendi uirtute absque morfu prædita offerre conuenit.  
Quaquam & amomum astrictionis sit particeps, magis  
autem ipso nardi spica & malabathri folium.*

# E quarto libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

KATA GENH.



**P**RIMVS sanè liber in alborũ  
emplastrorũ confecturis, alijsq;  
tum eorum quæ ulceribus cicatri-  
cem ægrè ducētibz conueniunt,  
finitus est: ubi distinximus com-  
muniter appellata dysepulota, id  
est cicatricem difficulter admit-  
tentia, ab ijs quæ propriè cacoëthe, hoc est maligna di-  
cuntur, & ipsa nimirũ dysepulota. Quoniam uerò quæ-  
dam saniei humorumq; ulceratis partibus influentiũ ui-  
tio cicatricem ægrè admittunt, quædam ipsa affecta sede  
influentem succum quamlibet probum corrumpente, se-  
cũda ratione ulcera dysepulota & cacoëthe propriè no-  
minant: in quibus interim totam partem affectam excin-  
dere, uel adurere nonnulli coguntur, aut medicamentis  
crustam inducentibus, aut igne utentes. At cum ampla sit  
latitudo utrinque in eo, quod alterum altero magis mi-  
núsue

nusue dysepulotum, malignumq; est, tantũ medicantium pharmacorum esse numerum oportet, quantus ipsorum quoque ulcerũ extiterit. Meritò igitur omnes, qui unum duntaxat medicamentum ulceribus malignis cicatricem inducere pronuttens habet, successu crebro frustrantur. Nam duo (minimum) quæ idem pollicentur, eandemq; facultatem ostendunt, diuersa alioqui inter se, non simpliciter maioris minorisq;, uerum ut apertissime dicam, maximi ac minimi ratione in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus uitia curare proposuerit. Quemadmodum commentario Therapeutices in uniuersis affectibus primam omnium communem auxiliorum potentiam inueniri docebamus, dein materias, quibus illa cõtinetur: ita nunc quoq; in ulceribus dysepulotidis generalem pharmacorum, quibus illa curabũtur, facultatem, quæ tandem sit, uel prius inuentam esse oportet. Indicata mihi est hæc in illo opere, cum quidẽ nullus uitiosus habitus uulneratas partes infestat, duos scopos habens: unum, ut id quod influit, repellat: alterum, ut quod affectæ parti inhaeret, infixumq; est, discutiat. Atq; hæc contrariæ uires præstant: siquidem influxum reprimunt, quæ sunt astringentia pharmaca: digerunt impacta iam exceptaq; trahendi potestate prædita. Porro quæ astringunt ut plurimum exasperant, atq; hac occasione molesta sunt. Trahentia uerò, ac digerentia ex alto humiditates, non citra acrimoniam id efficiunt. At acrimoniam dolor aliquis necessariò sequitur, ulceratam partem erodens: atq; sic propter dolorem, quam exasperantia erodiētiaq; concitant, humores ulceratis partibus influentes irritari contingit:  
unde

unde quoq; ulcus phlegmone obsideri exediq;. Ex quibus dictis colligitur, ulceribus dysepulotis præsidia inueniri non posse, multò minus adhuc malignis. Quare talis pharmacorum materia, quoad eius fieri possit, inuenienda est, unde ulcus citra dolorem siccescat: quod ac curatè fieri nulla ratione licet, medico ignorante, quem affectum medicamen exhibitum ostenderit. Quippe ex ambobus compositum, erodente puta & astringente, necessariò ualidum existit. Verùm sordes & humiditatis copia id genus ulceribus incumbens, ueluti propugnacula quædam ulceratis particulis facta rosionem ualentibus pharmacis adimunt soluuntq;. Itaque attendendum est, quantum primus usus humiditatis in ulcere desiccauerit: uel si etiam sordes habeat, quantum inde absterferit. Ac jta secundum, tertiumq; uti illo debemus, donec purum & siccum ulcus apparuerit. Vbi uerò id tale conspexeris, ad aliud medicamentum te conferes, eiusdem quidem speciei, sed priore imbecillius. Nam ualidiora, dum mordendo ulcus dolorem inferunt, fluores mouent, & phlegmonas concitant. Quòd si rursus aliquod multò imbecillius priore pharmacum adhibeas, ulcus humidum, sordidumq; euadet. Hac igitur parte artificio utens medicus, eo qui experimento innititur melior est, quòd sciat ulcus non alia medicamentorũ uirtute curari, quàm dum affecta pars eam siccitatem consequatur, quam in naturali statu sita possidebat. Quòd factum intelligimus, ubi neque tenuis amplius sanies influat, neque pus producat. Hanc dispositionem ulcera nanciscentur, quo dixi modo siccescentia, hoc est astricta, discussaq;: dein ubi  
sicca



sicca quidem fuerint, uerum sordida adhuc appareant, deterforijs pharmacis repurgantur, quæ & ipsa in opere de simplicibus medicamentis commemorauimus, in quo prius exercitatum esse conuenit, qui hinc omnino frugem reportaturus est. Hoc uobis amici, quibus ista scribuntur, constare manifestò admodum noui: itidem rationem sine operum exploratione probabilem non esse, dicta iam mihi demonstrant. Etenim uidistis subinde medicos quosdam, illis ipsis pharmacis sine uia ac ratione usos, nihil promouisse: me uerò multa eius generis ulcera persanasse. Quamobrem in memoriam reducite medicamenta citra demorsum exiccantia: qualia sunt per multa metallica. Atqui hoc etiam meminertis, quòd combustis elotisq; erosio, quæ prius absuit, edomatur ac interit. His igitur impræsentiarum uti uobis licet: elotis quidem in pueris, eunuchis, mulieribus, & qui molli natura carne sunt præditi: item qui ad sentiendum habiles admodum sunt, & uitioso succo laborant. In alijs corporibus etiam illa usurpare potueritis, mane primum ipsa partibus, quæ curantur, probè diffatis adhibentes. Si uerò corpus totum præparationem quandam requirat, & hanc prius factam esse oportuit, præcipimus de his in commentario de morbis curandis. Nonnullis siquidem uel purgatio sola sufficit, quibusdã sanguinis detractio, alijs utraque hæc adhibere profuerit. Sunt in quibus superiacentem uaricem excindere satis est: uel lieni, uel iocineri prospicere: aliquibus ambiètes ulcus partes præscindere: quemadmodum interim laborum callos amputare. Si horum quid experiri oportet, humoris copia si-

Q

mul cum sordibus inspicienda est : atque ita ad idoneum medicamen uenimus, rursus simplicium memores, quæ desiccant, non tamen ulceris sordes abstergunt: item quæ abstergunt quidem, non tamen probè desiccant. Porro quæ utrunque possunt efficere, prospiciemus ex quoto quodq; ordine existat, quod maximum inter ea censeo, quæ ad curationem pertinent, neglectum tamen medicinalis materiæ scriptoribus. Nam hi solas uniuersales ipsius uires dicere studuerunt: sicut etiam Dioscorides, quem nulli eorum qui in eadem quasi arena desudarunt, secundum esse quisquam dixerit. Ego igitur deinceps omnia phar̃maca recensebo, quæ ulcera citra demorsum & manifestam exasperationem exiccare possunt. Incipiam à metallicis, quibus etiam terræ species adnumerantur. Porro cum uariè inter se differant, in eo quod magis minusq; siccant, à medijs orsus ad uehemētia, uel obscurius exiccantia me conseram. Siccant igitur modicè lemmia sphragis, & cadmia, præsertim quæ sua sponte nascitur, præter quod in torrentibus aut riuis quæritur, ac in Cypriorum montibus, alijsq; locis inuenitur, maximè ubi metalla sunt. Consueui eam magis siccantem reddere per æstatem in sole, pluribus deinceps diebus terens ex aceto, aut uino colore giluo, substantia pellucida. Cuiusmodi est in Italia Falernum, in Asia Tmolites, quod multo maximè siccare natum est. Hoc genere comprehenditur & Ariusium in Chio natum: item odoratū Lesbium in Eressò & Mithymna. His succedunt omnia uetera, cum ex albis & astringētibus inueterata sunt. In Italia Signinum, Tiburtinum, & Marsum: in Sicilia uocatū

catum ab incolis Aminæum : in Asia Aphrodisæum, & Misyum. Sufficit enim mihi horum facultates uniuersales ueluti exempla exposuisse. Iam uerò caduam ex aceto acri, similiter multus per æstatem diebus in sole præparo, siccataq; repono, ut ulceribus malignitatem assumentibus inspergi possit. Valentius hoc phar-macum est, chalcitis combusta eodem modo prius in puluerem redacta : post hanc ignem non experta tam ualens medicamen-tum est, ut crustas faciat. Lotam igitur ipsam, deinde tunsam habere satius est. Minus enim lota, quàm usta desiccatur, tum lōgè melior est, minusq; mordax. Per-simile medicamentum est etiam ærugo cōbusta, quæ ignē non experta est, fortissimum medicamen est, sicut chalcitis. Verum hæc nonnihil etiam astringit, & ea multo magis chalcanthum, quod inter metallica maximè siccatur. At ærugo huius potentie omnino particeps non est. Misy autem & fori chalcitidi genere cognata sunt, ex una, ut dicam, radice producta: tenuius tamen misy apparet, tum minus mordax & urens : crassius fori est, & utrisque siccatur imbecillius: quemadmodū & stibi maiorem astrin-gendi siccandiq; uim ac fori possidet. Porrò diphryges appellatum pharmacum, ulceribus ægrè humiditatis uisio ad cicatricem uenientibus aptissimum est: nalidè nan-que siccatur, etsi modicè mordax. Ad hæc, præter acrem-tum qualitatem, tum potentiam, uim habet astrictoriam: quas tamen utraq; fortiores & chalcitis cruda, & chal-canthum repræsentat: siue id masculino genere, siue foemini-mo, siue neutro appellasse quis malit. Nam hoc uobis interim succurrat, de nominibus contendendum non esse,

ubi speculationem ipsius artis usui necessariam ediscere statueritis. Porro alumen quodlibet ulcera satus exiccat, generose astringit: unde nemo solis his ad ulcera utatur, sicut nec cruda chalcitide, & ærugine: usta uerò & hæc & masy utilia sunt, ut elota morsum quidem remittunt, uerum minus siccant. Itaque lotis uti tutius est: quoniam permulta corpora, quibus mederi cogimur, unam quandam dispositionem habent, qua uehementem comorsum ferendo non sunt. Audiuistis hæc frequenter, & nunc iterum commetationis gratia in toto subsequenti sermone repetere conabor. Quæ igitur plethora uisiosoq; succo laborant corpora, ad hæc quæ tenera carne prædita, & ad sentiendum insigniter habilia sunt, facile ex morsu, seu rossione phlegmonem recipiunt. In horum numero continetur mulieres uidelicet candidæ, pueri, eunuichi, uiri cute alba: insuper qui regionem frigidam incolunt, humidi hi quoque & pituitosi, eoq; molles & albi: quemadmodum ij, qui calidum tractum inhabitant, ut Aegyptum & Arabiam, duros corporum habitus, & siccos sortiuntur. Itaque hæc ueluti in mentem reuocando, appositurus sum & aliã pharmacorum simplicium materiem, quæ malignis ulceribus curandis sit idonea. Sarcocolla igitur & ichthyocolla, his magis adhuc chrysocolla tali facultate prædita est. Huc optime facit & plumbum combustum: post hoc fori, stibiq; eaq; combusta: insuper plumbi recrementum, Græci *κνωστιαρ* *μολύβδου* uocant, probe siccatur: quemadmodum & ferri squama, euidentius tamen stomomatis. Porro æris squama, præter quod siccatur, etiam abstergit purgatq;. Vnde  

pura

pura quoque ulcera efficit, quod reliquæ squamæ non possunt. Quare si hæc omnia medicamenta arida ulceribus malignis ac contumacibus inspergis, mirificè uidebis citra erosionem ea desiccari sicut ubi buccinorum testas concrematas, purpurarum, ostreorum, aliorumq; id genus adhibueris. Quin et lapis specularis, græce *ἀγλακίς*, Romanis olim specularium dictus, ex ijs est quæ leniter ac sine morsu exiccant: qui uisus ulceribus dyssepulotis, non item malignis ac rebellibus conducit: quippe minus exiccat, quàm illa requirunt. Idem potest uisum uisum, ac ignitum illud quod in uasis æreis calciflorijs adheret. Cæterum ægyptiæ spinæ fructus, galla omphacitis, hoc est, innatura, rheon, malicorium, tum radices, tum herbæ non paucae ultra siccandi etiam astringendi potestatem habent: nam et malum terræ, iris, acorū, arthemisia, panacis radix, ægemone, chamæleonis nigri radix, ciperum, dracunculus, et gladiolus affatim exiccant. His euidentius adhuc centaurium, et polium: quibus paulò imbecillior est terra nomine erythrias, uti ualentior est ampelitis. Talis sanè medicamentorum simplicium ad ulcera maligna ac contumacia materies existit: extrinsecus autem nonnulla ipsis apponuntur, quæ quidem per se uehementis potentie gratia non admoueri, sed alijs temperari solent, ueluti ærugo ignem nondū experta, calx uiua, et illota, et molle aphronitrum, quod reuera aphronitrum est. Quanto enim spumantius, tanto præstantius est utraq; facultate, tum quòd minus mor det, tum quòd magis digerit. Didicistis enim in opere de simplici medicina, subtiliora crassioribus

bac uirtute inter omnia, quæ simili specie comprehenduntur, præcellere. Porrò nihil tam nobis uitadū est, quàm pharmaca generis oleosi, quæ Hippocrates *μαλακῶσα*, id est mollia nominat: cuiusmodi sunt omnes adipēs, præsertim porcorum, dein resina, postea cera: alia uerò ratione & quæ indurata remolliunt, *μαλακτικὰ* dicuntur, non conueniunt, galbanum, bdellium, gutta ammoniaci, styrax, medullæ. Item alio modo acria, piper, zingiber, sinapi, canchri, multaq; eius generis alia.

Quomodo medicamētis siccis modò commemoratis, in vlceribus ad cicatricem  
agrè venientibus & malignis,  
utendum sit.

**H**uiusmodi ulcera uitioso plena humore necessariò  
existunt: pleraq; uerò ipsorum etiam sordes copio  
sas sustinēt. Quoniam ergo siccum aliquod pharmacum  
ipsis sumus inspersuri, conuenit prius ea limcolo molli,  
puro & sicco exprimere: ubi ulceris cauitatem medica-  
mento impleueris, platysma labris attenuandis accommo-  
datum extrinsecus superdandum est: hinc rursus linamen-  
tum undique æquale foris inuiciendum, cui spongiam, ex  
aqua aut uino tinctam applicabimus. At permultum re-  
ferre existimabis, ut spongia frigida maneat: quod ex fa-  
cili fiet, si frigida continuè citra deligaturæ solutionem  
foucas: sed hanc ei imponere, ac circumdare debes, ut  
Hippocrates in commentario de fracturis edocuit, maxi-  
mam offensam fore ratus ex deligatura, quæ ad elegantē  
formam, non usum conducit. Si igitur fascia una fuerit,  
superius

*fursum tendet, siue sura, siue genu, siue talus, siue cubitus, siue manus summa, siue alia quævis pars laborauerit. Quod si duabus uti uelis, ut in fracturis, altera à parte affecta sursum feretur, altera deorsum prius, mox in superiore parte desinet, dum ipsa priori coniungatur. Quamobrem hasce fascias ex linteis, non laceros panniculos esse, ut omnes nouistis, expedit. Tertio quoq; die, non singulis soluendum membrum est, sic ut aqua non adhibita, quo dixi modo nuper, molli, puro, & sicco linteo saniem ulceri abstergas. At si ambientes ulcus partes phlegmonodes quippiam repræsentent, humidum medicamen latum extrinsecus platysmati superaccommodandum est ex meo phœnicino, non simpliciter liquefacto, sed cui plurimum uini astringentis adiectum sit: non tamen cum refrigerante oleo liquare ipsum conuenit: uerùm si rubor quisspiam, uel omnino calor in circumpositis ulceri partibus exuperet, astringente, & refrigerante id faciendum est. Sunt huiusmodi, myrteum & melinum: si hæc non adsint, adhibeto quod omphacinum, & omotribes nominât. Si durities maior extiterit, oleo ueteri, uel ricinino ipsum phœnicinum liquefacies. Sed tutius fuerit, si nihil in ambiente ulcus loco uitiosi appareat, superpositæ regioni liquidum medicamentum ad mouere, quod repellat, si quid prius uel prauum, uel plus quam par est, influat: maximè cum in crure ulcus obortum superpositam uenam uaricosam habeat: quæ dum magna est, ac colore nec rubrum, nec probum sanguinem, sed atrio rem, magisq; melancholicum continere uidetur, excitanda uenit. Interim uerò contigit, ut ue-*

na tali excisa ulcus statim ad cicatricem ueniret, etsi iam annum durarat: uerum ipsius loco iuxta diuisionem, ubi erat excisa, ulcus malignum ac contumax oriretur, cui cicatrix induci non potuerit. Igitur in id genus uitij præstat, uiribus ægri consultis, à uenæ incisione auspiciari: deinde pharmaco purgare melancholicum humorem, & cum hoc etiam pituitosum educente: quoniam is quoque unquam nonnunquam cum melancholico influit, dum uarices generantur. Postea ipsam uenam ulceri suprapositam in longum scarificare commodum est: ubi abundè uacuaris, ei ipsi uenæ sectæ prius medendum: postquam exactè iam cicatricem ducere uidetur, tunc maligni ulceris curationem, ut prædictum est, aggredere. Iam uerò lien interdum malè affectus uitiosi talis humoris auctor est, sicut & iecur: quibus antea promissis, sic tandem ad ulcus curandum uenire oportet. Pari modo si uniuersum corpus cachochymum, uel plethoricum existat, prius expurgare uacuareq; expedit, quàm medicamentum ulceri admoueas. Porro intra ulceris per arida medicamenta curationem, quotiescunq; solueris, aduertendum est, qualèmnam in particula effectum ediderint: sciendumque, ac in memoria habendum, nonnulla desiccare, non autem detergere, cuiusmodi sunt illa, quæ astringendi qualitatem obtinent, ulcus purum non efficiunt. At quæ præterquam quòd siccant, adhuc etiam detergunt, ea non modò siccant, sed puram quoque totam partem exulceratam efficiunt. Præterea notandum uenit, pura ulcera ab ijs medicamentis, unde prius cum essent sordida nihil rofionis percipiebant, nunc erodi,



di, morderiq; . Quæ causa est, ut à ualentioribus absterforijs pharmacis ad mitiora lenioraq; digrediamur, ubi ulcus adamussim purum inuenerimus. Quemadmodum rursus in sordidis ad magis abstergentia transimus, nisi ex rosione sordida apparuerint. Hoc siquidem medicis etiam bonis existimatis nonnunquam imposuit, ut ad absterforium ualentius acriusq; se conferrent: unde iterum ulcus erosum, ex æquo sordidum, uel etiã magis adhuc, altera solutione uisum fuerit, carne quæ id fœdat à medicamento colliquata: non ita in prauam saniem degenerat. Cæterum quicquid in his ipsis tenuioris substantiæ est, à pharmaco diffilatur, reliquum ibidem ulceribus infixum sordes ipsis redditur. Quare animum attendere oportet, utrum ulcus carne quæ subest exesa ac colliquescente sordidum euaserit, an quia medicamen sordidis auferendis aptum requirat, impositum uero tale non sit. Quod indicat ulceris maior facta cavitās, tum oræ rubentiores calidioresq; cum medicamento acrimonia abstergentur. Forsan igitur superuacaneum fuerit, in præsentī commentario compositorum medicaminum usus, rationē, modumq; adscribere: quippe in methodo curandi explicatū. Quæ uerò necessaria sunt, et magnam noxam adferunt neglecta, satius est bis tēre, ut fidelius memoriæ in hæreāt, eadem repeterē. Ponamus igitur et hoc in talium ulcerum curatione, si quidem citra totius corporis offensam fieri poterit, ægrum à balneo abstinere, perfricari linteis largiter, mox oleo, deinde serulis exerceri, si crus fuerit affectū: uel cursu, si partes superiores male habeant. Quod si à balneo temperare sine totius corporis noxa non po-

terit, soluere deligaturam non oportet: uerum ut ligatum est membrum lauare, & aquam calidam ex spongia exprimere, aliamq; mox frigidam infundere, ut nullus in deligatura calor sit reliquus. Iam si curatio succedere uideatur, etiam absque spongia alligata sanari potest, si phoenicinum liquefactum, ut dixi, extrinsecus imponas, uel citra spongiam, quæ fasciis comprehensa uelut in fracturis, ærotæ corporis parti orbiculatim circumdatur.

### Compositio emplastrodis medicamenti.

**Q**uoniam malignorū, & difficulter cicatricem recipientium ulcerum curationis summus est scopus, ut medicamentum citra morsum exiccet: aqua uerò & oleum maximè omnium humectent, ab eis abstinendum est ita, ut nec per se adhibeātur, nec alijs siccis temperentur. At cera deligēda est, neq; natura, neq; uetustate sicca, uerum recens & pinguis: quam in sole emollitam aridis medicaminibus dictis, quibuscunq; uoles, excipere licebit: sin autem sol absit, apud ignem calefacta subigatur, & in calidam aquam demergatur. Non enim aqua per tota miscetur, sed statim ab ea emollescente defluit, antequam ulceri fuerit imposita. Symmetria uerò mordicationis est talis.

Medio cre medicamentū hoc modo efficitur.

Quarta pars metallicorum ceræ adiicitur: ualentius erit, si tertia sumatur. Porro cum ipsa metallica minus magisq; lenia siccaq; existant, uirtus in ijs que magis siccant, intendetur: quæ minus, & emittetur: quemadmodam  
rursus

rursus tutior leniorum usus est, mordaciorum periculo-  
sior . Dictum nanque frequenter est, nonnullas naturas  
corporum, tum cutem, tum carnes magis sensorias habe-  
re, quibusdam has minus esse sensiles . Item pro maioris  
minorisq; sensus ratione doloris etiam affectus sequitur,  
ut & phlegmones . Accedit huc non mediocris differen-  
tia, quòd quis molli sit carne, uel duriore, boni maliq;  
succis, uel plethoricus, uel uacuis, uel medio quodam mo-  
do inter enumeratos affectus: unde colligo, unum omni-  
bus medicamentum preparari non posse: sed quaecun-  
que ex similibus specie cõstitutum fuerit, hoc uti sciet ille,  
qui methodum isto libro traditam artificiosè didicerit.  
Exempli gratia in subiecta materie: si pares utriusque,  
æruginis & æris combusti partes misceas, aluminis scis-  
si partus unius dimidium, ut totum tribus uel duobus de-  
narijs s, uel uncys totidem constet, sufficiet ceræ dena-  
rios adijcere denarijs: decem uerò uncias uncijs, in tem-  
perati & medijs facultate phar maci compositionem: me-  
lius fiet, minúsque mordebit, si loco aluminis scissilis di-  
phryges accipiat: cuius uno denario integro iniecto,  
erit præstantius: & si æruginem mordacius facturam  
suspicati, lene prorsus ipsam fieri postulemus, cou-  
bustam apponimus . Insuper si expurgare sordes sta-  
tuerimus, æris squamæ denarij dimidium addetur, ut  
tota medicamenti temperatura talis euadat: æris, æru-  
ginis ustæ, diphyrgis, singulorum partes æquales,  
hoc est, cuiusque denarij pondo unius, æris squamæ de-  
narij dimidiũ. Hæc pingui cera, ut dixi, excipiantur: ubi  
siccior paulò fuerit, quam ut cõmemorata excipiat, tem-  
perari

perandum est oleum myrteum quo mollescat, uel melissinum, uel lentiscinum, uel ricininum, uel cyprinum, uel omotribes uetus, uel recēs hispanum, uel quod apud nos ex oleæ surculis conficitur. Aut si omnino nihil oleosum medicamento adhibere placet, Laricem resinam admisceat: cuius si copia non est, terebinthinam in locum restituito. Cæterum hoc semper in memoria tenendum est ijs, qui hæc legunt, maximè ad primum nuper dictum, tanquam præstantissimum ueniendum esse, mox ad secundum & tertium, deinde ad alia, ceu pro pharmacorum uirtutis, & potentie portione, sermonis ordinem nobis usurpantibus.

Quæ medicamenta Crito scripserit. Medicamentum  $\xi\zeta\lambda\alpha\delta\acute{\alpha}\nu\omicron\varsigma$ , hoc est, ex Ladano.

**O**ptimum medicamen epuloticum, quod  $\xi\zeta\lambda\alpha\delta\acute{\alpha}\nu\omicron\varsigma$  inscribitur: conuenit prætumidis ulceribus, & cauis: deligatum uerò membrum in diem quartum continendum est: Picis aridæ denarium pondo centum, æruginis rasæ denarium pondo uiginti quatuor, æris combusti denarium pondo quindecim, squamæ rubræ denarium pondo uiginti quatuor, ladani pōdo uncias nouem, argenteæ spumæ pondo libras tres, olei sextarium s, uini optimi sextarium unum s. Hoc emplastrum præpara-

Quæ uocet ui & ego, materia, quæ nullum  $\mu\alpha\lambda\theta\alpha\kappa\acute{\alpha}\nu\omicron\varsigma$  sit, hoc est, molle pharmacum contineret. Sic enim uocat Hippocrates omne genus medicaminum, quæ connotam humiditatem habent, qualis in pingui est, singulisq; oleosis medicamentis, & quidem in ipso oleo & aqua. Quin & resina, ce-  
raq;

raque molle quippiam occupant. In medio ipsorum, dico autem siccorum temperamento et mollium, pix consistit: eoque ambobus generibus citra offensam admiscetur, quemadmodum tum argenti spuma, tum arida phar maca, quae circa median materiẽ versantur, etiamsi nonnihil ad utrumvis excessum interim declinent. Hoc genere comprehenditur pix quoque, secundum siccitatis ac humiditatis oppositionem manifestò iam à medijs recedens, secundum alteram oppositionem calefacientium et refrigerantium non item: calefacit enim modicè, atque ideo medicamentis quae pus mouent, admiscetur. Quamobrem in proposito medicamine arida pix medijs attribuitur, atque hac magis argenti spuma, tum alia quae sic candi uim obtinent.

### De indicationibus ad vlcera curanda.

O Stensum est in medendi methodo, praesidia ex indicatione ab ipsis affectibus contrariae illis temperaturae inueniri: item à tota animantis cuiusque figura, tum à singularum rursus partium propria et simili: unde si ulcus simplex, cauum habeat quis, ab ipsis generalibus, sed quae non mediocrem differentiam in particularium speciebus habent, curatio sumetur: atque ob id demonstrauimus ulcerum omnino simulum quaedam à medicamentis, quae ad plenum siccent, persanari, puta, radice panacis, aristolochia, acoro, iride: nonnulla à solo thure, licet hoc carnem non inducat, sed illas naturas ad suppurationem perducatur, quas aristolochia carne replet. Sicut autem in corporibus curandis differentia particularis per-

magna

magna est, ita quoque in ulceribus : nam cauum & purum ulcus à mediocriter siccantibus curatur : sordidum uerò, & malignum, & oris prætumidis quidem, sed carne cutis fluida, ualidissimè siccantia requirit . In his igitur ulceribus, quoniam de ipsis uerba facimus, thus est imbecillum medicamen, ut ne pus quidem concoquere, uel mouere possit : argenti spuma hoc est ualidius, sed medijs tamen & ipsum inferius. At pix arida mediorum gregi annumeratur : quemadmodum hanc superat exiccando æs combustum, chrysocola, & diphryges. Euidenter siccant & chalcitis combusta, ærugo, misy, & æris squama : atque alio modo acerba, quæ Græci σφουρα uocant, galla omphacitis, malicorium, alumen. Exedunt autem non uista, chalcitis, ærugo, misy, & calx. Quæ iam fortissimas facultates habet, in omnibus corporibus eandem actionem ostendere uidentur. Imbecillia manifestam differentiam indicant : insuper si mentem adhibeas, neque manus in ualentibus pharmacis magnum actionis discrimen deprehendes, quàm in mollibus & duris corporibus obeunt. Etenim mollia citius accendunt, uebementius molestant, & maiores phlegmonas concitant.

E se

# E sexto libro Caleni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

#### KATA GENH.

QVINTVS enim quòd particu-  
laria solum tractet omissus est.



VPERIORE commentario  
emplastra dicta Græcè *πολύχρη-  
στα*, quòd multis conueniant affe-  
ctibus, distinguentes, ea potissi-  
mum collegimus, quæ præter al-  
lia ipsorum pollicita etiam ulce-  
ribus ægrè ad sanitatem perue-  
nientibus mederi queant: in præsentia uerò ad aliud em-  
plastrorum genus *πολύχρηστον* digrediar, quæ tum ad al-  
lia multa singulatim faciunt, tum ad particulas putrescen-  
tes, aliter affectas, quàm ulcera propriè *δυσδιόπτουτα* &  
curatione difficili nuncupata. Etenim illas putrilago de-  
pascitur, eoq; turba medicorum hos affectus nomas ap-  
pellat: illa uerò uno loco sine putrilagine circumscripta  
sunt, ut *σφηγεδα* dictæ, uicina quidem depascunt,  
non tamen ea putrefaciunt, febresq; inferunt, quòd ijs  
quæ depastionem cum putrilagine sustinēt accidere con-  
suevit. Summa curationis erat in prædicto ulcerum ægrè  
curabilium genere (chironia quoque uocant) medicamen-  
ta inuenire, quatenus licet rofionis expertia, ualide autē  
exiccan

exiccantia . Porro hæc quæ nunc scribentur omnia, mor-  
 dacia sunt, si quis ipsis solis , non cerato temperatis utæ-  
 tur . Quæ cerato miscentur , purgare quidem ulcus sordi-  
 dum & carne replere possunt, atq; etiam duritiem quan-  
 dam & tensionem discutere, non autem difficilia curare.  
 Indicant ipsorum uirtutem affectus, quibus bene adhibe-  
 ri credita sunt. Quod iam superius admonui, & nunc di-  
 cturus sum : meminisse uidelicet oportere illorum quæ  
 in opere de simplicibus medicamentis prodita sunt . In  
 cuius primo libro methodum seu rationem exposui, qua  
 medicaminum facultates inueniantur : tum pluribus ex-  
 emplis eius exercitationem proposui : in sequentibus sin-  
 gulorum nominatim mentionem feci . Nam illorum me-  
 mor, ex facili rationem eorum qui hæc pharmaca à no-  
 bis modò proposita composuerunt, assequeris, & uide-  
 licet ipse alia conficies, quocunque tempore prius exper-  
 torum inopia laboraueris : multa siquidem huiusmodi  
 non paucis contingunt in itinere, cum alio, tum maximè  
 nauali. Quandoquidem etià in patria quidam manentes,  
 pharmacorum structuram, unde ægros curabant, amise-  
 runt, ut præ tristitia ipsi tabefacti, perierint . Optimum  
 igitur medicamenta iam explorata secūdum dictam me-  
 thodum usurpare : sin autem, ut dixi, nonnunquam hæc  
 desideremus, habitum talem nos habere, quo simul iam  
 abundè compertis, possimus componere: quemadmodum  
 me sæpe agentem & in itinere & alibi uidistis . Nonnul-  
 la siquidem quæ proprio Marte in huiusmodi temporum  
 occasionibus condidi, postquam experiētia probassen,  
 nibilo peiora uel celebratissimis apparuerunt. Nam pri-  
 mum



nam ipsorum compositionem ex coniectura artificiali molimur: postea uerò cum nonnulla post experimentum probatissima uisa fuerint, nonnulla à scopo absint, denuò rursus corrigimus, & tertio nonnunquam ad perfectionem eius quod præstare uolumus, ipsa redigimus: at sine methodo, & in prioribus, & in Therapeutices libris exposita uti prædictis rectè nemo potest: tantum abest ut similia ipsis conficiat.

Emplastra ad digerendum & extrahendum,  
quæ Græcè *Ἐγγογνικὰ* & *Ἰσχυαῖα*  
nominantur.

**Q**ui compositorum medicaminum uirtutes descripserunt, emplastra quædam ab extrahendo *Ἰσχυαῖα* sicut alia à discutiendo *Ἐγγογνικὰ* nominarunt: alijs utranque extrahendi, & digerendi facultatem adesse testati sunt. Etenim uicinæ sibi uirtutes sunt, eorum quæ in alto latent, attractrix, & attractorum digestrix. Nam quæ trahunt etiam nonnihil planè discutiunt: & quæ discutiunt, pariter trahunt: Verùm in digerentibus medicamentis discussoria uirtus, in trahētibus attractrix præpollet. Constant itaque attractrices simplicibus pharmacis, quæ humorum superfluitates in cutem extimam possunt extrahere. Discussoriæ ex his conflantur, quæ attractum possunt digerere. Vt autem emplastrum fiat, quemadmodum suprà dictum est, huic argenti spuma, illi resina, alij cera, alij oleum, reliquo pix temperatur. quæ nec insignem digerendi potentiam, nec extrahendi continent, sicut uel propolis, uel calx, uel medulla, uel

galbanum, uel asie petrae flos, uel spuma nitri, uel aphro-  
 nitrum, uel acetum, uel lixiua steche, piper, sinapi &  
 struthium, salesq; tum qui edi possunt, tum ammoniaci.  
 Ad hæc pleraq; alia, de quorum facultate in commenta-  
 rio simplicium dictum est. Nunc autem emplastra, quæ  
 iam experimēto satis probata sunt, exequar: tantum ad-  
 buc ipsis adiiciens, quòd nonnulli etiã astringentia phar-  
 maca extrahentibus nuscuerunt, ueriti quod accidit, ubi  
 humorum superfluitas fuerit: trahunt siquidem plus in-  
 terim ac conuenit, ut non solum ex particula quæ cura-  
 tur, attractionem in alto, sed etiã ex omnibus uicinis mo-  
 liantur. Comprehensum est & antea, cum de sarcoticis  
 ageremus, extrahentia & digerentia, uelut omnia quæ  
 magis quàm oportet detergunt, sarcotica fieri cerati mi-  
 stura. In quibus uirtus quidem ualida, copiosioris: in  
 quibus imbecilla, paucioris. Quòd si uerò compositum  
 extrahendi uel digerendi medicamentũ, astringens quo-  
 que aliquid habeat, tali pharmaco ad carnem genera-  
 dam, propter uim astrictoriam utendum non est, quæ ad  
 uulnera glutinanda & sinus, tum ad ulcerum cicatricem  
 ducendam utilis est, ad carnis productionẽ non ita. Di-  
 ctum mihi est abunde iam de hoc.

Hæc in Aegyp̃tia Andromachi scribit  
 Galenus libro sexto.

**S**Vbinde audiui medicamenta, quæ simul cum dige-  
 rentibus etiam astringentia capiunt, tutiora fieri:  
 quæ uerò sine astringentibus digerant, efficaciora qui-  
 dem, sed non perinde tuta: sæpe enim fluxiones attrahunt,  
 dũ corpus quod curatur, plethoricũ est, uel prauo  
 succo

succo obnoxium. Si autem uacuum corpus esset, ac superfluitatibus liberum, pröptius medicamenta, quæ discutuntur, sola sine astringentibus assumpta, ad finem peruenirët. At cum pauca id genus corpora quibus medicamenta offeruntur, reperiatis: securius esse uidetur, miscere etiam nonnulla repellentia. Ita sane ex emplastro digerenti, quod ex sale conficitur, quidam adiecerunt chalcanti paululum, quamuis sal ipse astringens quippian possideat.

# E septimo libro Galeni

## DE COMPOSITIONE

### MEDICAMENTORVM

KATA GENH.



**M**ALAGMATA uocant medici, quæ partes supra naturam induratas emolliunt, calido omnia tēperamēto mediocri prædita, non tamē exiccantia, quemadmodum nec manifestò humectantia. Nam cum exactè malacica medium quandam ordinem inter humectantia siccantiaq; sortiantur, induręscantium substantiæ ueluti fusionem quandam moliuntur. Nominantur autem malacica, licet in alijs paululum ad siccandi humectandiq; uirtutem inclinent, si modò subiectam partium, quas con-

tingunt, substantiam queant diffundere: quod nimirum propter moderatum in eis calorem accidit. Ac quòd, ubi durities diffusa discussaq; fuerit, digerentium medicamentorum usus ueniat, in tertio de simplici medicina, tum in decimoquarto Therapeutices libro comprehensum est. Indurescentia igitur, quæ ex methodica, seu rationali arte non curata scirrum contrahunt, optimè curabuntur, si medicus spectet, quatum ægri corporis substantia à mediocri humiditate ac siccitate recesserit, quæ admodum si affectus ipsius incrementum inspiciat: præterea consideret, inter ipsa pharmaca alia magis, alia minus emollire: Huc namque spectanti primus usus emollientis medicaminis, coniecturalis quidè erit, sed cum artificio. At post unum aut alterũ diem siue intendere medicamenti uirtutè, siue remittere conueniat intelliges, ut in prioribus & medendi methodo dictum est. Quapropter medici digerètia pharmaca cõposuerũt, cense scopos ambos sibi proponètes, tum ut partis duritiem, quæ iam in scirrum degenerat, diffunderent: tum ut per halitum digererent, non uicissim utroque utentes, quemadmodum me frequenter facere conspexistis: uerum duo ipsa composito medicamine molientes. Notum est omnibus, in mustura uel emollientia, uel digerètia esse copiosiora, tum maioris minorisq; rationè in ipsis esse nõ exigua. Cæterum constat subinde uaria facultatibus nasceri: ac necesse est, sicut in alijs medicamentis, ita in his, si probè mederi cupias, plura eiusdem generis pharmaca, uel certe duo temperari, ualidissimum puta totius generis & moderatissimum, ut ex ipsorum mustura conuenienti multa quæ

ta quæ intra summa contineantur medicamina efficias. Non enim pingue eandem uirtutem obtinet quam bdelium, styrax, & gutta ammoniaci : quemadmodum nec inter ipsos adipēs anserinus, & gallinaceus, uel pardi, uel leoninus, uel hyenæ, uel alterius cuiusdam animalis : Nam secundum animalis temperamentum etiam adeps calidiorum magis excalfacit, sicciorum uerò euidentius siccat. Ac uulgus medicorum nouit leoninum adipem in utroque, calfaciendo dico & digerendo, longè esse ualentissimum. Proximum locum habet pardi adeps, ut qui modicè emolliat : pari spatio ab hoc recedit adeps gallinaceus. Hi igitur omnes tenuiorum partium substantiam inter quadrupeda animantia occupant. At differentia prorsus permagna in illis est, cum suillus quidem mollissimus ac humidissimus, eoq; aliorum imbecillius sit, ut teneris corporibus conueniat, cuiusmodi habent mulieres, pueri, eunuchi, & uiri deliciores, in umbra, & solis, & frequentibus potabilis aquæ balneis efforminati. Caprarum uerò & boum pingue quāto suillo est ualidius, tanto magis corporibus & natura durioribus, & inter duriora scirro opportunioribus conuenit: taurorum hircorumq; in ualidioribus, tum corporibus, tum affectibus proficit. Eadē uerò & alijs in minoris maiorisq; ratione inter se est differentia. Porro ab imbecillioribus auspicabor, si prius de duritiei, ac scirri affectu quædam prælibauero : nam cum phlegmone laborantibus & indurrescentibus commune sit, digitis prementibus reniti, distinguuntur affectus, doloris sensu & indolentia : hæc enim nondum utrisque communia sunt. Quemadmodum

uerò in alijs omnibus, quæ sibi mutuo possunt accidere, inest uicinitas utriusque aliquatenus particeps, ita quod quæ ulcerum phlegmone laborantium, cum scirris absque phlegmone, quales induratis accidunt, media quedam est dispositio, doloris quidem expers, si non digitos imprimas, dolens autem si id facias, quàm clarioris breuiorisque disciplinæ gratia, uel phlegmonem scirrosam, uel scirrum phlegmonodem dicemus, non hic tumoris magnitudini animum attendentes: Nam phlegmone et scirrus formæ affectuum, non quantitatis in altero ipsorum nomina sunt: Nam phlegmone uel propter partis inflammationis magnitudinem, uel ob tumorem præter naturam magna euadit: parua autem quum aut paruum locum possidet, aut exiguum tumorem habuerit. Dicitur nunc ubi parue phlegmones, scirri que parui curatio, sicut et magni utriusque, pro affectuum figura. Hinc enim et aliorum, quæ magna et parua dicuntur, curationis notio sumetur. Itaque magna phlegmone cataplasmatibus ac humidis quibusdam medicamentis sanatur: parua, cum scirrosa durities mixta fuerit, itidem cataplasmatibus: interim uerò medicamentis cerati modo confectis, et liquidis, insuper euollientibus emplastris: talibus autem et parua durities tollitur. Atqui in hoc quidem simplex scopus, quemadmodum et phlegmone consistente est: cum uerò durities phlegmonodes quippiam habuerit, ad composita quoque animum dirigimus.

De

De medicamento, quod quia liquidum est,

ωάγυρς Græci appellant.

**A**C ideo medicamen quodammodo compositum est, ueluti & hoc quod ωάγυρς nominant, omnibus cognitum: magnificè uerò cum ab alijs quibusdam, tum Hera commendatū. Medetur autem id particulæ parua adhuc phlegmone consiſtenti, non multo pòſt confeſtionem tempore, ſed protinus impoſitū: ubi uerò duritiem à dolore alienam pars affecta acquiſierit, paulò recenti uetustius utile est: quemadmodum ſi phlegmonodi affectu omnino ſit libera, melius in ea uetustius medicamentum proficit: uerùm medicamenti tempus pro duritiei intentione uidelicet æqualiter augere conuenit, etſi partem ualde induratā ne uetus quidem pharmacū emollierit. Quippe uaria hoc ωάγυρς dictum medicamentum & promittit, & poteſt: quoniam materiem muſtam quoq; ſeu uariam obtinet: ſiquidē adeps ſuillus & cera mollientium ſunt imbecillima: argenti ſpuma uerò & ceruſſa nihil habent malacicum, quemadmodum antea didicimus. Porro Heras, qui pharmacum hoc omnium maximè laudauit, ex hiſce ipſum ita confeſcit: Adipis ſuilli recentis cuſcati pondo uncias quadragintaquatuor, ceræ pondo uncias uigintiquatuor, ceruſſæ pondo uncias ſex, argenti ſpumæ tantundem: quæ liquari poſſunt ſiccis ſuperfunduntur: temporis autem ſpatio medicamentum conſiſtit ſpiſſaturq;. Sicut ceram & adipem ſuillū imbecillæ molliendi uirtutis eſſe dixi, ita ſi oleo pauſillū ceræ muſceas, id quod à medicis cerælum dicitur efficies. Atqui oleum uidelicet eſſe conuenit, nec quod uocant omphacinum

& omotribes, quasi dicas, immaturum & crudum; nec  
 quod oleæ surculos in confectiōe assumpsit. Itaque tan  
 imbecillia malactica etiam paruis medicantur inflamma-  
 tionibus. His autem fortiora modicam duritiem sine pble  
 gmone persanant: his adhuc ualidiora maiores, quemad-  
 modum & quæ duritiem in scirrum propè degeneran-  
 tem curant, efficacissima sunt, cuiusmodi est medullarum  
 genus, in maioris minorisq; ratione inter se differētium,  
 ut deinceps explicabo. Item bdellium utrunq; arabicum  
 & schythicum: insuper styraces: siquidem horum effi-  
 caciſſimus est colore pallidus, qui etiam optimus in Pan-  
 philia nascitur: qui uerò hoc magis fuscus est ubiq; pro-  
 uenit, potentia multò pallidior inferior: at temporis  
 processu aureum colorem acquirit. Hoc itaque in antido-  
 tis propter caritatem utimur: ac tu propterea principi  
 quodcunque ex styrace præparans semper hoc uteris:  
 item si familiarium quis in pharmacorum sumptibus ma-  
 gnificus existat, illi quoque ex huiusmodi styrace medi-  
 camentum compones: in alys optimum ex fusco genere  
 deliges, & odore potissimum, & colore iudicium eius  
 sumens: nam niger deterior est. Cæterū his quæ indure  
 scētia ualidè emolliūt, gutta ammoniaci adscribitur, eaq;  
 magis pinguis & noua. His minus, sed tamē & ipsa effi-  
 cacia sunt, caprarū boumq; pinguia: interea ipsa birco-  
 rum ac taurorū ualidiora sunt: boū uerò & caprarū his  
 quidē imbecilliora, quanquā nec ipsa actionis sint exper-  
 tia: hædorum autē & uitulorum his ipsis adhuc imbecil-  
 liora sunt, porcillo tamen efficaciora: porrò leonis, par-  
 di, byenæ & anseris euidentius his digerunt, non magis  
 emol

Styracis diffe-  
 rentia, & ele-  
 ctio.

De adipibus.



emolliunt: quanto etiam subtiliorem substantiam caprino  
 & bubulo seuo habent. Cæterum gallinaceum median  
 intra anserinum & suillum sedem occupat: quemadmo=  
 dum & medullarum optima est uitulina: ac resine, quæ Medullæ.  
 non acrem odorem habent, si dictorum cuiuspiam miscen=  
 tur, glutinandi uim, quæ Græcis *ἰχθυόειον* & dicitur, me=  
 dicamentis compositis apponūt, emolliendi uirtutem non  
 auferunt. Aptissima est quæ Chia uocatur & larix:  
 post hæc picea, inde abietina: strobilina uerò uehemen=  
 ter acris est, pityinea, seu pinea, quam proprie physema Deresinis, &  
 nominant, pinguitudinis expers admodum exiccat. Has cur malagma  
 igitur fugere, chia uerò & abietina uti oportet, non ipsis tis miscean=  
 per se, uerum cum cera & quodam alio, quod affectui tur.  
 conducere uideatur. Cæterum pix non miscenda est, si=  
 cut nec bitumē, utpote iusto sicciora: quippe ea quæ exic=  
 cant mollientibus esse contraria: quoniam uere piceam,  
 & frictam resinam, & colophoniam appellare conſue=  
 uerunt, sciendum uenit, aliam quandam esse colophoniam, Colophonie  
 Chie mastice persimilem, molliens aliquid habens, duplex nota.  
 quemadmodum illa & thus: insuper ægyptia mastiche  
 nonnihil emollit, sed maior uirtutis ipsius portio conco=  
 quit, digeritq;: item thus modicam molliendi uim obti=  
 net: uerum hoc quidem coctum ex usu est, ueluti & fœ=  
 nigræci semen: etenim & hoc probe coctum emollit, ac  
 magis adhuc pingui temperatum. At quæ citra coctionē  
 ob consistentiæ siccitatem dilui, liquari, mergiq; deside=  
 rant, oleoso quopiam indigent, cuiusmodi sunt, oleum  
 ipsum, cum nihil astrictionis habet: item balneorum  
 strigmenta, præterea quod uocatur susinum: ad hæc

multo magis commagenum : huius ordinis est butyrum, tum altheæ & fenigræci decoctū. Porro inter tan molliæ & ualidissima, quod genus sunt bdellium & styrax, gutta ammoniaci idem potest quod & propolis : atqui hoc in bdellio distinguendum est, quod scythicum altero arabico multo ad hæc sit præstantius, præcipue nouum & molle, quod etiam pingue nominant: consuetudo siquidem hæc est inter recētioreſ medicos, in huiusmodi pharmacis quod mollius est, idem uidelicet humidius quoque appellasse. Cæterum galbanum, & quæ opopanax dicitur, præterquam quod digerunt, etiam quid molliens occupant : opopanax autem digerendo, galbanum molliendo coquendoq; præcellit. Talis sanè mollientiū pharmacorum facultas est. Tu cum uel scriptum aliquod in libris medicamentorijs discutias & examines, uel ipse componas, auditis nuper pharmacorum secundum maioris minorisq; rationem differentijs, intellectus item corporum affectuumq; diuersitatibus, ualida ualidis, imbecillia imbecillibus adhibebis. At ubi post primam medicamenti impositionem denuò ipsum applicas, oleo pingui partem affectam fouere conuenit. Porro ex ijs quæ à glutinatione *ἔχουσα* non mutantur, nullum auferendum est priusquam sua sponte abscessus proueniant : atqui si laueris permittenda sunt. Vitanda autem medicamentorum aquarum lauachra, præsertim quæ auripigmento sa, aluminosa & sulphurosa sunt. Hæc quidem sufficiunt uiris cordatis ac prudentibus, tum in medicinæ operibus quodammodo exercitatis. Quoniam uerò omnes eiusmodi non sunt, & proposuimus hoc commentario, non ut in opere

opere de morbis curandis methodum solam exponere, uerum simul cum particularium uno atq; altero exēplo pharmaca usu comperta subiungere oportet, quæ maiores nostri, in medicatoria artis parte celebres, literis mandauerunt, ad speciales mollientium pharmacorum differentias peruenimus, à molliſſimis, quæ & paruis inflā-  
 mationibus medentur, exorſi. Ex compositis malaſticis alia quidem, ut ita dicam, imbecilliora primo ordine ſta-  
 tuuntur, quædam non multo his ualidiora, ſecundo, & quædam alia tertio, ad hæc nonnulla quarto. Cæterum primi ordinis malaſticis ad exiguas durities, & in mol-  
 libus ſeu teneris corporibus uti, ſicut prædictum eſt, ex-  
 pedit: ad ſortiora his corpora & affectus, ſecūdi: quem-  
 admodum & tertij & quarti, pro illorum qualitate. Subſcribunt autem ſingula illorum ordinum ſeparatim.

Malaſtica, id eſt, emollientia medica-  
 mina primi ordinis.

**B**utyrum uel reſina colophonia, & cera candida non  
 uetula, ſingula pondere æqualia, inuicem liquata,  
 prima ordinis malaſtica ſunt. Et liquidum medicamen,  
 quod *μαρτυρον* appellatur, eorum numero adſcribitur,  
 cum recens fuerit: uetus autem maiorem digerendi uim  
 repræſentat. At emolliētium imbecillimum eſt, cera cum  
 butyro liquefacta, aut ex ſuſino, aut commageno. Atque  
 his imbecillius eſt quod dicitur Græcè *μυρμυρα*, quaſi  
 ex cera oleoq; conſectum, cum in libram olei laxantis  
 nulla aſtringēdi uirtute præditi, ceræ uncias duodecim,  
 uel ſedecim iniecerint. Iam ex ouis cerat: facta, exiguan  
 quand

quandam relaxandi potestatem possident: ualentiora his, uerum imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex œsopo, resina & cera pari pondere liquefactus: Sin autem uetustiora quodanmodo ipsa fuerint, olei cuiusdam laxantis, uel su lini, uel commageni, uel adipis suilli, uel gallinacei, uel anserini misturam requirunt.

### Malactica medicamenta secundi ordinis.

**Q**uemadmodum in simplicibus medicamentis factum uidimus, quarti ordinis homogenia pro maioris minorisq; ratione distinguentes, aliquorum ambiguum esse uirtutem diximus, siue ad primum ordinem, siue secundum initio ipsorum facultas locanda sit: Ita de secundo, tertio, & reliquis deinceps. In quibusdam uero audacter pronuncians, alia in principio huius, alia in termino huius ordinis consistere dixi: sicut nonnulla citra appositionem uel primi, uel secundi, uel tertij, uel quarti ordinis essetuli. Atqui multum experientie particularis in uarijs & corporibus, & uitijs seu affectibus huiusmodi pronunciata desiderant. Quare si quis post me æque studiosus, & ueritatis uehemens amator extiterit, non temere ac subito, ubi bis terue usus expertusq; sit, ferat sententiam: frequenter enim ex longa experientia, quemadmodum & ego, deprehendet uidebitq; in secundo ordine dicta, in tertium incipientem transponi oportere, uel mixta in principium tertij absolute. Cum enim corpora, quibus medicamenta adhibentur, ipsiq; affectus non exiguum differentie excessum in maioris minorisq; ratione obtineant, difficillimum est de omnibus eadem pronunciare.

ciare. Accedit huc, quòd ipsa simplicia medicamenta non paruo diueriant discrimine. At ego cum in præstantissimis uirtutem pro unaquaq; specie ac genere ostenderim, si quis in deterrimo per experientiam examinationē molitur, examinabit quidem falsò, non autē facultatis ipsorum ordines distinxerit. Itaque longè tutissimum est, medicaminum ipsorum inter se differentiam secundum maioris minorisq; rationem accuratè scribere, quemadmodum & in alijs feci, & nunc facturus sum. Sanè quidem emplastrū Mnaseo auctore compositū, rectissime secundo malaëlicorum ordini adscripseris, omnibus certe qui eius meminerunt, conuenientibus, ex oleo ueteri, argenti spuma, & adipe suillo componi: in quantitate uerò singulorum discrepantibus, tum eo quòd nonnulli ex recenti adipe, quidam ex ueteri, quem iam omnes uocare solent axungiam, composuerint. In his quidem imbecillimum fiet ex argenti spuma, suillo adipe, & oleo, neutro ueteri ualidius: oleo quidem inter ea ueteri, altero autem recenti addito: his ualidius ex ambobus uetustis. Ex eo igitur quòd recens, aut uetus oleum adepsq; immittitur, quatuor differentie prodibunt: aliàs quidem ambobus recentibus, aliàs uetustis: nonnunquam oleo quidem ueteri, adipe uerò recenti: uel contrà, oleo quidem recenti, uetusto autem adipe indito. At ex trium ipsorum simplicium medicamentorum mutua temperatura aliæ plures differentie emanabunt: uel enim pari pondere & mensura hæc tria miscentur, ac multi affirmant, ab ipso Mnaseo confectum tribus paribus constare, uel duobus quidem paribus, tertio non pari, sed minori aut copiosiori.

fiori, uel tribus imparibus temperatis: unde clarum euadit, multas fore differentias: Copiosa siquidem argenti spuma iniecta, medicamen potestate mollius fiet: pauciore, ualidius: ac magis emolliet, si plus adipis immutamus: digeret fortius, si oleum augeamus. Præterea aliud quidem accedit copiosiore oleo imposito, quod magnā uim ad medicamen, ut magis digeret, efficiendum occupat: est autem hoc, sicut primo libro diximus, si magis incoquas. Si igitur solam argenti spumam in oleo copiosiore coquas, medicamentum euidentius exiccabit: in uberiore uerò oleo coques, ubi plus indideris, si emplastri spissitudinem habiturum sit: quòd si id non cures, sed æquali tempore tum id quod minus olei continet, tum quod plus habet incoquas, liquet potestate mollius futurum, cui oleum uberius temperatum fuerit, quemadmodum si & cruda argenti spuma oleo commixta acopo uti uelis. Quare quod iam sæpè dixi, semper ipsius meminisse uolo: non sicut quidam sententias absolute de pharmacis ferunt, & sic nos facere: absolute dicentes, hanc medicamenti compositionem illa esse potiore. Nam utraq; ad diuersos specie affectus componi potest: interim ad eosdem diuersis temporibus.

#### De relaxantibus medicamentis.

**V**Ocantur medicamenta quædam relaxantia, Græcè χαλαστικά, familiari omnibus propè recentioribus medicis uocabulo: inde nimirum, sicut & nomen ipsum indicat, quòd tensas laxant particulas: quippe relaxari, ac intendi contraria inter se dicuntur: quin etiam Hippocrates hūc in modum scriptum reliquit: cuti duræ emolusio,

litio, intensæ relaxatio cōuenit. Si igitur propriè quis di-  
 etionibus uti uelit, nonnulla medicamina induratorum  
 corporum malactica, id est emollientia esse dicet, ea nimi-  
 rum quæ ipsorum soluunt duritiem, quemadmodum &  
 relaxantia quæ tensioni medentur. Porro in phlegmo-  
 nis cutem tendi contingit, interum à subiecto tumore sym-  
 ptoma hoc capientem, interim ipsammet inflammatione  
 laborantem, non tamen phlegmones substantia partis  
 inflammatae durities est, sed è conuerso planè, sicut in li-  
 bris de ipsa ostendimus, humiditas: atqui in his quæ  
 scirro conflitantur, non præpollens in affectu parte hu-  
 miditas est, uerùm durities: attamen utriusque affectus  
 similis quodammodo generatio est, & curatio: nascitur  
 enim ex confluxu humorum: curantur iisdem euacuatis,  
 quanquam euacuationis modus in utrisque idem non est,  
 sed uti in Therapeutices commentario declaratum est,  
 in quo etiam aliorum omnium affectuum sanandi ratio-  
 nem explicuimus, inflammatis quidem particulis, tum  
 repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tum  
 discussoria semper ex usu est: scirris autem sola dis-  
 cussoria sine repellente: itaque summe indurata scirro,  
 summe insanabilia sunt. Porro dignoscere ea oportet,  
 eo nempe signo, quòd nullus affectis partibus sensus su-  
 persit: at in quibus sensus quidem est, sed obscurus, hæc  
 curantur pharmacis humorem incrassatum uidelicet di-  
 gerentibus, non tamen ualide, ac uniuersim hoc agenti-  
 bus, sicut digerentia medicamina faciunt, cuiusmodi uo-  
 cant Græci *ὑπομαζαὶ* & *ὑπερωμαίνε*. Mirari uerò non  
 oportet, mutationē in duritiem ex inflammatis accidere,  
 cum

cum simul & confluens humor sit craſſior & liquidus, & curatio medicamentis ualde exiccantibus adminiſtre-  
tur:quemadmodum & in exterioribus perimulta corpo-  
ra, quæ ipſum ignem contingunt, torrentur, ex aqua rur-  
ſus emolliuntur: ita in inflammatis affecti loci humiditas,  
à caleſcientibus & exiccantibus ualidius pharmas-  
cis, reliquum aliquid uifcoſum craſſumq; retinet, tenui  
diſcuſſo. Et hac ratione in morbis articularibus calli  
proueniunt, & in renum uitio calculi. Quòd ſi uerò flu-  
xio quæ phlegmonem committit ſubſtantia ſit tenuis, &  
curatio eius ſiccantibus & caleſciētibz pharmacis ad-  
bibeatur, nihil ſcirroſum relinquitur: imò refrigerantia  
uehementer aſtringentiaq; ſcirros procreare ſolent: ac  
multos ex eryſipelatis immodicè refrigeratis ſcirroſos  
humores habere conſpicimus medicorum qui eos ſanan-  
dos ſuſceperunt inſcitia. Prima ergo medicaminum, quæ  
phlegmonis & quæ ſcirris medentur, differētia eſt præ-  
dicta: altera propter dolorem inflammantis coniunctum.  
quæ non ſuſtinet ualens medicamentum affectuæ particu-  
læ offerri. Quippe hæc cum dolore actionem edunt, in-  
flammatis ob affectum ſtatim dolentibus, eoq; molliſſi-  
ma remedia deſiderantibus. At uehementiora præter-  
quam quòd dolores non ſoluunt, uel mitigant, adhuc etiā  
exacuentia maiores phlegmonas concitant. Itaque pri-  
mus uſus in dolentibus phlegmonis eſt, qui medicamentis  
abundè humidis ſimul & modicè calidis adminiſtratur.  
Alter paulò craſſioribus ſiccantioribusq; conſtat. Ter-  
tius relaxantibus nominatis, quæ nonnulli malagmatis  
adſcribunt. Sunt autem inter ea molliſſima ſanè, quæ ce-  
rati



rati speciem consistentiæ referunt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxante componuntur. Temperatur ipsis æsopi, resinæ & picis modicum, sicut & thus, & galbanum, præterea nonnihil iris illyricæ. Porro Mene crates ut ipse ait, & alij quidam ei attestantur, medicamentum *ἔξ χυλῶν*, id est ex succis appellatum, phlegmonis nondum uehementer dolentibus esse remedio.

### De Acopis.

**Q**uid acopa medicamenta promittant, etiam nomen ipsorū ostendit. At copos, id est lassitudines Græci homines uocant affectus ex multo uehementiq; motu, corporibus uel totis, uel particulis amplius exercitatis oborientes. Porro molesti sunt potissimum ijs qui agitantur, mouenturq; uehementiores autem, iam & conquiescentibus negotium faceßunt. Cæterum postea medicis in usu fuit, etsi non ad lassitudines medicamen ab ipsis sit compositum, sed uel ad dolorem diuturnum in alto corporis latentem, uel motum difficilem, uel particule duritiæ, uel tensionem, uel tumorem scirrosum appellare acopa, & id genus omnia, modò humidam consistentiam acopis simulē habeant: quæ liquidis ceratis, cuiusmodi & in luxatis, fracturisq; utimur, est propinqua. Quippe talem consistentiā habet, humidissimum quod à iunioribus medicis ceræleō appellatur: deinde illitus acopi: post hos liquidorum ceratum, crassiore substantia præditū: mox ceratum tenerorum & mollium, uti uocant: postremo æmolynta, hoc est non inquinantia, similia ijs quæ propriè epithemata dicuntur. His succedit emplastrorum consistentia, quæ & ipsi in maioris minorisq; ratione haud

Medicaminū  
consistentiæ  
ordo.

Ceratoma-  
lagmata.

mediocrem obtinent differentiam. Quare nonnulli medicorum quædam nomine à sola consistentia ita desumpto, ceratomalagmata nuncuparunt: medicamenta, inquam, inter ea quæ corpori imponuntur: nondū quidem humida, duritiem uerò necdum consecuta, qualem emplastra occupant. Cum igitur omnes citatæ differentie non medicamentorum uirium, sed consistentie formæ sint indices, acoporum appellatio quondam sanè medicaminū facultatem, postea consistentiā significauit: huiusq; rei causa cū distinctionibus ea nominare coacti sunt: hoc quidē acopon relaxans, illud emolliens, uel calefaciens, uel à dolore tollendo anodynum, uel metasyncriticum appellantes: sicut ad huiusmodi quendam affectum conferre: uerbi gratia, paraly sin, coxarū laterumq; dolorem: uel communiter ad uniuersos dolores. Natium igitur est medicamen simplex, omnium lassitudinum præsidium, oleum uidelicet, quod & citra adiectionem nominatur: quoniā uetustis temporibus solum quoque erat: posteri cicinum apud nos ei apposuerūt. In Aegypto enim hoc simul uetustum erat: & rursus raphaninum, sinapinam, & sesaminum, tum alia eius generis, quæ admodum etiam apud nos crinum, mastichinum, & lentiscinam, quæq; his magis uaria sint, ut unguenta, propè accedant. Itaq; neminem latere arbitror, medicamenta acopa dicta, omnia liquidæ consistentie esse necessario: quippe oleum solum lassitudines externis partibus ingruētes curat: in alto affligentes uehementioresq; temperatū alicui laxanti phar maco, & mediocriter calefacienti, ueluti galbano, resina terebinthinæ: adhæc colophonie cuidam nominate & frict

Oleum simplex acopō.

Acopis quæ  
mitceantur.

& frictæ. Quibus calidiores sunt abietina & strobili-  
 na: terebinthina uerò larix paulò calore præcellit. Cæ-  
 terum id genus omnia relaxatibus oleis nuscuntur, qua-  
 le est sabinum, iniecta interdum & cera. Iam uerò ἄλυσ-  
 τος unguen est in his qui iam in corporibus alto dolent  
 medicanē ex semine abietis, chamæmeli, aneti, & floris  
 populi, quorū mox dicemus consuetudinem: præterea susi-  
 num, & gleucinum, & comagenum ex acoporū ungui-  
 num grege est, quæ tum ex medulla, tum pingui compo-  
 nuntur, suillo quidem moderatissimè relaxatū, gallinaceo  
 autem his uehementius, & hoc adhuc magis anserino.  
 Atqui pingue leoninum, & pardi ualidius est, ut iam ue-  
 hementer calefaciat, eoq; insigniter discutiat. In medio  
 horum cōsistunt, bubulum, caprinum, uulpis, & hyenæ.  
 Hæc scilicet in uniuerso genere sunt, quæ propriè ἄλυσ-  
 ται dicuntur, hoc inuicem discriminæ uariantia, quòd alia ma-  
 gis, alia minus calefaciant. Quapropter nonnulla genere  
 toto acoporum unguinū excidisse uidebuntur, si in mol-  
 libus ea corporibus examines, etsi durioribus, cuiusmodi  
 agrestium sunt, utilissima appareant: non subinde dixi-  
 mus, dura corpora ualentiora pharmaca sustinere, mol-  
 lia uerò & humida, uelut puerorum, mulierū, & cunu-  
 chorū eiusmodi medicaminum potentiam ferendo non  
 esse. Insuper cuius notum est, & quæ uocantur myraco-  
 pa, ex acoporum cum unguentis temperatura fieri, ni-  
 hilo cæteris præstantiora nisi odoris suauitate.

A P P A R A T V S M E D I C A-  
 M E N T O R V M G E N E R A-  
 L I V M F I N I S.

Lugduni  
Excudebant Ioannes  
& Franciscus Frel-  
lonii, fratres.

1 5 4 2